



المركز الوطني
لتطوير المناهج
National Center
for Curriculum
Development

الرياضيات

الصف التاسع - كتاب الطالب

الفصل الدراسي الأول

9

فريق التأليف

د. عمر محمد أبوغليون (رئيساً)

د. سميرة حسن أحمد

إبراهيم أحمد عمارة

هبه ماهر التميمي

الناشر: المركز الوطني لتطوير المناهج

يسر المركز الوطني لتطوير المناهج استقبال آرائكم وملحوظاتكم على هذا الكتاب عن طريق العناوين الآتية:

☎ 06-5376262 / 237 📠 06-5376266 ✉ P.O.Box: 2088 Amman 11941

📌 @nccdjor 📧 feedback@nccd.gov.jo 🌐 www.nccd.gov.jo

قررت وزارة التربية والتعليم تدرّيس هذا الكتاب في مدارس المملكة الأردنية الهاشمية جميعها، بناءً على قرار المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج في جلسته رقم (2022/4)، تاريخ 2022/6/19 م، وقرار مجلس التربية والتعليم رقم (2022/44) تاريخ 2022/7/6 م بدءاً من العام الدراسي 2022 / 2023 م.

© HarperCollins Publishers Limited 2022.

- Prepared Originally in English for the National Center for Curriculum Development. Amman - Jordan
- Translated to Arabic, adapted, customised and published by the National Center for Curriculum Development. Amman - Jordan

ISBN: 978 - 9923 - 41 - 408 - 8

المملكة الأردنية الهاشمية
رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية
(2023/2/782)

373.19

الأردن. المركز الوطني لتطوير المناهج

كتاب الطالب: الصف التاسع: الفصل الدراسي الأول/ المركز الوطني لتطوير المناهج. - عمان:

المركز، 2023

(187) ص.

ر.إ.: 2023/2/782

الواصفات: / الرياضيات // الكتب الدراسية // أساليب التدريس // التعليم الإعدادي

يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى مصنفه، ولا يعتبر هذا المصنف عن رأي دائرة المكتبة الوطنية.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, sorted in retrieval system, or transmitted in any form by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the publisher or a license permitting restricted copying in the United Kingdom issued by the Copyright Licensing Agency Ltd, Barnard's Inn, 86 Fetter Lane, London, EC4A 1EN.

British Library Cataloguing -in- Publication Data

A catalogue record for this publication is available from the Library.



1443 هـ / 2022 م

2023 م - 2025 م

الطبعة الأولى (التجريبية)

أعيدت طباعته

المقدّمة

انطلاقاً من إيمان المملكة الأردنية الهاشمية الراسخ بأهمية تنمية قدرات الإنسان الأردني، وتسليحه بالعلم والمعرفة؛ سعى المركز الوطني لتطوير المناهج بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم إلى تحديث المناهج الدراسية وتطويرها، لتكون معيّنًا على الارتقاء بمستوى الطلبة المعرفي، ومجارات الأقران في الدول المتقدمة. ولما كانت الرياضيات إحدى أهمّ الموادّ الدراسية التي تنمّي لدى الطلبة مهارات التفكير وحلّ المشكلات، فقد أولى المركز هذا المبحث عنايةً كبيرةً، وحرص على إعداد كتب الرياضيات وفق أفضل الطرائق المتّبعة عالمياً على أيدي خبرات أردنية؛ لضمان انسجامها مع القيم الوطنية الراسخة، وتلبيتها لاحتياجات طلبتنا.

روعي في إعداد كتب الرياضيات تقديم المحتوى بصورة سلسة، ضمن سياقات حياتية شائقة، تزيد رغبة الطلبة في التعلّم، ووظّفت فيها التكنولوجيا لتسهّل في جعل الطلبة أكثر تفاعلاً مع المفاهيم المقدّمة لهم.

لقد احتوت الكتب على مشروع لكل وحدة؛ لتعزيز تعلّم الطلبة المفاهيم والمهارات الواردة فيها وإثرائها. ولأنّ التدرّب المكثّف على حلّ المسائل يُعدّ إحدى أهم طرائق ترسيخ المفاهيم الرياضية وزيادة الطلاقة الإجرائية لدى الطلبة؛ فقد أعدّ كتاب التمارين على نحوٍ يُقدّم للطلبة ورقة عمل في كل درس، تُحلّ بوصفها واجباً منزلياً، أو داخل الغرفة الصفية إن توافر الوقت الكافي. ولأنّنا ندرك جيداً حرص الكوادر التعليمية الأردنية على تقديم أفضل ما لديها للطلبة؛ فقد جاء كتاب التمارين أداةً مساعدة تُوفّر عليها جهد إعداد أوراق العمل وطباعتها.

من المعلوم أنّ الأرقام العربية تُستخدم في معظم مصادر تعليم الرياضيات العالمية، ولا سيّما على شبكة الإنترنت، التي أصبحت أداةً تعليميةً مهمّةً؛ لما تزخر به من صفحات تُقدّم محتوىً تعليمياً تفاعلياً ذا فائدة كبيرة. وحرصاً منا على ألا يفوت طلبتنا أيّ فرصة، فقد استعملنا في هذا الكتاب الأرقام العربية؛ لجرّس الهوة بين طلبتنا والمحتوى الرقمي العلمي، الذي ينمو بتسارع في عالمٍ يخطو نحو التعليم الرقمي بوتيرة متسارعة.

ونحن إذ نقدّم هذا الكتاب، نأمل أن ينال إعجاب طلبتنا والكوادر التعليمية الأردنية، ويجعل تعليم الرياضيات وتعلّمها أكثر متعةً وسهولةً، ونعد بأن نستمرّ في تحسين هذا الكتاب في ضوء ما يصلنا من ملاحظات.

المركز الوطني لتطوير المناهج

قائمة المحتويات

الوحدة 1 المتباينات الخطية 6

7 مشروع الوحدة: المتباينات والعلوم

8 الدرس 1 المجموعات والفترات

17 الدرس 2 حل المتباينات المركبة

26 الدرس 3 حل معادلات القيمة المطلقة ومتبايناتها

35 الدرس 4 تمثيل المتباينات الخطية بمتغيرين بيانياً

46 معمل برمجة جيو جبراً: تمثيل المتباينات الخطية بمتغيرين بيانياً

48 اختبار نهاية الوحدة

الوحدة 2 العلاقات والاقترانات 50

51 مشروع الوحدة: القطع المكافئ في حياتنا

52 الدرس 1 الاقترانات

64 الدرس 2 تفسير التمثيلات البيانية

74 الدرس 3 الاقتران التربيعي

85 معمل برمجة جيو جبراً: استكشاف التحويلات الهندسية للاقتران التربيعي

87 الدرس 4 التحويلات الهندسية للاقترانات التربيعية

98 اختبار نهاية الوحدة

قائمة المحتويات

الوحدة 3 حلُّ المعادلات 100

مشروع الوحدة: أبني منجنيقًا 101

الدرس 1 حلُّ المعادلات التربيعية بيانياً 102

الدرس 2 حلُّ المعادلات التربيعية بالتحليل (1) 109

الدرس 3 حلُّ المعادلات التربيعية بالتحليل (2) 118

الدرس 4 حلُّ المعادلات التربيعية بإكمال المربع 127

الدرس 5 حلُّ المعادلات التربيعية باستعمال القانون العام 135

الدرس 6 حلُّ معادلات خاصة 146

اختبار نهاية الوحدة 154

الوحدة 4 الهندسة الإحداثية 156

مشروع الوحدة: الهندسة الإحداثية والخريطة 157

الدرس 1 المسافة في المستوى الإحداثي 158

الدرس 2 المسافة بين نقطة ومُستقيم 168

الدرس 3 البرهان الإحداثي 177

اختبار نهاية الوحدة 186

ما أهميَّةُ هذه الوحدةِ؟

تُستعملُ المُتبايناتُ في كثيرٍ مِنَ المواقِفِ الحياتِيَّةِ والعلميَّةِ للتعبيرِ عنِ مقاديرِ ذاتِ قيمٍ مشروطةٍ، مثلِ درجةِ الحرارةِ التي يمكنُ أن تعيشَ فيها أسماكُ الزينةِ، كما تُستعملُ للتعبيرِ عنِ التكلفةِ الممكنةِ لإنتاجِ سلعةٍ ما أو الربحِ الذي يمكنُ تحقيقُهُ عندَ بيعها.

سأتعلَّمُ في هذه الوحدة:

- ◀ التعبير عن المُتبايناتِ باستعمالِ المجموعاتِ والفتراتِ.
- ◀ حلُّ مُتبايناتِ مُركَّبةٍ، وتمثيلِ مجموعةِ حلِّها على خطِّ الأعدادِ.
- ◀ حلُّ مُعادلاتِ القيمةِ المطلقةِ ومُتبايناتِها.
- ◀ تمثيلِ مُتباينةٍ خطِيَّةٍ بمتغيرينِ بيانيًا.

تعلَّمتُ سابقًا:

- ✓ حلُّ مُعادلاتِ خطِيَّةٍ بمتغيرٍ واحدٍ.
- ✓ حلُّ مُتباينةٍ خطِيَّةٍ بأكثرَ منِ خطوةٍ، وتمثيلِ حلِّها على خطِّ الأعدادِ.
- ✓ تمثيلِ المُعادلةِ الخطِيَّةِ في المُستوى الإحداثيِّ.

فكرة المشروع توظيفُ المُتبايناتِ الخطيَّةِ في مواقفٍ علميَّةٍ مختلفةٍ.



الموادُّ والأدواتُ شبكةُ الإنترنت.



خطواتُ تنفيذِ المشروعِ:

- 1 أختارُ ثلاثةَ موضوعاتٍ ممَّا يأتي، وأبحثُ في شبكةِ الإنترنتِ عنَ موقفٍ في كلِّ منها، وأعبِّرُ عنهُ باستعمالِ طريقةٍ سردِ العناصرِ وطريقةِ الصَّفَةِ المُميِّزةِ:
 - جسمُ الإنسانِ.
 - الزراعةُ.
 - الآلاتُ والأدواتُ.
 - الموادُّ الكيميائيَّةُ.
 - علومُ الأرضِ والبيئةِ.
 - الرياضةُ.
- 2 أختارُ اثنتينِ مِنَ الموضوعاتِ السابقةِ، وأبحثُ عنَ موقفٍ في كلِّ منهما يمكنُ التعبيرِ عنهُ باستعمالِ مُتباينةٍ مُركَّبةٍ.
- 3 أكتبُ مسألةً حياتيَّةً على كلِّ مِنَ الموقفيْن اللذَيْنِ اخترتُهُما في الخطوةِ السابقةِ، وأحلُّ المسألتَيْنِ باستعمالِ حلِّ المُتبايناتِ المُركَّبةِ، وأمثِّلُ الحلَّ على خطِّ الأعدادِ.
- 4 أختارُ اثنتينِ مِنَ الموضوعاتِ السابقةِ، وأبحثُ فيهما عنَ موقفيْن يُمكنُ التعبيرِ عنَ أحدهما باستعمالِ مُعادلةِ القيمةِ المطلقةِ، وعنِ الآخرِ باستعمالِ مُتباينةِ القيمةِ المطلقةِ.
- 5 أكتبُ مسألةً حياتيَّةً على كلِّ مِنَ الموقفيْن اللذَيْنِ اخترتُهُما في الخطوةِ السابقةِ، وأحلُّهُما باستعمالِ حلِّ مُعادلاتِ و مُتبايناتِ القيمةِ المُطلقةِ، وأمثِّلُ الحلَّ على خطِّ الأعدادِ.
- 6 أختارُ اثنتينِ مِنَ الموضوعاتِ السابقةِ، وأبحثُ عنَ موقفٍ في كلِّ منهما يمكنُ التعبيرِ عنهُ باستعمالِ مُتباينةٍ خطيَّةٍ بمتغيَّرينِ، ثمَّ أكتبُ مسألةً حياتيَّةً مرتبطةً بالموقفِ، وأمثِّلُ حلَّها في المُستوى الإحداثيِّ.

عرضُ النتائجِ:

- أعدُّ عرضًا تقديميًّا لجميعِ المواقفِ العلميَّةِ التي اخترتها، وأدعمُ كلاً منها بصورةٍ مناسبةٍ، وأضيفُ إلى العرضِ المسائلَ الحياتيَّةَ التي كتبتها وحلَّولها.
- أقدمُ العرضَ التقديميَّ الذي أعددتهُ أمامَ زملائي / زميلاتي.

ينبضُ قلبُ الإنسانِ منَ 60 إلى 100 نبضةٍ في الدقيقةِ في أثناءِ الراحةِ.




المجموعات والفترات

Sets and Intervals

- كتابة المجموعات باستخدام طريقتي: سرد العناصر، والصفة المميزة للمجموعة.
- التعبير عن المتباينات باستخدام الفترات.

مجموعة، عنصر، سرد العناصر، الصفة المميزة للمجموعة، المجموعة الخالية، المجموعة المفردة، المجموعة المنتهية، المجموعة غير المنتهية، رمز الفترة، الملائمة، الفترة غير المحدودة.



يُبين الشكل المجاور مواقع بعض المحافظات على خريطة المملكة الأردنية الهاشمية. ما الصفة التي تشترك فيها المحافظات التي تظهر على الخريطة؟

فكرة الدرس



المصطلحات



مسألة اليوم



المجموعة وطرائق التعبير عنها

المجموعة (set) تجمع أشياء متميزة تحمل صفة مشتركة، وتسمى كل من الأشياء التي تكون المجموعة **عنصرًا** (element)، ويمكن أن تكون عناصر المجموعة أحرفًا أو أعدادًا أو كلمات غير مكررة. فمثلاً، يُعدُّ يوم الأحد عنصرًا من عناصر مجموعة أيام الأسبوع.

تُستعمل الأحرف الكبيرة لتسمية المجموعات، مثل: A, B, C, X, Y, \dots ، وتُستعمل الأحرف الصغيرة لتسمية عناصر المجموعة، مثل: a, b, c, x, y, \dots .

إذا كان a عنصرًا من عناصر المجموعة A ، فإننا نقول إن a ينتمي إلى المجموعة A ، ونكتب ذلك على الصورة: $a \in A$ ؛ حيث يستعمل الرمز (\in) للدلالة على (ينتمي إلى). ومن ناحية أخرى إذا كان b لا ينتمي إلى المجموعة A ، فإننا نكتب ذلك على الصورة: $b \notin A$ ؛ حيث يستعمل الرمز (\notin) للدلالة على (لا ينتمي إلى).

يمكن التعبير عن المجموعة بطريقة سرد العناصر (roster form)، بحيث تُكتب عناصر المجموعة داخل رمز المجموعة $\{ \}$ ، ويُفصل بين كل عنصر وآخر بفاصلة. فمثلاً، نُعبّر عن المجموعة A ، التي عناصرها الأعداد الكليّة التي تقلُّ عن أو تُساوي 3، بطريقة سرد العناصر على الصورة: $A = \{0, 1, 2, 3\}$.

يمكن أيضاً التعبير عن المجموعة باستعمال الصّفة المُميّزة للمجموعة (set-builder notation). فمثلاً، يمكن التعبير عن المجموعة $A = \{0, 1, 2, 3\}$ بطريقة الصّفة المُميّزة $A = \{x \mid x \leq 3, x \in W\}$ ، ونقرأ: مجموعة الأعداد x ؛ حيث ينتمي x إلى مجموعة الأعداد الكليّة التي تقلُّ عن أو تُساوي 3.

زُمورٌ رياضيّةٌ

يُرمز إلى مجموعة الأعداد الكليّة بالرمز W ، وهي: $\{0, 1, 2, 3, \dots\}$ ، وهو الحرف الأول من كلمة whole باللغة الإنجليزيّة، وتعني كليّاً.

مثال 1

أعبّر عن كلٍّ من المجموعات الآتية باستعمال طريقة سرد العناصر، وطريقة الصّفة المُميّزة:

1 مجموعة الأعداد الكليّة التي تقلُّ عن 12

طريقة سرد العناصر: $E = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11\}$

طريقة الصّفة المُميّزة: $E = \{x \mid x < 12, x \in W\}$

2 مجموعة مضاعفات العدد 5 التي تقلُّ عن أو تساوي 25

طريقة سرد العناصر: $C = \{5, 10, 15, 20, 25\}$

طريقة الصّفة المُميّزة: $C = \{x \mid x = 5k, k \in W, 0 < k \leq 5\}$

3 مجموعة حلّ المُعادلة $2x - 8 = 0$

طريقة سرد العناصر: $S = \{4\}$

طريقة الصّفة المُميّزة: $S = \{x \mid 2x - 8 = 0\}$

أتعلّم

ترتيب العناصر غير مهمّ في طريقة سرد العناصر، ولا أكرّر كتابة العنصر.

أتذكّر

مضاعف العدد هو ناتج ضربه في أيّ عددٍ كُليٍّ ما عدا الصّفر.

أتحقق من فهمي

أعبر عن كلٍّ من المجموعات الآتية باستعمال طريقة سرد العناصر، وطريقة الصفة المميزة:

- (a) مجموعة الأعداد الكليّة التي تقلُّ عن 8
 (b) مجموعة مضاعفات العدد 3 التي تقلُّ عن 18
 (c) مجموعة حلّ المعادلة $3x - 2 = 0$

أنواع المجموعات

توجد عدّة أنواع للمجموعات تبعاً لعدد عناصرها، منها:

- **المجموعة الخالية** (empty set): هي المجموعة التي لا تحتوي على أيّ عنصر، ويرمزُ إليها بالرمز \emptyset (ويقرأ فاي) أو الرمز $\{ \}$ ، ومن أمثلتها مجموعة الأعداد الفردية التي تقبلُ القسمة على 2، فمن المعلوم أنه لا يوجد عددٌ فرديٌّ يقبلُ القسمة على 2
- **المجموعة المفردة** (singleton set): هي المجموعة التي تحتوي على عنصرٍ واحدٍ فقط، ومن أمثلتها مجموعة حلّ المعادلة $x + 8 = 0$ ؛ فهي تحتوي على عنصرٍ واحدٍ فقط، هو -8
- **المجموعة المنتهية** (finite set): هي المجموعة التي تحتوي على عددٍ محدّدٍ من العناصر، مثل $H = \{4, 8, \dots, 24, 28, 32\}$ ؛ حيث تحتوي على 4 عناصر.
- **المجموعة غير المنتهية** (infinite set): هي المجموعة التي تحتوي على عددٍ لا نهائيٍّ من العناصر، مثل مجموعة الأعداد الكليّة التي تزيدُ على 7، وهي: $P = \{8, 9, 10, \dots\}$

أنعلّم

تُستعملُ النقطُ الثلاثُ "... لللدلالة على أنّ المجموعة غيرُ منتهية، وتُستعملُ أيضاً لللدلالة على اختصارِ عناصرِ مجموعةٍ منتهية.

مثال 2

أكتب كلَّ مجموعةٍ مما يأتي بطريقة سرد العناصر، ثمَّ أحدّد ما إذا كانت خالية، أم مفردة، أم منتهية، أم غير منتهية:

1 $P = \{x \mid x > -3, x \in Z\}$

تمثّل P مجموعة الأعداد الصحيحة التي تزيدُ على -3 ، وتكتبُ بطريقة سرد العناصر كما يأتي:

$$P = \{-2, -1, \dots\}$$

إذن، المجموعة P غير منتهية.

رموز رياضية

يرمزُ إلى مجموعة الأعداد الصحيحة بالرمز Z ، وهي: $\{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$

أتعلّم

يُستعمل المقدار $2k + 1$ للدلالة على الأعداد الفردية حيث k عدد صحيح. فمثلاً، العدد 7 عدد فردي، ويمكن كتابته على الصورة:

$$7 = 2(3) + 1$$

2 $O = \{x \mid x = 2k + 1, k \in \mathbb{Z}\}$

تمثل O مجموعة الأعداد الصحيحة الفردية، وتكتب بطريقة سرد العناصر كما يأتي:

$$O = \{\dots, -5, -3, -1, 1, 3, 5, \dots\}$$

إذن، المجموعة O غير منتهية.

3 $D = \{x \mid 3x - 12 = 0\}$

تمثل D مجموعة حل المعادلة $3x - 12 = 0$ ، وتكتب بطريقة سرد العناصر كما يأتي:

$$D = \{4\}$$

إذن، المجموعة D مفردة.

4 $M = \{x \mid x = 3k, k \in \mathbb{W}, 0 < x < 2\}$

تمثل M مجموعة مضاعفات العدد 3، التي تقل عن 2. وبما أنه لا توجد أعداد تحقق هذه القاعدة، فالمجموعة M خالية، ويرمز إليها بالرمز \emptyset أو الرمز $\{\}$.

5 $T = \{x \mid x = \frac{1}{k}, k \in \mathbb{W}, 1 < k < 4\}$

تمثل T مجموعة مقلوب الأعداد الكلية التي تقل عن 4 وتزيد على 1، وتكتب بطريقة سرد العناصر كما يأتي:

$$T = \left\{ \frac{1}{2}, \frac{1}{3} \right\}$$

إذن، المجموعة T منتهية.

أنتحق من فهمي

أكتب كل مجموعة مما يأتي بطريقة سرد العناصر، ثم أحدد ما إذا كانت خالية، أم مفردة، أم منتهية، أم غير منتهية:

a) $P = \{x \mid x > 10, x \in \mathbb{W}\}$

b) $O = \{x \mid x = 2k, k \in \mathbb{Z}\}$

c) $D = \{x \mid 0.5x + 10 = 0\}$

d) $D = \{x \mid x < 0, x \in \mathbb{W}\}$

e) $T = \{x \mid x = k^2, k \in \mathbb{W}, k < 5\}$

المُتبايناتُ والصفةُ المميزةُ للمجموعةِ

تعلّمتُ سابقًا حلَّ المُتباينةِ الخطيَّةِ، وكانَ مِنَ الصَّعبِ كتابَةُ جميعِ القيمِ التي تحقِّقُ المُتباينةَ؛ لذا لجأتُ إلى تمثيلِ تلكِ القيمِ على خطِّ الأعدادِ، ولكنَّ استعمالَ الصِّفَةِ المُميِّزةِ للمجموعةِ يوفِّرُ طريقةً مُختصرةً للتعبيرِ عنِ مجموعةِ حلِّ المُتباينةِ.

مثال 3

أكتبُ مجموعةَ حلِّ كلِّ مُتباينةٍ ممَّا يأتي باستعمالِ الصِّفَةِ المُميِّزةِ:

1 $5x - 8 > 12$

$$5x - 8 > 12$$

المُتباينةُ الأصليَّةُ

$$5x - 8 + 8 > 12 + 8$$

بِجَمْعِ 8 لِطَرَفَيْ المُتباينةِ

$$\frac{5x}{5} > \frac{20}{5}$$

بِقِسْمَةِ طَرَفَيْ المُتباينةِ على 5

$$x > 4$$

بالتبسيطِ

إذن، مجموعةُ الحلِّ هي $\{x \mid x > 4\}$

2 $3x - 4 \geq 6x + 11$

$$3x - 4 \geq 6x + 11$$

المُتباينةُ الأصليَّةُ

$$3x - 4 + 4 \geq 6x + 11 + 4$$

بِجَمْعِ 4 لِطَرَفَيْ المُتباينةِ

$$3x - 6x \geq 6x - 6x + 15$$

بِطَرَحِ $6x$ مِنْ طَرَفَيْ المُتباينةِ

$$\frac{-3x}{-3} \leq \frac{15}{-3}$$

بِقِسْمَةِ طَرَفَيْ المُتباينةِ على -3 ، وتغييرِ اتِّجاهِ رمزِ المُتباينةِ

$$x \leq -5$$

بالتبسيطِ

إذن، مجموعةُ الحلِّ هي $\{x \mid x \leq -5\}$

أتحقِّقُ من فهمي

أكتبُ مجموعةَ حلِّ كلِّ مُتباينةٍ ممَّا يأتي باستعمالِ الصِّفَةِ المُميِّزةِ:

a) $2x + 10 \leq 14$

b) $3x + 3 < 4x - 5$

أنعلِّمُ

تدلُّ المجموعةُ

$\{x \mid x > 4\}$ على أنَّ

مجموعةُ الحلِّ هي جميعُ

الأعدادِ الحقيقيَّةِ الأكبرِ

من 4

أندكِّرُ

إذا قُسمَ (أو ضُربَ) كلُّ

من طرفي مُتباينةٍ صحيحةٍ

على عددٍ سالبٍ فيجبُ

تغييرُ اتِّجاهِ رمزِ المُتباينةِ

لجعلِ المُتباينةِ الناتجةِ

صحيحةً أيضًا.

المُتبايناتُ والفتراتُ

تعلمتُ في المثالِ السابقِ كتابةَ مجموعةِ حلِّ المُتباينةِ باستعمالِ الصِّفَةِ المُميِّزةِ للمجموعةِ، ويمكنُ أيضًا استعمالُ **رمزِ الفترةِ** (interval notation) لكتابةِ مجموعةِ حلِّ المُتباينةِ.

يُستعملُ رمزا **المالانهايةِ** (infinity) أدناه للدلالةِ على أنَّ **الفترةَ غيرَ محدودةٍ** (unbounded interval) في الاتجاهِ الموجبِ أو السالبِ.

$-\infty$

∞

يُقرأُ الرَّمزُ: المالانهايةُ السالبةُ، ويُستعملُ للدلالةِ على أنَّ الفترةَ غيرَ محدودةٍ في الاتجاهِ السالبِ.

يُقرأُ الرَّمزُ: المالانهايةُ الموجبةُ، ويُستعملُ للدلالةِ على أنَّ الفترةَ غيرَ محدودةٍ في الاتجاهِ الموجبِ.

يُستعملُ الرَّمزُ [أو الرَّمزُ] عندما يكونُ رمزُ المُتباينةِ \geq أو \leq للدلالةِ على انتماءِ طرفِ الفترةِ إليها، ويُستعملُ الرَّمزُ (أو الرَّمزُ) عندما يكونُ رمزُ المُتباينةِ $>$ أو $<$ للدلالةِ على عدم انتماءِ طرفِ الفترةِ إليها.

وفي ما يأتي تلخيصُ لأشكالِ الفتراتِ غيرِ المحدودةِ وكيفيةِ تمثيلِ كلِّ منها على خطِّ الأعدادِ:

الفتراتُ غيرَ المحدودةِ

مفهومٌ أساسيٌّ

إذا كانَ a و b عدديينِ حقيقيينِ، فيمكنُ التعبيرُ عن كلِّ من المُتبايناتِ الآتيةِ باستعمالِ فترةٍ غيرِ محدودةٍ:

المُتباينةُ	رَمزُ الفترةِ	التمثيلُ على خطِّ الأعدادِ
$x \geq a$	$[a, \infty)$	
$x > a$	(a, ∞)	
$x \leq b$	$(-\infty, b]$	
$x < b$	$(-\infty, b)$	
	$(-\infty, \infty)$	

أتعلمُ

يُستعملُ الرَّمزُ (أو الرَّمزُ) دائماً معَ المالانهايةِ، إذ إنَّ المالانهايةَ ليستُ عددًا ولا يمكنُ احتواؤها في فترةٍ.


مثال 4

أكتب كل مُتباينةٍ ممَّا يأتي باستعمالِ رمزِ الفترة، ثمَّ أمثلها على خطِّ الأعداد:

1 $x \leq 3$

رمزُ الفترة: $(-\infty, 3]$

التمثيلُ على خطِّ الأعداد:



2 $x \geq 5$

رمزُ الفترة: $[5, \infty)$


التمثيلُ على خطِّ الأعداد:



3 $x < -1$

رمزُ الفترة: $(-\infty, -1)$


التمثيلُ على خطِّ الأعداد:



4 $x > 6$

رمزُ الفترة: $(6, \infty)$

التمثيلُ على خطِّ الأعداد:



أندكّر

تُستعملُ الدائرةُ المفتوحةُ على خطِّ الأعداد إذا كانَ رمزُ المُتباينةِ $>$ أو $<$ ، أمَّا الدائرةُ المغلقةُ فتُستعملُ إذا كانَ رمزُ المُتباينةِ \leq أو \geq .

أكتب مجموعة حل كل مُتباينةٍ ممَّا يأتي باستعمالِ الصِّفَةِ المُميِّزة:

15 $7 + 6x < 19$

16 $2(y + 2) - 3y \geq -1$

17 $18x - 5 \leq 3(6x - 2)$

أكتب كل مُتباينةٍ ممَّا يأتي باستعمالِ رمزِ الفترة، ثمَّ أمثلها على خطِّ الأعداد:


18 $x < -7$

19 $x > 12$

20 $x \leq 1$


21 $x \geq -20$

أكتب المُتباينةَ الممثلةَ على خطِّ الأعدادِ في كلِّ ممَّا يأتي، ثمَّ أعبر عنها باستعمالِ رمزِ الفترة:



مهارات التفكير العليا

24 **أكتشف الخطأ:** أعاد أحمد كتابة الفترة $(-\infty, -8]$ باستعمالِ الصِّفَةِ المُميِّزة، كما هو مبين أدناه:




أبين الخطأ الذي وقع فيه أحمد، وأصحِّحه.

25 **تحدِّ:** أكتب المجموعة $D = \left\{ \frac{1}{2}, \frac{2}{5}, \frac{3}{10}, \frac{4}{17}, \frac{5}{26}, \frac{6}{37}, \frac{7}{50} \right\}$ باستعمالِ الصِّفَةِ المُميِّزة.

26 **أكتشف المُختلِف:** أيُّ ممَّا يأتي مختلف؟ أبرر إجابتي:

$x < -3$



$\{x \mid x < -3\}$

$\{ \dots, -5, -4, -3 \}$

حلُّ المُتبايناتِ المُركَّبةِ Solving Compound Inequalities

- حلُّ مُتبايناتِ مُركَّبةٍ تحتوي على أداة الرِّبطِ (و) أو (أو)، وتمثِّل مجموعةٍ حلِّها على خطِّ الأعدادِ.
- التعبيرُ عن المُتبايناتِ المُركَّبةِ باستعمالِ الفتراتِ.

فكرة الدرس



المصطلحات



مسألة اليوم



مُتباينةٌ بسيطةٌ، مُتباينةٌ مُركَّبةٌ، تقاطعٌ، اتِّحادٌ، فترةٌ محدودةٌ.
تُعَدُّ سمكةُ (النيون تيترا) من أكثرِ أسماكِ الزينةِ شهرةً، وتعيشُ في مياهٍ عذبةٍ تتراوحُ درجةُ حرارتِها من 20°C إلى 26°C . أكتبُ مُتباينةً تمثِّل درجاتِ الحرارةِ الملائمةَ للسمكةِ.

المُتباينةُ المُركَّبةُ

تُسمَّى المُتبايناتُ التي تعلَّمتها سابقًا مُتبايناتٍ بسيطةً (simple inequalities)؛ لأنَّها تحتوي على رمزٍ مُتباينةٍ واحدٍ.

المُتباينةُ المُركَّبةُ (compound inequality): هي عبارةٌ ناتجةٌ عن ربطِ مُتباينتينِ باستعمالِ أداة الرِّبطِ (و) أو مرادفها بالُّغةِ الإنجليزِيَّةِ (and) أو باستعمالِ أداة الرِّبطِ (أو) أو مرادفها بالُّغةِ الإنجليزِيَّةِ (or).

مُتباينةٌ بسيطةٌ

$$x \geq 5$$

مُتبايناتٌ مُركَّبةٌ

$$x \geq 1 \text{ and } x \leq 4$$

$$x < 0 \text{ or } x \geq 3$$


التمثُّلُ البيانيُّ للمُتباينةِ المُركَّبةِ التي تحتوي على أداة الرِّبطِ (و) هو تقاطعٌ (intersection) التمثيلين البيانيين للمُتباينتين المُكوِّنتين للمُتباينةِ المُركَّبةِ.

$$x \geq 3$$

$$x \leq 7$$

$$x \geq 3 \text{ and } x \leq 7$$


$$3 \leq x \leq 7$$



أتعلَّم

يمكنُ التعبيرُ عن تقاطعِ المُتباينةِ $x \geq 3$ والمُتباينةِ $x \leq 7$ بطريقتين؛ الأولى هي: $x \geq 3 \text{ and } x \leq 7$ ، والثانية هي: $3 \leq x \leq 7$.

التمثيل البياني للمُتباينة المركَّبة التي تحتوي على أداة الرِّبط (أو) هو اتحاد (union) التمثيلين البيانيين للمُتباينتين المكوَّنتين للمُتباينة المركَّبة.



مثال 1


اكتب مُتباينةً مركَّبةً تمثل كلَّ جملةٍ ممَّا يأتي، ثمَّ أمثلها على خطِّ الأعداد:

1 عددٌ أكبر من أو يساوي -2 وأقل من 1

أختار مُتغيرًا: ليكن x ممثلًا للعدد.

اكتب المُتباينة: $-2 \leq x < 1$

أمثل على خطِّ الأعداد:




2 عددٌ أقل من 6 أو لا يقل عن 10

أختار مُتغيرًا: ليكن y ممثلًا للعدد.

اكتب المُتباينة: $y < 6$ or $y \geq 10$

أمثل على خطِّ الأعداد:



أتحقق من فهمي

اكتب مُتباينةً مركَّبةً تمثل كلَّ جملةٍ ممَّا يأتي، ثمَّ أمثلها على خطِّ الأعداد:

(a) عددٌ أكبر من -3 وأقل من 7

(b) عددٌ على الأكثر 0 أو على الأقل 2

أندكّر

تُشير عبارة "على الأكثر" إلى الرَّمز \leq ، أما عبارة "على الأقل" فتشير إلى الرَّمز \geq

المُتباينات المركَّبة والفتراث

تعلَّمتُ في الدرسِ السابقِ كيفيةَ التعبيرِ عَنِ المُتباينةِ البسيطةِ باستعمالِ رمزِ الفترة، ويمكنُ أيضًا التعبيرُ عَنِ المُتباينةِ المركَّبةِ باستعمالِ رمزِ الفترة.

يمكنُ التعبيرُ عَنِ بعضِ المُتبايناتِ المركَّبةِ التي تحتوي على أداة الربطِ (و) باستعمالِ فترةٍ **محدودة** (bounded interval)، وهي فترةٌ لا يمتدُّ أيُّ من طرفيها إلى المالانهاية، وفي ما يأتي أشكالُ الفتراتِ المحدودةِ المختلفةِ التي تُعبَّرُ عَنِ المُتبايناتِ المركَّبةِ:

الفتراث المحدودة

مفهومٌ أساسي

إذا كانَ a و b عدديينِ حقيقيينِ؛ حيثُ $a < b$ ، فيمكنُ التعبيرُ عَنِ كُلِّ مِنَ المُتبايناتِ المركَّبةِ الآتيةِ باستعمالِ فترةٍ محدودةٍ:

المُتباينةُ	رَمَزُ الفترةِ	التمثيلُ على خطِّ الأعدادِ
$a \leq x \leq b$	$[a, b]$	
$a < x < b$	(a, b)	
$a \leq x < b$	$[a, b)$	
$a < x \leq b$	$(a, b]$	

أمَّا إذا احتوتِ المُتباينةُ المركَّبةُ على أداة الربطِ (أو)، فيمكنُ التعبيرُ عَنِ كُلِّ مِنَ المُتباينتينِ المُكوَّنتينِ لها، ثمَّ الربطُ بَيْنَ الفترتينِ باستعمالِ رمزِ الاتحادِ \cup .


مثال 2

أكتبُ كُلَّ مُتباينةٍ مُركَّبةٍ ممَّا يأتي باستعمالِ رمزِ الفترة، ثمَّ أمثلُها على خطِّ الأعدادِ:

1 $-5 \leq x \leq 5$

رمزُ الفترة: $[-5, 5]$


التمثيلُ على خطِّ الأعدادِ:



2 $x < 0$ or $x \geq 5$

اتحاد فترتين منفصلتين: $(-\infty, 0) \cup [5, \infty)$


التمثيل على خط الأعداد:



3 $6 < x \leq 10$

رمز الفترة: $(6, 10]$


التمثيل على خط الأعداد:



4 $x < -2$ or $x > 3$

اتحاد فترتين منفصلتين: $(-\infty, -2) \cup (3, \infty)$

التمثيل على خط الأعداد:



أتحقق من فهمي 

أكتب كل متباينة مركبة مما يأتي باستعمال رمز الفترة، ثم أمثلها على خط الأعداد:

a) $-10 < x \leq 10$

b) $x > 1$ or $x < -4$

c) $7 \leq x < 12$

d) $x \leq -8$ or $x \geq 8$

حل المتباينات المركبة

تعلمت سابقاً حل المتباينات البسيطة باستعمال خصائص جمع المتباينات وطرحها وضربها وقسمتها، ويمكن تطبيق الخصائص ذاتها لحل المتباينات المركبة التي تحتوي على أداة الربط (و).

أتعلم

$(-\infty, 0) \cup [5, \infty)$

ليست فترة، وإنما اتحاد

الفترتين المنفصلتين

$(-\infty, 0)$ و $[5, \infty)$

مثال 3

أجد مجموعة حل كل متباينة مما يأتي، ثم أمثلها على خط الأعداد:

أتعلم

مجموعة حل المتباينة المركبة التي تحتوي على أداة الربط (و)، هي مجموعة الأعداد التي تحقق المتباينتين المكونتين للمتباينة المركبة معاً. فمثلاً، $1 < x \leq 4$ هي مجموعة الأعداد التي تحقق المتباينتين $x > 1$ و $x \leq 4$ معاً.

1 $-4 < x - 5 \leq -1$

$$-4 < x - 5 \leq -1$$

المتباينة المعطاة


$$-4 + 5 < x - 5 + 5 \leq -1 + 5$$

بإضافة 5 إلى كل طرف

$$1 < x \leq 4$$

بالتبسيط

إذن، مجموعة الحل هي: $\{x \mid 1 < x \leq 4\}$ ، ويمكن كتابتها باستعمال رمز الفترة على الصورة: $(1, 4]$ ، ويمكن تمثيلها على خط الأعداد على النحو الآتي:



2 $-3 < -2x + 1 < 9$

$$-3 < -2x + 1 < 9$$

المتباينة المعطاة

$$-3 - 1 < -2x + 1 - 1 < 9 - 1$$

ب طرح 1 من كل طرف

$$-4 < -2x < 8$$

بالتبسيط

$$\frac{-4}{-2} > \frac{-2x}{-2} > \frac{8}{-2}$$

بقسمة كل طرف على -2، وتغيير اتجاه رمز المتباينة


$$2 > x > -4$$

بالتبسيط

$$-4 < x < 2$$

بإعادة كتابة المتباينة

إذن، مجموعة الحل هي: $\{x \mid -4 < x < 2\}$ ، ويمكن كتابتها باستعمال رمز الفترة على الصورة: $(-4, 2)$ ، ويمكن تمثيلها على خط الأعداد على النحو الآتي:



أتحقق من فهمي

أجد مجموعة حل كل متباينة مما يأتي، ثم أمثلها على خط الأعداد:

a) $-5 < x - 4 < 2$

b) $-2 < -3x - 8 \leq 10$

يمكن أيضاً حل المتباينات المركبة التي تحتوي على أداة الربط (أو) باستعمال خصائص المتباينات.

مثال 4

أجد مجموعة حل كل متباينة مما يأتي، ثم أمثلها على خط الأعداد:

1 $2x + 3 < 5$ or $x + 7 > 11$

$2x + 3 < 5$ or $x + 7 > 11$ المتباينة المُعطاة


$2x + 3 - 3 < 5 - 3$ $x + 7 - 7 > 11 - 7$ بالطرح

$2x < 2$ $x > 4$ بالتبسيط

$\frac{2x}{2} < \frac{2}{2}$ بالقسمة

$x < 1$ or $x > 4$ بالتبسيط

إذن، مجموعة الحل هي $\{x \mid x < 1 \text{ or } x > 4\}$ ، ويمكن كتابتها باستعمال اتحاد فترتين منفصلتين على الصورة: $(-\infty, 1) \cup (4, \infty)$ ، ويمكن تمثيلها على خط الأعداد على النحو الآتي:



2 $-3x + 4 < 19$ or $7x - 3 > 18$

$-3x + 4 < 19$ or $7x - 3 > 18$ المتباينة المُعطاة


$-3x + 4 - 4 < 19 - 4$ $7x - 3 + 3 > 18 + 3$ بالطرح أو الجمع

$-3x < 15$ $7x > 21$ بالتبسيط

$\frac{-3x}{-3} > \frac{15}{-3}$ $\frac{7x}{7} > \frac{21}{7}$ بالقسمة

$x > -5$ or $x > 3$ بالتبسيط

مجموعة حل المتباينة هي اتحاد المتباينتين. إذن، أمثل كلاً من المتباينتين الآتيتين، ثم أجد اتحاد التمثيلين:



أتعلم

تكون المتباينة المركبة التي تحتوي على أداة الربط (و) صحيحة إذا كانت المتباينتان المكونتان لها صحيحتين، أما المتباينة المركبة التي تحتوي على أداة الربط (أو) فتكون صحيحة إذا كانت إحدى المتباينتين المكونتين لها على الأقل صحيحة.

أتعلم

عند إيجاد مجموعة حل متباينة مركبة تحتوي على أداة الربط (أو)، يُفضل تمثيل كل متباينة على حدة، ثم إيجاد اتحاد التمثيلين البيانيين، لا سيما عند تغيير اتجاه رمز المتباينة، أو إذا كان للمتباينتين الأصليتين الاتجاه نفسه.

ألاحظ أن التمثيل البياني للمُتباينة $x > -5$ يحتوي على جميع نقاط التمثيل البياني للمُتباينة $x > 3$ ؛ لذا يكون الاتحاد هو التمثيل البياني للمُتباينة $x > -5$ ، وتكون مجموعة الحل $\{x \mid x > -5\}$ ، ويمكن كتابتها باستعمال رمز الفترة على الصورة: $(-5, \infty)$.

أتحقق من فهمي

أجد مجموعة حل كل مُتباينة مما يأتي، ثم أمثلها على خط الأعداد:

a) $x + 2 \leq 5$ or $x - 4 \geq 2$

b) $-2x + 7 \leq 13$ or $5x + 12 < 37$

يمكن استعمال المُتباينات لحل كثير من التطبيقات الحياتية.

مثال 5: من الحياة



درجة الحرارة: تتراوح درجة حرارة مُحرك سيارَة في أثناء تشغيله من 90°C إلى 110°C . أكتب مُتباينة مُركَّبة تمثِّل درجة حرارة مُحرك السيارة في أثناء تشغيله وأمثلها على خط الأعداد، ثم أحوِّل المُتباينة إلى الدرجة الفهرنهايتية. علماً أن $^\circ\text{C} = \frac{5}{9} (^\circ\text{F} - 32)$.

أختار مُتغيراً: ليكن C ممثلاً لدرجة حرارة المُحرك بالسلسيوس.

أكتب المُتباينة: $90 \leq C \leq 110$

أمثل على خط الأعداد:



ليكن F ممثلاً لدرجة الحرارة بالفهرنهايت، ومنه:

$90 \leq C \leq 110$

المُتباينة

$90 \leq \frac{5}{9} (F - 32) \leq 110$

بالتعويض عن C بـ $\frac{5}{9} (F - 32)$

$162 \leq F - 32 \leq 198$

بضرب كل طرف بـ $\frac{9}{5}$

$194 \leq F \leq 230$

بجمع 32 لكل طرف

إذن، تتراوح درجة حرارة المُحرك في أثناء التشغيل من 194°F إلى 230°F

معلومة



يتكوّن نظام تبريد مُحرك السيارة من مضخة تدفع الماء ذهاباً وإياباً بين المُحرك والمشعّ (الرديتر)، الذي يظهر في الصورة أعلاه.

أتحقق من فهمي



درجة الحرارة: إذا عَلِمْتُ أَنَّ درجة حرارة الجسم الطبيعية للأشخاص البالغين تتراوح من 36.1°C إلى 37.2°C ، فأكتب مُتباينةً مُركَّبةً تمثل درجة حرارة الشخص البالغ وأمثلها على خطِّ الأعداد، ثمَّ أحوّل المُتباينة إلى الدرجة الفهرنهايتية. علمًا أنَّ $^{\circ}\text{C} = \frac{5}{9} (^{\circ}\text{F} - 32)$

أدرب وأحل المسائل

أكتب مُتباينةً مُركَّبةً تمثل كلَّ جملةٍ ممَّا يأتي، ثمَّ أمثلها على خطِّ الأعداد:

- 1 عدد أكبر من -7 وأقل من 2
- 2 عدد أقل من أو يساوي -5 أو أكبر من 12
- 3 عدد يقل عن 10 ويزيد على -10
- 4 عدد على الأكثر -2 أو على الأقل 9
- 5 ناتج ضرب عدد في -5 أكبر من 35 أو أقل من 10
- 6 عدد مطروح منه 8 لا يزيد على 4 ولا يقل عن 5

أكتب كلَّ مُتباينةٍ مُركَّبةٍ ممَّا يأتي باستعمالِ رمزِ الفترة، ثمَّ أمثلها على خطِّ الأعداد:

- 7 $x \geq 4$ or $x \leq -7$
- 8 $-2 < x < 4$
- 9 $x < 2$ or $x \geq 15$
- 10 $-5 \leq x \leq 10$

أكتب مُتباينةً مُركَّبةً تعبّر عن كلِّ تمثيلٍ على خطِّ الأعداد ممَّا يأتي، ثمَّ أعبر عنها برمزِ الفترة:

- 11
- 12
- 13
- 14

أجد مجموعة حل كل متباينة مما يأتي، ثم أمثلها على خط الأعداد:

15 $-5 < x + 1 < 4$

16 $\frac{1}{2} < \frac{3x - 1}{4} \leq 5$

17 $-9 < 3x + 6 \leq 18$

18 $x + 1 < -3$ or $x - 2 > 0$

19 $2r + 3 < 7$ or $-r + 9 \leq 2$


20 $2n + 11 \leq 13$ or $-3n \geq -12$



21 **سُعرات حراريّة:** إذا عَلِمْتُ أَنَّ حاجة الرياضيِّ مِنَ الطّاقة تعتمدُ على عواملٍ عدّة، مِنْ أهمّها كتلته وسرعة التمرين، وكان رياضيٌّ يحتاجُ يومياً من 3000 إلى 4500 سعرة حراريّة، فأكتبُ متباينةً تمثّل السُّعرات الحراريّة التي يحتاجُ إليها الرياضيُّ، وأمثلها على خطّ الأعداد.

مهارات التفكير العليا

تبرير: إذا كان مجموع طولَي أيّ ضلعين في المثلث أكبر من طولِ الضلع الثالث، فاستعمل هذه الحقيقة للإجابة عن السؤالين الآتيين تبعاً:



22 هل يمكن أن تكون قيمة x في المثلث المُجاوِر 1 cm؟ أبررُ إجابتي.

23 استعمل المثلث المُجاوِر لكتابة متباينة تحدّد قيم x المُمكنة، وأبررُ إجابتي.

24 **أكتشف الخطأ:** ناتج تقريب العدد x إلى أقرب 100 هو 400. تقولُ عبيّرُ إنَّ المتباينة $395 \leq x < 405$ تعبّر عن جميع قيم x المُحتملة، وتقولُ لمياءُ إنَّ المتباينة $350 \leq x < 450$ تعبّر عن جميع قيم x المُحتملة. أيُّهما إجابتها صحيحة؟ أبررُ إجابتي.

تبرير: أجد مجموعة حل كل متباينة مما يأتي، وأبررُ إجابتي:

25 $-1 + x < 3$ or $-x \geq -4$

26 $3x - 7 \geq 5$ and $2x + 6 \leq 12$

حلُّ مُعادلاتِ القيمةِ المُطلقةِ ومُتبايناتها Solving Absolute-Value Equations and Inequalities

حلُّ مُعادلاتِ القيمةِ المُطلقةِ ومُتبايناتها.

مُعادلةُ القيمةِ المُطلقةِ، مُتباينةُ القيمةِ المُطلقةِ.



استعملتُ مريمُ 8 g من مادّةٍ كيميائيّةٍ في تجربةٍ علميّةٍ. إذا كان الميزانُ المخبريُّ الَّذي استعملتهُ مريمُ يحدّدُ الكتلةَ بهامشٍ خطأً لا يتجاوزُ ± 0.1 g، فأكتبُ مُتباينةَ قيمةٍ مُطلقةٍ تحدّدُ الكتلةَ الحقيقيّةَ للمادّةِ الّتي استعملتها.

فكرةُ الدرسِ



المصطلحاتُ



مسألةُ اليومِ



مقاديرُ القيمةِ المُطلقةِ

تعلمتُ سابقاً أنّ المقدارَ الجبريَّ هو عبارةٌ تحتوي مُتغيّراتٍ وأعداداً تفصلُ بينها عمليّاتٌ.

ويمكنُ أن يتضمّنَ المقدارُ الجبريُّ قيمةً مُطلقةً. ولإيجادِ قيمتهِ، أعوضُ قيمةَ المُتغيّرِ الَّذي يحتويه، ثمّ أتبعُ أولوياتِ العمليّاتِ.

مثال 1

أجدُ قيمةَ كلِّ من المقدارينِ الجبريينِ الآتيةِ عندَ القيمةِ المُعطاةِ:

1 $|x + 3| - 8, x = 2$

$$|x + 3| - 8 = |2 + 3| - 8$$

$$= |5| - 8$$

$$= 5 - 8$$

$$= -3$$

بتعويض $x = 2$

$$2 + 3 = 5$$

$$|5| = 5$$

بالتبسيط

أتعلمُ

لإيجادِ قيمةِ مقدارٍ جبريٍّ يتضمّنُ قيمةً مُطلقةً أُجري العمليّاتِ الحسابيّةِ داخلَ القيمةِ المُطلقةِ أولاً.

2 $10 - |5 - 2x|, x = 7$

$$\begin{aligned}
 10 - |5 - 2x| &= 10 - |5 - 2(7)| && \text{بتعويض } x = 7 \\
 &= 10 - |5 - 14| && 2(7) = 14 \\
 &= 10 - |-9| && 5 - 14 = -9 \\
 &= 10 - 9 && |-9| = 9 \\
 &= 1 && \text{بالتبسيط}
 \end{aligned}$$

أتحقق من فهمي 

أجد قيمة كل من المقادير الجبرية الآتية عند القيمة المُعطاة:

a) $|x - 2| + 10, x = -4$

b) $-2|3x + 1|, x = -1$

مُعادلات القيمة المطلقة

مُعادلة القيمة المطلقة (absolute value equation) هي مُعادلة تحتوي على قيمة مُطلقة. وبما أن القيمة المطلقة لكل من العدد ومعكوسه متساويتان، فيمكن تحويل مُعادلة القيمة المطلقة إلى مُعادلتين مُرتبطتين بها لا تحتويان على رمز القيمة المطلقة، وذلك بجعل العبارة التي داخل القيمة المطلقة موجبة مرةً وسالبةً مرةً أُخرى.

أذكر

القيمة المطلقة للعدد هي المسافة بين ذلك العدد والصفر على خط الأعداد.

حل مُعادلات القيمة المطلقة

مفهوم أساسي

لحل المُعادلة $|ax + b| = c$ ؛ حيث $c \geq 0$ ، أحل المُعادلتين المُرتبطتين بها، وهما:

$$ax + b = c \quad \text{or} \quad ax + b = -c$$

مثال 2


أحلُّ كلاً من المعادلات الآتية، وأمثلة مجموعة الحل على خط الأعداد (إن أمكن):

1 $|x - 8| = 2$

$x - 8 = 2$ or $x - 8 = -2$ بكتابة المعادلتين المرتبطتين

$x = 10$ $x = 6$ بجمع 8 لكل طرف

إذن، مجموعة حل المعادلة هي: $\{6, 10\}$ ، وتمثيلها على خط الأعداد على النحو الآتي:



أنعلّم

تعني المعادلة $|x - 8| = 2$ أن المسافة بين x و 8 تساوي 2 وحدة.

2 $2|x - 4| + 10 = 16$

لحل هذه المعادلة، أكتب القيمة المطلقة أولاً معزولة في أحد طرفي المعادلة.

$2|x - 4| + 10 = 16$ المعادلة المعطاة

$2|x - 4| = 6$ ب طرح 10 من طرفي المعادلة


$|x - 4| = 3$ بقسمة طرفي المعادلة على 2

الآن، أكتب معادلتين مرتبطتين بالمعادلة $|x - 4| = 3$ ، ثم أحل كلاً منهما.

$x - 4 = 3$ or $x - 4 = -3$ بكتابة المعادلتين المرتبطتين

$x = 7$ $x = 1$ بجمع 4 لكل طرف

إذن، مجموعة حل المعادلة هي: $\{1, 7\}$ ، وتمثيلها على خط الأعداد على النحو الآتي:



3 $|3x + 1| = -5$

المعادلة $|3x + 1| = -5$ تعني أن المسافة بين $3x$ و -1 تساوي -5 وبما أنه لا يمكن أن تكون المسافة سالبة، فإن مجموعة حل هذه المعادلة \emptyset ؛ أي أنه لا يوجد حل للمعادلة.

أتحقق من فهمي

أحلُّ كلاً من المعادلات الآتية، وأمثل مجموعة الحل على خط الأعداد (إن أمكن):

a) $|x - 7| = 5$


b) $4|2x + 7| = 16$

c) $|x + 4| = -10$

متباينات القيمة المطلقة

متباينة القيمة المطلقة (absolute value inequality) هي متباينة تحتوي على قيمة مطلقة.

فمثلاً، $|x| \leq 5$ هي متباينة قيمة مطلقة، وتعني أن المسافة بين x و 0 أقل من أو تساوي 5 ؛ لذا فإن $x \leq 5$ و $x \geq -5$



وبذلك، فإن مجموعة حل هذه المتباينة هي الفترة $[-5, 5]$.

وبشكل عام، يمكن تحويل متباينة القيمة المطلقة، التي تحتوي على الرمز $(<)$ ، إلى متباينة مركبة تحتوي على أداة الربط $(و)$ ، ثم حل المتباينة المركبة الناتجة.

حل متباينات القيمة المطلقة $(<)$

مفهوم أساسي

لحل المتباينة $|ax + b| < c$ ؛ حيث $c > 0$ ، أحل المتباينة المركبة المرتبطة بها، وهي:

$$-c < ax + b < c$$

تبقى القاعدة صحيحة إذا احتوت المتباينة على (\leq)

مثال 3

أحلُّ كلاً من المُتباينات الآتية، وأمثُل مجموعة الحلِّ على خطِّ الأعداد (إن أمكن):

1 $|x + 5| < 9$


$$-9 < x + 5 < 9$$

المُتباينة المُركَّبة المُرتبطة

$$-14 < x < 4$$

بطرح 5 من كلِّ طرفٍ

إذن، مجموعة حلِّ المُتباينة هي $\{x \mid -14 < x < 4\}$ ، ويمكنُ كتابتها باستعمالِ رمزِ الفترة على الصورة: $(-14, 4)$ ، ويمكنُ تمثيلها على خطِّ الأعداد على النحو الآتي:



2 $-4|x + 3| - 2 \geq 6$

لحلِّ هذه المُتباينة، أكتبُ أولاً مقدارَ القيمة المُطلقة معزولاً في أحدِ طرفي المُتباينة.

$$-4|x + 3| - 2 \geq 6$$

المُتباينة المُعطاة

$$-4|x + 3| \geq 8$$

بجمع 2 لطرفي المُتباينة

$$|x + 3| \leq -2$$

يقسمُ طرفي المُتباينة على -4، وتغيِّر اتجاهِ رمزِ المُتباينة

بما أنَّ $|x + 3|$ لا يمكنُ أن تكونَ سالبةً، فلا يمكنُ أن تكونَ $|x + 3|$ أقلَّ من -2، ومنه فإنَّ مجموعة حلِّ هذه المُتباينة \emptyset ؛ أيَّ أنه لا يوجدُ حلٌّ للمُتباينة المُعطاة.

أتحقِّقُ مِن فهمي

أحلُّ كلاً من المُتباينات الآتية، وأمثُل مجموعة الحلِّ على خطِّ الأعداد (إن أمكن):

a) $|x - 2| \leq 1$

b) $|x + 7| + 10 < 2$

أتعلَّم


المُتباينة $|x + 5| < 9$ تعني أن المسافة بين x و -5 أقلُّ من 9 وحدات.

أندجُر

يُستعملُ الرَّمزُ [أو الرَّمزُ] للدلالة على انتماء طرفِ الفترة إليها، أمَّا الرَّمزُ (أو الرَّمزُ) فيُستعملُ للدلالة على عدم انتماء طرفِ الفترة إليها.

الوحدة 1

تعني مُتباينة القيمة المطلقة $|x| > 5$ أن المسافة بين x و 0 أكبر من 5؛ لذا فإن $x > 5$ أو $x < -5$



وبذلك، فإن مجموعة حل هذه المُتباينة هي $(-\infty, -5) \cup (5, \infty)$

وبشكلٍ عام، يمكن تحويل مُتباينة القيمة المطلقة، التي تحتوي على الرمز $(>)$ ، إلى مُتباينة مُركبة تحتوي على أداة الربط (أو)، ثم حل المُتباينة المُركبة الناتجة.

حل مُتباينات القيمة المطلقة ($>$)

مفهوم أساسي

لحل المُتباينة $|ax + b| > c$ ؛ حيث $c > 0$ ، أحل المُتباينة المُركبة المُرتبطة بها، وهي:

$$ax + b < -c \quad \text{or} \quad ax + b > c$$

تبقى القاعدة صحيحة إذا احتوت المُتباينة على (\geq)

مثال 4

أحلُّ كلاً من المُتباينات الآتية، وأمثُل مجموعة الحل على خطِّ الأعداد (إن أمكن):


1 $|2x + 1| \geq 5$

$$2x + 1 \leq -5 \quad \text{or} \quad 2x + 1 \geq 5 \quad \text{المُتباينة المُركبة المُرتبطة}$$

$$2x \leq -6 \quad \quad \quad 2x \geq 4 \quad \text{ب طرح 1 من كُلِّ طَرَفٍ}$$

$$x \leq -3 \quad \text{or} \quad x \geq 2 \quad \text{بِقسمة كُلِّ طَرَفٍ على 2}$$

إذن، مجموعة الحل هي $\{x \mid x \leq -3 \text{ or } x \geq 2\}$ ، ويمكن كتابتها باستعمال اتحاد فترتين منفصلتين على الصورة: $(-\infty, -3] \cup [2, \infty)$ ، وتمثيلها البياني على النحو الآتي:



2 $|4x + 8| \geq -3$

يُنصُّ تعريفُ القيمةِ المُطلقةِ على أنَّ مقدارها يجبُ أن يكونَ أكبرَ من أو يساوي صفرًا،
وَمِنْهُ فَإِنَّ $|4x + 8|$ دائِمًا أكبرُ من -3 لأيِّ من قيمِ المُتغيِّرِ x
إذَنْ، مَجْموعَةُ الحَلِّ هِيَ مَجْموعَةُ الأعدادِ الحَقِيقِيَّةِ R ، ويمكنُ كتابتها باستعمالِ رمزِ الفترةِ
على الصورةِ: $(-\infty, \infty)$.

أتحققُ من فهمي

أحلُّ كُلاً من المُتبايناتِ الآتيةِ، وأمثُلُ مجموعةِ الحَلِّ على خطِّ الأعدادِ (إن أمكنَ):

a) $|x - 3| \geq 4$

b) $|10 - x| > -5$

يمكنُ استعمالُ المُتبايناتِ في كثيرٍ من التطبيقاتِ الحياتيةِ.

مثال 5: من الحياة



صناعة: يُنتجُ مصنعُ رؤوسِ مثاقِبِ طُولِ قُطْرِها المثاليُّ 0.625 cm ، وَيُسَمَّحُ أَنْ يَزِيدَ طُولُ هَذَا القُطْرِ أَوْ يَقِلَّ
بمقدارٍ لا يتجاوزُ 0.005 cm ، أكتبُ مُتباينةَ قيمةٍ مُطلقةٍ
أجدُ بِها المَدَى المسموحَ به لطولِ قُطْرِ رأسِ المِثْقَبِ.
بالكلمات: الفرقُ بينَ طُولِ القُطْرِ الحَقِيقِيِّ وطُولِ القُطْرِ
المثاليِّ لا يتجاوزُ 0.005

أختارُ مُتغيِّرًا: ليكنَ x ممثلًا طُولَ قُطْرِ رأسِ المِثْقَبِ.

أكتبُ المُتباينةَ: $|x - 0.625| \leq 0.005$

$|x - 0.625| \leq 0.005$ المُتباينةُ

$-0.005 \leq x - 0.625 \leq 0.005$ المُتباينةُ المُركَّبةُ المُرتبطةُ

$0.62 \leq x \leq 0.63$ بجمع 0.625 لكلِّ طرفٍ

إذَنْ، المَدَى المسموحُ به لطولِ قُطْرِ رأسِ المِثْقَبِ هُوَ $[0.62, 0.63]$ بوحدَةِ cm

رُموزُ رِياضِيَّة

يُرمَزُ إلى مَجْموعَةِ
الأعدادِ الحَقِيقِيَّةِ بالحرفِ
 R ، وَهُوَ الحرفُ الأوَّلُ
مِنَ كَلِمَةِ Real باللغةِ
الإِنجِلِيزِيَّةِ، وتَعْنِي
"حَقِيقِيًّا".

معلومة

توجدُ في بعضِ المثاقِبِ
خاصيةُ الاهتزازِ في أثناءِ
الدورانِ؛ ما يساعِدُ على ثَقَبِ
الجدرانِ الخرسانيةِ بسهولةٍ.

أتحقق من فهمي

صناعة: إذا عُلِمْتُ أَنَّ طَوَلَ القُطْرِ المِثَالِيَّ لِأَحَدِ المِكبَسِ الأُسْطُوَانِيَّةِ فِي مُحَرَّكَاتِ السِيَّارَاتِ 90 mm، وَيُسْمَحُ أَنْ يَزِيدَ طَوْلُ هَذَا القُطْرِ أَوْ يَقَلَّ بِمِقْدَارٍ لَا يَتَجَاوَزُ 0.008 mm، فَأَكْتُبْ مُتَبَايِنَةَ قِيَمَةٍ مُطْلَقَةٍ أَجْدُ بِهَا المَدَى المِسمُوحَ بِهِ لَطَوْلِ قُطْرِ المِكبَسِ.

أتدرب وأحلُّ المسائل

أجدُ قِيَمَةً كُلِّ مِنَ المِقادِيرِ الجِبرِيَّةِ الآتِيَةِ عِنْدَ القِيَمَةِ المُعْطَاةِ:

1 $|5x + 2| + 1, x = -3$

2 $|14 - x| - 18, x = 1$

3 $-3|3x + 8| + 5, x = -4$

أحلُّ كُلًّا مِنَ المُعادَلاتِ الآتِيَةِ، وَأُمَثِّلُ مِجْمُوعَةَ الحَلِّ عَلى خَطِّ الأَعْدَادِ (إِنْ أُمِكنَ):

4 $|x + 3| = 7$

5 $|x - 8| = 14$

6 $|-3x| = 15$

7 $|3x + 2| + 2 = 5$

8 $|2x - 4| - 8 = 10$

9 $-4|8 - 5x| = 16$

أحلُّ كُلًّا مِنَ المُتَبَايِناتِ الآتِيَةِ، وَأُمَثِّلُ مِجْمُوعَةَ الحَلِّ عَلى خَطِّ الأَعْدَادِ (إِنْ أُمِكنَ):

10 $|x + 8| \leq 3$

11 $|2x - 5| < 9$

12 $|3x + 1| > 8$

13 $|3x - 1| + 6 > 0$

14 $2|3x + 8| - 13 \leq -5$

15 $-3|2 - 4x| + 5 < -13$

16 $|6x + 2| < -4$

17 $3|5x - 7| - 6 < 24$

18 $|5x + 3| - 4 \geq 9$

أَكْتُبُ مُتَبَايِنَةً تُمَثِّلُ كُلَّ جُمْلَةٍ مِمَّا يَأْتِي، ثُمَّ أُمَثِّلُهَا عَلى خَطِّ الأَعْدَادِ:

20 المسافةُ بَيْنَ عَدَدِي 3 وَأَقَلِّ مِنْ أَوْ تُساوِي 4

19 المسافةُ بَيْنَ عَدَدِي وَالصُّفْرِ أَكْبَرُ مِنْ 7





21 **صناعة:** إذا عَلِمْتُ أَنَّ مَصْنَعًا يُنتِجُ عِلْبَ بسكويتٍ كتلة العلبه المثاليه 454 g، وكان مراقبُ الجوده يستثني العلبه التي تزيد على الكتله المثاليه أو تنقص عنها بمقدار 5 g، فأكتبُ مُتباينه قيمه مُطلقه أجدُ بها المدى المسموح به لِكْتَلِ عِلْبِ البسكويت.






22 **كرة قدم:** إذا كانت الكتله المثاليه الموصى بها لكره القدم 430 g، وكان مسموحًا أن تزيد على الكتله المثاليه أو تنقص عنها بمقدار 20 g، فأكتبُ مُعادله قيمه مُطلقه لإيجاد أكبر وأقل كتله مسموح بها لكره القدم، ثم أحلها.

مهارات التفكير العليا

تبرير: أكتب مُعادله قيمه مُطلقه تُعبّر عن كُلّ تمثيل على خط الأعداد مما يأتي:



تبرير: أكتب مُتباينه قيمه مُطلقه تُعبّر عن كُلّ تمثيل على خط الأعداد مما يأتي، وأبررُ إجابتي:



27 **تبرير:** يُبين الشكل المجاور مثلثًا ومُستطيلًا الفرق بين مساحتيهما أقل من 2 وحده مُربعه. أكتب مُتباينه قيمه مُطلقه تمثل الجملة السابقه وأحلها، وأبررُ إجابتي.

28 **نَحْد:** أحل المُتباينه المُركبه الآتية: $|x - 3| < 4$ and $|x + 2| > 8$

تمثيل المتباينات الخطية بمتغيرين بيانياً

Graphing Linear Inequalities in Two Variables

تمثيل متباينة خطية بمتغيرين بيانياً.

فكرة الدرس



المتباينة الخطية بمتغيرين، منطقة الحلول الممكنة، المُستقيم الحُدودي.

المصطلحات



مسألة اليوم



تعمل شركة على تجميع نوعين مختلفين من أجهزة المايكروويف. إذا كان تجميع الجهاز الواحد من النوع الأول يحتاج إلى ساعتين، وتجميع الجهاز الواحد من النوع الثاني يحتاج إلى 1.5 ساعة، وكان الحد الأقصى لعدد ساعات العمل أسبوعياً 80 ساعة، فأكتب متباينة خطية بمتغيرين تمثل عدد أجهزة المايكروويف التي يمكن للشركة تجميعها أسبوعياً من كل نوع.

المتباينات الخطية بمتغيرين

المتباينة الخطية بمتغيرين (linear inequality in two variables) هي متباينة يمكن كتابتها على إحدى الصور الآتية:

$$ax + by < c \quad ax + by \leq c \quad ax + by > c \quad ax + by \geq c$$

حيث a, b, c أعداد حقيقية، و a و b لا يساويان صفراً، وحل المتباينة الخطية بمتغيرين هو مجموعة جميع الأزواج المرتبة (x, y) ، التي تجعل المتباينة صحيحة عند تعويض إحداثياتها في المتباينة.

أتعلم

لكل متباينة خطية معادلة خطية مرتبطة بها. فمثلاً، $x + 2y > 1$ هي متباينة خطية، و $x + 2y = 1$ هي المعادلة الخطية المرتبطة بها.

مثال 1

أحدّد إذا كان كل زوج مرتّب مما يأتي يمثل حلاً للمتباينة $3x + y < 7$:

1 $(-3, 1)$

أعوّض الزوج المرتّب $(-3, 1)$ في المتباينة:

$$3x + y < 7$$

المتباينة المعطاة

$$3(-3) + 1 < 7$$

بتعويض $x = -3, y = 1$

$$-8 < 7 \quad \checkmark$$

النتيجة صحيحة

ألاحظ عند تعويض الزوج المرتّب في المتباينة أن الناتج يكون صحيحاً.

إذن، الزوج المرتّب $(-3, 1)$ هو أحد الحلول الممكنة للمتباينة.

2 (2, 4)

أعوّض الزوج المرتب (2, 4) في المتباينة:

$$3x + y < 7$$

المتباينة المعطاة

$$3(2) + 4 \stackrel{?}{<} 7$$

بتعويض $x = 2, y = 4$

$$10 < 7 \quad \times$$

النتيجة غير صحيحة

ألاحظ عند تعويض الزوج المرتب في المتباينة أن الناتج لا يكون صحيحًا.

إذن، الزوج المرتب (2, 4) ليس أحد الحلول الممكنة للمتباينة.

3 (0, 2)

أعوّض الزوج المرتب (0, 2) في المتباينة:

$$3x + y < 7$$

المتباينة المعطاة

$$3(0) + 2 \stackrel{?}{<} 7$$

بتعويض $x = 0, y = 2$

$$2 < 7 \quad \checkmark$$

النتيجة صحيحة

ألاحظ عند تعويض الزوج المرتب في المتباينة أن الناتج يكون صحيحًا.

إذن، الزوج المرتب (0, 2) هو أحد الحلول الممكنة للمتباينة.

أتحقق من فهمي 

أحد ما إذا كان كل زوج مرتب مما يأتي يمثل حلًا للمتباينة $-2x + 3y \geq 3$:

a) (4, 1)

b) (-1, 2)

c) (0, 1)


تمثيل المتباينات الخطية بمتغيرين بيانياً

ألاحظ من المثال السابق أن مجموعة حل المتباينة الخطية بمتغيرين تتكوّن من عدّة أزواج مرتّبة تحقّق المتباينة، وعند تمثيل المتباينة الخطية بمتغيرين بيانياً في المستوى الإحداثي، فإنّ النقاط التي تمثّل جميع حلولها الممكنة تُسمّى **منطقة الحلّ الممكنة (feasible region)**، ويُسمّى المستقيم الذي يُقسّم المستوى الإحداثي إلى جزأين، أحدهما منطقة الحلّ الممكنة، **المستقيم الحدودي (boundary line)**.


أتعلّم

يُقسّم المستقيم الحدودي للمتباينة المستوى الإحداثي قسمين؛ أحدهما منطقة الحلّ الممكنة.

وقد يكون المستقيم الحدودي جزءاً من منطقة الحلّ الممكنة إذا تضمّنت المتباينة الرّمز \leq أو الرّمز \geq ، وعندئذ يُرسم المستقيم الحدودي متصلاً.



وقد لا يكون المستقيم الحدودي جزءاً من منطقة الحلّ الممكنة إذا تضمّنت المتباينة الرّمز $<$ أو الرّمز $>$ ، عندئذ يُرسم المستقيم الحدودي متقطعاً.



تمثيل المتباينات الخطية بمتغيرين بيانياً

لتمثيل المتباينات الخطية بمتغيرين بيانياً، اتبع الخطوات الآتية:

الخطوة 1: أرسم منحنى المعادلة المرافقة للمتباينة بأن أستخدم رمز المساواة (=) بدلاً من الرمز (>, <, ≥, ≤)؛ حيث تمثل المعادلة الناتجة المستقيم الحدودي.

الخطوة 2: أختار نقطة لا تقع على المستقيم الحدودي، ثم أعوضها في المتباينة الخطية لتحديد ما إذا كانت تمثل حلاً للمتباينة أم لا.

الخطوة 3: إذا كانت النقطة تحقق المتباينة؛ أي تنجم عنها نتيجة صحيحة، فأظلل الجزء من المستوى الإحداثي الذي تقع فيه تلك النقطة، وإذا لم تكن كذلك فأظلل الجزء الآخر الذي لا تقع فيه تلك النقطة.

أندكز

بما أنه يمكن تمثيل المستقيم بنقطتين، فإن أسهل طريقة لتمثيل المعادلة الخطية هي إيجاد نقطتي تقاطع المستقيم مع المحورين الإحداثيين، إن أمكن.

مثال 2



أمثل المتباينة الخطية $2y - x < 2$ في المستوى الإحداثي.

الخطوة 1: أمثل المستقيم الحدودي.

أمثل المستقيم الحدودي $2y - x = 2$ ، وأنشئ جدول قيم يبين نقاط تقاطع المستقيم مع المحورين.

x	0	-2
y	1	0

أعين النقطتين (0, 1) و (-2, 0) في المستوى الإحداثي، ثم أرسم مستقيماً يمر بهما. وبما أنه لا توجد مساواة في رمز المتباينة، فيرسم المستقيم الحدودي متقطعاً، كما في الشكل الآتي:



الخطوة 2: أحدد منطقة الحلول الممكنة.

أختار نقطة لا تقع على المُستقيم الحُدوديِّ، مثل $(0, 0)$ ، ثمَّ أتحقَّق إذا كان الناتج صحيحًا أم لا عند تعويضها في المُتباينة:

$$2y - x < 2$$

المُتباينة الخطيَّة

$$2(0) - 0 < 2$$

بتعويض $x = 0, y = 0$

$$0 < 2 \quad \checkmark$$


الناتج صحيح

أتعلَّم

لسهولة إجراء الحسابات، يُفضَّل اختيار النقطة $(0, 0)$ لفحص المُتباينة. ولكن، إذا وقعت على المُستقيم الحُدوديِّ فيجب اختيار نقطة غيرها.

الخطوة 3: أظلل منطقة الحلول الممكنة.

بما أن النقطة $(0, 0)$ هي إحدى الحلول المُمكنة للمُتباينة، فأظلل الجزء من المُستوى الذي تقع فيه هذه النقطة، كما في الشكل الآتي:



أتحقِّق من فهمي

أمثل المُتباينة الخطيَّة $-x + 2y > 2$ في المُستوى الإحداثيِّ.

مثال 3

أمثل المُتباينة الخطيَّة $y \geq 2x$ في المُستوى الإحداثيِّ.

الخطوة 1: أمثل المُستقيم الحُدوديِّ.


أمثل المُستقيم الحُدوديِّ $y = 2x$ ، وأنشئ جدولَ قيمٍ، وذلك باختيار قيمٍ للمتغيِّر x وتعويضها في المعادلة لإيجاد قيم المتغيِّر y المقابلة لها.

x	0	1
y	0	2

أفكِّر

هل يمكن تمثيل المُستقيم $y = 2x$ باستعمال نُقطتي تقاطع المُستقيم مع المحورين الإحداثيين؟ أبرِّر إجابتي.

أعینُ النقطتین (0, 0) و (1, 2) في المُستوى الإحداثي، ثمَّ أرسُمُ مُستقيماً يَمُرُّ بهما. وبِما أنَّه توجدُ مُساواةً في رمزِ المُتباينة فيُرسَمُ المُستقيمُ الحُدوديُّ متصلاً، كما في الشَّكلِ الآتي:




الخطوة 2: أحددُ منطقةَ الحُلُولِ المُمكنة.

أختارُ نقطةً لا تقعُ على المُستقيمِ الحُدوديِّ، مثل (2, 1)، ثمَّ أتحقَّقُ إذا كانَ الناتجُ صحيحاً أم لا عندَ تعويضِها في المُتباينة:

$y \geq 2x$	المُتباينة الخطيَّة
$1 \stackrel{?}{\geq} 2(2)$	بتعويضِ $x = 2, y = 1$
$1 \geq 4$ x	الناتجُ غيرُ صحيح

الخطوة 3: أظللُ منطقةَ الحُلُولِ المُمكنة.

بِما أنَّ النقطةَ (2, 1) ليستُ إحدى الحُلُولِ المُمكنة للمُتباينة، فأظللُ الجزءَ مِنَ المُستوى الَّذي لا تقعُ فيه هذه النقطة، كما في الشَّكلِ الآتي:



أتحققُ من فهمي 

أمثلُ المُتباينة الخطيَّة $y - 3x \leq 0$ في المُستوى الإحداثي.

أفكِّر

هل يمكنُ استعمالُ النقطةِ (0, 0) لفحص المُتباينة؟ أبرِّرْ إجابتي.

تمثيل المتباينات الخطية بمتغير واحد بيانياً

تعلمت سابقاً تمثيل المتباينة الخطية بمتغير واحد على خط الأعداد، ويمكن أيضاً تمثيلها في المستوى الإحداثي.

مثال 4

أمثل كلاً من المتباينات الآتية في المستوى الإحداثي:

1 $x > -1$

الخطوة 1: أمثل المستقيم الحدودي.

أمثل المستقيم الحدودي $x = -1$ في المستوى الإحداثي. وبما أنه لا توجد مساواة في رمز المتباينة فيرسم متقطعاً.


الخطوة 2: أحدد منطقة الحلول الممكنة.

أختار نقطة لا تقع على المستقيم الحدودي، مثل $(0, 0)$ ، ثم أتحقق إذا كان الناتج صحيحاً أم لا عند تعويضها في المتباينة:

$x > -1$	المتباينة الخطية
$0 > -1$	بتعويض $x = 0$
$0 > -1$ ✓	الناتج صحيح

الخطوة 3: أظلل منطقة الحلول الممكنة.

بما أن النقطة $(0, 0)$ هي إحدى الحلول الممكنة للمتباينة، فأظلل الجزء من المستوى الذي تقع فيه هذه النقطة، كما في الشكل الآتي:



أذكر

معادلة المستقيم الرأسي تكون دائماً على الصورة $x = a$

2 $y \leq 3$

الخطوة 1: أمثل المُستقيمَ الحُدوديَّ.

أمثل المُستقيمَ الحُدوديَّ $y = 3$ في المُستوى الإحداثيِّ. وبما أنه توجد مُساواة في رمز المُتباينة فيرسم متصلاً.

الخطوة 2: أحدد منطقة الحُلُول المُمكنة.

أختار نقطة لا تقع على المُستقيم الحُدوديِّ، مثل $(0, 0)$ ، ثم أتحمق إذا كان الناتج صحيحاً أم لا عند تعويضها في المُتباينة:


$y \leq 3$ المُتباينة الخطيَّة

$0 \stackrel{?}{\leq} 3$ بتعويض $y = 0$

$0 \leq 3$ الناتج صحيح ✓

الخطوة 3: أظلل منطقة الحُلُول المُمكنة.

بما أن النقطة $(0, 0)$ هي إحدى الحُلُول المُمكنة للمُتباينة، فأظلل الجزء من المُستوى الذي تقع فيه هذه النقطة، كما في الشكل الآتي.



أتحمق من فهمي

أمثل كلاً من المُتباينات الآتية في المُستوى الإحداثيِّ:

a) $x \leq 4$

b) $y > -5$

c) $y \geq 0$

أذكّر

معادلة المُستقيم الأفقي تكون دائماً على الصورة $y = a$

أتعلم

عند تمثيل المُتباينة الخطيَّة بمتغيّر واحد في المُستوى الإحداثيِّ، يكون المُستقيم الحُدوديِّ إما أفقيّاً أو عموديّاً.

للمتباينات استعمالات كثيرة في المواقف العلمية والحياتية؛ إذ تُساعدنا على اتخاذ القرار الأنسب المتعلق بتحديد القيم الممكنة ضمن شروط محددة.

مثال 5: من الحياة



دراسة: إذا علمت أن لدى عمّار 60 دقيقة على الأكثر لإنهاء الواجب المنزلي لمادتي الرياضيات والعلوم، فأكتب متباينة خطية بمتغيرين تمثل عدد الدقائق التي يمكن أن يقضيها عمّار في حل كل واجب، ثم أمثلها في المستوى الإحداثي.

الخطوة 1: أكتب المتباينة.

بالكلمات: عدد الدقائق اللازمة لإنهاء الواجب المنزلي على الأكثر 60 دقيقة.

أختار متغيراً: ليكن x ممثلاً لعدد الدقائق اللازمة لإنهاء واجب الرياضيات، و y عدد الدقائق اللازمة لإنهاء واجب العلوم.

أكتب المتباينة: $x + y \leq 60$

الخطوة 2: أمثل المتباينة بيانياً.

أمثل المستقيم الحدودي $x + y = 60$ في المستوى الإحداثي. وبما أنه توجد مساواة في رمز المتباينة فيرسم المستقيم الحدودي متصلاً.

أختار نقطة لا تقع على المستقيم الحدودي، مثل $(0, 0)$ ، ثم أتحقق إذا كان الناتج صحيحاً أم لا عند تعويضها في المتباينة:

$$x + y \leq 60$$

المتباينة الخطية

$$0 + 0 \leq 60$$

بتعويض $x = 0, y = 0$


$$0 \leq 60$$

✓

الناتج صحيح

معلومة

إن المثابرة على حل الواجبات المنزلية تُعززُ تعلُّمي وتُرسِّخُه في ذهني، وتُساعدني على قياس مدى إتقاني المهارات الرياضية، وتُغرسُ في نفسي الاعتماد على الذات وتحمل المسؤولية.



بما أن النقطة $(0, 0)$ هي إحدى الحلول الممكنة للمتباينة، وبما أن قيم x و y يجب أن تكون موجبة؛ لأنها تمثل الزمن، فأظلل الجزء من المستوى الذي يقع في الربع الأول، كما في الشكل المجاور.

الأحظ أيضًا أن أي نقطة يقع إحداثيها على المستقيم الحدودي، أو ضمن المنطقة المظللة، فإنها تُعدُّ حلًا. فمثلًا، النقطة $(20, 40)$ تمثل حلًا للمتباينة، و $(30, 30)$ تمثل أيضًا حلًا لها.

أتحقّق من فهمي



نجارة: إذا علمتُ أن نجارًا يريد شراء نوعين من الخشب، لا يزيد ثمنهما الكلي على JD 72، ووجد أن ثمن المتر الطولي من النوع الأول JD 4، ومن النوع الثاني JD 6، فأكتب متباينة خطية بمتغيرين تمثل كمية الخشب التي يمكن للنجار شراؤها من كل نوع، ثم أمثلها في المستوى الإحداثي.

تُستعمل الحسابات الرياضية كثيرًا في مهنة النجارة؛ لاستغلال الألواح الخشبية بطريقة مثلى وتجنب الهدر.

أدرب وأحل المسائل

أحدّد إذا كان كل زوج مُرتّبٍ مما يأتي يمثل حلًا للمتباينة: $x + 3y < 6$

1 (0, 1)

2 (-2, 4)

3 (8, -1)

أحدّد إذا كان كل زوج مُرتّبٍ مما يأتي يمثل حلًا للمتباينة: $-3x + 4y \geq 12$

4 (-5, 3)

5 (0, 2)

6 (3, 7)

أمثلُ كلاً من المتباينات الآتية في المستوى الإحداثي:

7 $y \leq 3 - 2x$

8 $x + y < 11$

9 $x - 2y < 0$

10 $4y - 8 \geq 0$

11 $3x - y \leq 6$

12 $2x + 5y < -10$

13 $-4x + 6y > 24$

14 $y < 3x + 3$

15 $-2x \geq 10$

16 $x < 6$

17 $y > -2$


18 $\frac{x}{2} + \frac{y}{3} < 1$



19 **حقائب:** يصنع جمالُ حقائبَ كبيرةً وصغيرةً للسيدات؛ لبيعها في معرضِ الحِرَفِ اليدويّة. إذا كانَ يحتاجُ إلى 3 أيام لصنعِ الحقيبةِ الصغيرة، و 5 أيام لصنعِ الحقيبةِ الكبيرة، فأكتبُ مُتباينةً خطيّةً بمتغيّرينِ تمثّلُ عددَ الحقائبِ التي يمكنُ له صنعُها من كلِّ نوعٍ في 30 يوماً حداً أقصى قبلَ يومِ افتتاحِ المعرضِ، ثمّ أمثلُها في المستوى الإحداثي.


20 **تسوق:** تريدُ ساميةٌ شراءَ العنَبِ والتُّفاحِ، بحيثُ لا يزيدُ المبلغُ الذي تدفعُهُ ثمنًا لِكِلا النوعينِ على 6 JD. إذا كانَ ثمنُ الكيلوغرامِ الواحدِ مِنَ العنَبِ 1.5 JD، و ثمنُ الكيلوغرامِ الواحدِ مِنَ التُّفاحِ 1 JD، فأكتبُ مُتباينةً خطيّةً بمتغيّرينِ تمثّلُ عددَ الكيلوغراماتِ التي يمكنُ لساميةٍ أن تشتريها من كلِّ نوعٍ، ثمّ أمثلُها في المستوى الإحداثي.

مهارات التفكير العليا



21 **أكتشف الخطأ:** مثلُ رامي المُتباينة $y < 2x + 3$ ، كما هو مُبيّنُ في الشكلِ المُجاورِ. أكتشفُ الخطأَ الذي وقعَ فيه رامي، وأصحِّحُه.

22 **مسألة مفتوحة:** أكتبُ مُتباينةً خطيّةً بمتغيّرينِ، بحيثُ تمثّلُ النقطتان $(-1, 3)$ و $(1, 6)$ حلاً لها، في حين لا تمثّلُ النقطة $(4, 0)$ حلاً.



23 **تبرير:** أكتبُ المُتباينةَ الخطيّةَ المُعطى تمثيلها البياني في الشكلِ المُجاورِ، وأبرّرُ إجابتي.

تمثيل المتباينات الخطية بمتغيرين بيانياً

Graphing Linear Inequalities in Two Variables

يُمكنني استعمال برمجة جوجرا؛ لتمثيل متباينات خطية بمتغيرين بيانياً في المستوى الإحداثي.


نشاط

أمثل كلاً من المتباينات الآتية بيانياً؛ باستعمال برمجة جوجرا:

1 $3x - y \leq 5$

أكتب المتباينة في شريط الإدخال؛ بنقر المفاتيح الآتية:


3 x - y ≤ 5




2 $y + 2x > 4$

أكتب المتباينة في شريط الإدخال؛ بنقر المفاتيح الآتية:

y + 2x > 4



يمكن تغيير اللون الأزرق الذي حدّدته برمجية جيو جيبيرا بالنقر على المُتباينة المراد تغيير لونها، ثمّ النقر على ، ثمّ النقر على  ثمّ اختيار (color) من القائمة التي تظهر يمين الشاشة، ومنها أختار لوناً آخر مثل اللون الزهريّ.



أَتَدْرَبُ

أمثّل كلّاً من المُتباينات الآتية بيانياً؛ باستعمال برمجية جيو جيبيرا:

1 $-5x - 2y \geq 3$

2 $11x + 7y > -2$

3 $7x + y < -3$

4 $x < y$

5 $x - 8y \geq 0$

6 $9x - y > 8$

اختبار نهاية الوحدة

أكتب كل مجموعة مما يأتي بطريقة الصفة المميزة:

- 6 {11, 12, 13, 14, ...}
 7 {..., -2, -1, 0, 1, 2, ...}
 8 {3, 6, 9, 12}
 9 {3, 2, 1}


أعبر عن كل من المجموعات الآتية، باستعمال طريقة سرد العناصر وطريقة الصفة المميزة:

- 10 الأعداد الزوجية التي تزيد على 7 وتقل عن 20
 11 الأعداد الكليّة التي تقل عن 4

أكتب متباينة تمثل كل جملة مما يأتي، ثم أمثلها على خطّ الأعداد:

- 12 عددٌ على الأكثر -3 أو على الأقلّ 5
 13 عددٌ على الأقلّ 2 وعلى الأكثر 9
 14 عددٌ لا يزيد على 6 ولا يقل عن -4
 15 عددٌ أقلّ من 100 أو أكبر من 300

أكتب متباينة مركّبة تعبر عن كل تمثيلٍ مما يأتي، ثمّ أعبر عنها برمز الفترة:




أختار رمز الإجابة الصحيحة لكلّ مما يأتي:

1 حلّ المتباينة $-9x + 17 \geq -64$ ، هو:


- a) $\{x \mid x \leq 9\}$ b) $\{x \mid x \geq 9\}$
 c) $\{x \mid x \leq -9\}$ d) $\{x \mid x \geq -9\}$

2 الفترة التي تعبر عن التمثيل البياني الآتي، هي:



- a) $(4, \infty)$ b) $[4, \infty)$
 c) $(-\infty, 4)$ d) $(-\infty, 4]$

3 المتباينة المركّبة التي تعبر عن التمثيل البياني الآتي، هي:



- a) $-1 < x < 3$ b) $x \leq -1$ or $x > 3$
 c) $x < -1$ or $x \geq 3$ d) $x > -1$ or $x \leq 3$

4 مجموعة حلّ المتباينة $-7 < x + 2 < 4$ ، هي:

- a) $(-5, 6)$ b) $(-9, 6)$
 c) $(-5, 2)$ d) $(-9, 2)$

5 مجموعة حلّ المعادلة $|x + 5| = 2$ ، هي:

- a) $\{-3, 3\}$ b) $\{-3, -7\}$
 c) $\{-2, 2\}$ d) $\{3, 7\}$


41 **نقل:** يمكن لشاحنة نقل 3500 kg من البضائع حداً أقصى. إذا كانت الشاحنة تنقل ثلاث كتلة الواحدة منها 125 kg، وغسالات كتلة الواحدة منها 100 kg، فأكتب متباينة خطية بمتغيرين تمثل عدد الثلاثيات والغسالات التي يمكنها نقلها، ثم أمثلها في المستوى الإحداثي.



42 **كرة سلة:** إذا كان المحيط المثالي لكرة السلة للسيدات 28.75 in، وكان مسموحاً أن يزيد على ذلك أو ينقص عنه بمقدار 0.25 in حداً أقصى، فأكتب متباينة قيمة مطلقة لإيجاد مدى محيط الكرة المسموح به، ثم أحلها.

تدريب على الاختبارات الدولية

43 التمثيل البياني الذي يمثل مجموعة حل المتباينة $|x - 4| > 2$ ، هو:



44 الزوج المرتب الذي لا يمثل حلاً للمتباينة $3x - 5y < 30$ ، هو:

- a) (1, -7) b) (-1, 7)
c) (0, 0) d) (-5, -5)

أحد إذا كان كل زوج مرتب مما يأتي يمثل حلاً للمتباينة:
 $2x + y > -3$

- 20 (2, -2) 21 (1, -3)
22 (-5, 4) 23 (2, 0)

أجد مجموعة حل كل متباينة مما يأتي، ثم أمثلها على خط الأعداد:

- 24 $-2 \leq x - 7 \leq 1$
25 $-2 < -2n + 1 < 7$
26 $-8 < \frac{2}{3}x - 4 < 10$
27 $3x + 2 < -10$ or $2x - 4 > -4$
28 $x - 1 \leq 5$ or $x + 3 \geq 10$
29 $4x - 3 > 11$ or $4x - 3 \leq -11$

أحل كلًا من المعادلات والمتباينات الآتية:

- 30 $3 - |5x + 3| > 3$
31 $7|x + 1| - 3 \leq 11$
32 $-4|8 - x| + 2 > -14$
33 $|x + 5| = 6.5$
34 $|7x + 3| + 2 = 33$
35 $|x - \frac{1}{2}| = \frac{5}{2}$

أمثل كلًا من المتباينات الآتية في المستوى الإحداثي:

- 36 $y \leq -2x + 1$ 37 $x < -4$
38 $y \geq x - 1$ 39 $y > 5x - 5$
40 $4x - y < 2$

ما أهميّة هذه الوحدة؟

يُعدُّ الاقتران التربيقيُّ أحدَ أكثرِ الاقتراناتِ شهرةً واستخدامًا في الرياضيات؛ ولذلك خُصِّصَتْ هذه الوحدة لتقديم خصائص هذا الاقتران الجبرية والبيانية وبعض استعمالاته الحياتية، مثل تصميم الجسور والمباني، كما يظهر في قصر المُستى التاريخي.

سأتعلّم في هذه الوحدة:

- ◀ تحديد ما إذا كانت العلاقة اقترانًا أم لا.
- ◀ تفسير التمثيلات البيانية للعلاقات.
- ◀ تعرّف الاقتران التربيقي وخصائصه، وتمثيله بيانيًا في المستوى الإحداثي.
- ◀ تمثيل منحنيات الاقترانات التربيقيّة الناتجة من تطبيق تحويل هندسيّ أو أكثر على منحنى الاقتران الرئيس.

تعلّمت سابقًا:

- ✓ تمثيل الاقترانات الخطية بيانيًا.
- ✓ حلّ المعادلات الخطية بمتغيّر واحد.
- ✓ إجراء تحويلات هندسية لأشكال ثنائية البعد في المستوى الإحداثي.
- ✓ نمذجة ظواهر ومواقف حياتية هندسيًا على مفهوم الاقتران الخطي.

فكرة المشروع البحث عن الاقتران التربيعي في نماذج حياتية.




المواد والأدوات شبكة الإنترنت، برمجية جيو جبراً.



خطوات تنفيذ المشروع:

- 1 أبحث مع أفراد مجموعتي في شبكة الإنترنت عن صور لنماذج حياتية تظهر فيها منحنيات على شكل قطع مكافئ، مثل: الجسور، ونوافير المياه، وواجهات بعض المباني، أو ألتقط صورة لذلك، ثم أحفظها في ملف على جهاز الحاسوب.
- 2 أستعمل برمجية جيو جبراً لإيجاد قاعدة الاقتران التربيعي، الذي يمثل القطع المكافئ الظاهر في الصورة، باتباع الخطوات الآتية:



- أنقر على أيقونة من شريط الأدوات، ثم أختار الصورة التي حفظتها.
- أعدّل موقع الصورة، وأختار مقاساً مناسباً لها بتحرك النقطتين A و B، اللتين تظهران عليها.
- أحدد بعض النقاط على القطع المكافئ الظاهر في الصورة، باستعمال أيقونة من شريط الأدوات.
- أكتب الصيغة $\text{FitPoly}(\{C, D, E, F, G, H, J, K, L, M\}, n)$ في شريط الإدخال ليظهر منحنى فوق الصورة، ومعادلة في شريط الإدخال.



- أستعمل المنزلة التي تظهر في الصورة المجاورة وأغير قيمة n لضبط المنحنى الظاهر، بحيث ينطبق تماماً على المنحنى الظاهر في الصورة، وتظهر قاعدة الاقتران التربيعي الممثل للقطع المكافئ انطباقاً دقيقاً في شريط الإدخال.
- أجد معادلة محور التماثل، وإحداثيي الرأس ومجال الاقتران التربيعي ومداه واتجاه فتحته، وقيمتة العظمى أو الصغرى.
- أعدّل موقع الصورة بتحركها إلى اليمين وإلى اليسار وإلى الأعلى وإلى الأسفل، ثم أعيد الخطوات السابقة لتحديد قاعدة الاقتران في كل مرة، وأصف كيف يرتبط منحنى كل اقتران منها بمنحنى الاقتران الأصلي.

عرض النتائج:

أعدّ عرضاً تقديمياً أُبين فيه:

- خطوات تنفيذ المشروع موضحةً بالصور (أستعمل خاصية طباعة الشاشة).
- معلومة عن الصورة التي اخترتها.

الاقتانات Functions

- تعرّف العلاقة، وتحديد ما إذا كانت اقتراً أم لا.
- تحديد مجال الاقتران ومداه.

فكرة الدرس



علاقة، مجال، مدى، الاقتران، اقتران مُتَّصِل، اقتران مُنْفَصِل، اختبار الخطّ الرأسي، الاقتران الخطّي، الاقتران غير الخطّي.

المصطلحات



مسألة اليوم



يمثّل الاقتران $d(t) = 300000t$ المسافة d بالكيلومتر، التي يقطعها الضوء بعد t ثانية تقريباً:

(1) أجد المسافة التي يقطعها الضوء بعد 15 s

(2) أجد عدد الثواني اللازمة لقطع الضوء 12 مليون كيلومتر.


العلاقة والاقتران

تمثّل أي مجموعة من الأزواج المرتبة **علاقة** (relation)؛ حيث الأحداثي x للأزواج المرتبة هو المدخلات، والأحداثي y هو المخرجات، ويمكن التعبير عن العلاقة بطرائق مختلفة، منها: الأزواج المرتبة، والتمثيل البياني، وجدول المدخلات والمخرجات، والمخطط السهمي. فمثلاً، تمثّل مجموعة الأزواج المرتبة الآتية علاقةً:

$$\{(1, 6), (-3, 2), (5, 0), (-1, -5), (4, 2)\}$$

ويمكن التعبير عن هذه العلاقة بطرائق مختلفة، كما يأتي:


تمثيل بياني



جدول مدخلات ومخرجات

x	y
1	6
-3	2
5	0
-1	-5
4	2

مخطط سهمي




الوحدة 2

تُسَمَّى مجموعة مُدخَلاتِ العلاقةِ **المجال** (domain)، أمّا مجموعة مُخرجاتِ العلاقةِ فتُسَمَّى **المدى** (range)، وتُسَمَّى العلاقةُ التي تربطُ كلَّ عنصرٍ في مجالها بعنصرٍ واحدٍ فقط منَ المدى **اقتراًناً** (function).

مثال 1

أحدّد مجال كلِّ علاقةٍ ممّا يأتي ومدّاهَا، ثمَّ أحدّد ما إذا كانت تمثّل اقتراًناً أم لا:

1 المجالُ المدى



المجال: $\{-3, 1, 4\}$ **المدى:** $\{3, -2, 1, 4\}$

ألاحظُ ارتباطَ العنصرِ 1 في المجالِ بالعنصرين -2 و 1 في المدى. إذن، لا تمثّل هذه العلاقةُ اقتراًناً.

2

x	5	3	2	0	-4	-6
y	1	3	1	3	-2	2

المجال: $\{5, 3, 2, 0, -4, -6\}$ **المدى:** $\{1, 3, -2, 2\}$

ألاحظُ ارتباطَ كلِّ عنصرٍ في المجالِ بعنصرٍ واحدٍ في المدى. إذن، تمثّل هذه العلاقةُ اقتراًناً.

3 $\{(0, 1), (2, 4), (3, 7), (5, 4)\}$

المجال: $\{0, 2, 3, 5\}$ **المدى:** $\{1, 4, 7\}$

ألاحظُ ارتباطَ كلِّ عنصرٍ في المجالِ بعنصرٍ واحدٍ في المدى. إذن، تمثّل هذه العلاقةُ اقتراًناً.

4 $\{(-4, 2), (6, -1), (0, 0), (-4, 0)\}$

المجال: $\{-4, 6, 0\}$ **المدى:** $\{2, -1, 0\}$

ألاحظُ ارتباطَ العنصرِ -4 في المجالِ بالعنصرين 2 و 0 في المدى. إذن، لا تمثّل هذه العلاقةُ اقتراًناً.

أتعلّم


يمكنُ أن يرتبطَ أكثرُ من عنصرٍ في مجالِ الاقترانِ بعنصرٍ واحدٍ في مدّاه.

أتذكّر

عندَ كتابةِ المجموعةِ بطريقةِ سردِ العناصرِ، أكتبُ العنصرَ المُكرّرَ مرّةً واحدةً. علمًا أن ترتيبَ العناصرِ ليسَ مهمًّا.

أَتَحَقَّقُ مِنْ فَهْمِي

أحدّد مجال كل علاقةٍ ممّا يأتي ومدّاهَا، ثمّ أحدّد ما إذا كانت تمثّل اقتراناً أم لا:



b)

x	5	2	-7	2	5
y	4	8	9	12	14

c) $\{(-2, 5), (0, 2), (4, 5), (5, 6)\}$ d) $\{(6, 5), (4, 3), (6, 4), (5, 8)\}$


الاقتران المتصل والاقتران المنفصل

يُسمّى الاقتران الذي يُمثّل في المستوى الإحداثي بنقاطٍ غير متصلةٍ **اقتراناً منفصلاً** (discrete function)، أمّا الاقتران الذي يُمثّل بخطّ أو منحنى دون انقطاع فيسمّى **اقتراناً متصلاً** (continuous function).

يمكن تحديد مجال الاقترانات المنفصلة والمتصلة ومدّاهَا بتمثيلها بيانياً، كما في المثال الآتي:

مثال 2

أحدّد ما إذا كان كل اقترانٍ ممّا يأتي منفصلاً أم متصلاً، ثمّ أحدّد مجاله ومدّاه:



الاقتران المُمثّل في الشكل المُجاور مُنفصل؛ لأنّ تمثيله في المستوى الإحداثي على شكل نقاطٍ غير متصلة.

لتحديد مجال الاقتران ومدّاه، أكتب الأزواج المرتبة وأحدّد منها المجال والمدى.


الأزواج المرتبة: $\{(1, 3), (2, 1), (3, -1), (4, 2), (5, 0), (6, 6)\}$

المجال: $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ المدى: $\{3, 1, -1, 2, 0, 6\}$

أندكّر


تمثّل قيم x المجال في حين تمثّل قيم y المدى.

2



الاقتران المُمَثَّل في الشكل المُجاوِر مُتَّصِلٌ؛ لأنَّ تمثيله في المُستوى الإحداثي على شكل قطعٍ مستقيمةٍ دون انقطاع.


أستعمل التمثيل البياني لتحديد قيم x وقيم y ، التي تمثل المجال والمُدَى كالاتي:




المجال: $\{x \mid -2 \leq x \leq 3\}$ أو الفترة $[-2, 3]$.

المُدَى: $\{y \mid -1 \leq y \leq 2\}$ أو الفترة $[-1, 2]$.

3



الاقتران المُمَثَّل في الشكل المُجاوِر مُتَّصِلٌ؛ لأنَّ تمثيله في المُستوى الإحداثي على شكل منحنى ليس فيه انقطاع. أستعمل التمثيل البياني لتحديد قيم x وقيم y ، التي تمثل المجال والمُدَى كالاتي:



المجال: $\{x \mid -6 \leq x < 6\}$ أو الفترة $[-6, 6)$

المُدَى: $\{y \mid 1 < y \leq 6\}$ أو الفترة $(1, 6]$


أتعلّم

- يُكتَبُ مجالُ الاقترانِ المُنفَصِلِ ومداهُ على شكلِ مجموعةٍ من العناصرِ المُنفَصِلَةِ.
- يُكتَبُ مجالُ الاقترانِ المُتَّصِلِ ومداهُ على شكلِ فتراتٍ أو مجموعاتٍ بصيغةِ الصفةِ المُميّزةِ للمجموعةِ التي فيها عددٌ لانهائيٌّ من العناصرِ.


أتعلّم

تعني الدائرة المفتوحة في التمثيل البياني أن الإحداثي x للزوج المرّتب لا ينتمي إلى مجال الاقتران، والإحداثي y لا ينتمي إلى مدى الاقتران بسبب قيمة x ، ويُعبّر عن ذلك عند كتابة الفترات باستعمال الرمز (أو الرمز).

4



الاقتران المُمَثَّل في الشكل المُجاوِر مُتَّصِلٌ؛ لأنَّ تمثيله في المُستوى الإحداثيَّ على شكلٍ منحنى ليس فيه انقطاعٌ. أَسْتَعْمِلُ التمثيلَ البيانيَّ لتحديدِ قِيَمِ x وَقِيَمِ y ، التي تُمَثِّلُ المجالَ والمَدَى كالآتي:



يَدُلُّ وُجُودُ رَأْسِ السَّهْمِ في التمثيلِ البيانيِّ أعلاه على أنَّ المنحنى ممتدٌّ إلى ما لا نهايةٍ. وعليه، يمكنُ كتابةُ مجالِ الاقترانِ ومَداهُ على النحو الآتي:

المجالُ: $\{x \mid -\infty < x < \infty\}$ أو الفترة $(-\infty, \infty)$





المَدَى: $\{y \mid y \geq 0\}$ أو الفترة $[0, \infty)$

أفكر

هل يمكنُ التعبيرُ عن المجالِ بطريقةٍ أخرى؟ أبرِّرْ إجابتي.

أتحقق من فهمي

أحدِّد ما إذا كان كلُّ اقترانٍ ممَّا يأتي مُنفصلاً أم مُتَّصِلاً، ثمَّ أحدِّد مجاله ومَداهُ:



اختبار الخط الرأسي


يُمكنني استعمال اختبار الخط الرأسي (vertical line test) لتحديد ما إذا كانت العلاقة المُمثلة بيانياً تمثل اقتراناً أم لا.

اختبار الخط الرأسي


مفهوم أساسي

بالكلمات: تُعدُّ العلاقة المُمثلة بيانياً اقتراناً إذا لم يقطع أيُّ خطٍّ رأسيٍّ تمثيلها البياني في أكثر من نقطة واحدة.

ليست اقتراناً



اقتران




أمثلة:

مثال 3


أحدُّ ما إذا كانت العلاقة المُمثلة بيانياً في كلِّ ممَّا يأتي تمثل اقتراناً أم لا، وأبرِّرُ إجابتي:

أتعلَّم

يُمكنني استعمال قلمي لإجراء اختبار الخط الرأسي؛ إذ أضعه رأسيّاً يسار التمثيل البياني، ثمَّ أبدأً بتحريكه باتجاه اليمين، فإذا استمرَّ القلم بقطع التمثيل البياني في نقطة واحدة فقط فإنَّ العلاقة تمثل اقتراناً.




1



تمثل العلاقة المُمثلة في الشكل المُجاور اقتراناً؛ لأنه لا يوجد خطٌّ رأسيٌّ يَمُرُّ بأكثر من نقطة واحدة في تمثيلها البياني.

2





لا تمثل العلاقة المُعطى تمثيلها البياني في الشكل المُجاور اقتراناً؛ لأنَّها تفشل في اختبار الخط الرأسي. فمثلاً، يوجد مستقيمٌ رأسيٌّ يقطع التمثيل البياني في ثلاث نقاط عندما $x = 2$


وهذا يعني أنَّ القيمة $x = 2$ في المجال ترتبط بثلاث قيمٍ مختلفةٍ لـ y في المدى.

أتحقق من فهمي

أحدد ما إذا كانت العلاقة المُمَثَّلة بيانياً في كلٍّ مما يأتي تمثل اقتراناً أم لا، وأبرر إجابتي:



رمز الاقتران والاقتران الخطي



يُبين الشكل المجاور التمثيل البياني لمعادلة خطية بمتغيرين، وقد تعلمت سابقاً كتابتها باستعمال صيغة الميل والمقطع على الصورة: $y = mx + b$ ؛ حيث m هو ميل المستقيم و b المقطع y له. وبما أن التمثيل البياني لهذه المعادلة يجتاز اختبار الخط الرأسي فإنها تُعدُّ اقتراناً، ويُسمى **اقتراناً خطياً** (linear function).

يمكن أيضاً كتابة قاعدة الاقتران الخطي باستعمال رمز الاقتران $f(x)$ على الصورة الآتية:

$$f(x) = mx + b$$

وتمثل قيم x عناصر مجال الاقتران f ، أما قيم $f(x)$ فتمثل عناصر مداها.

لغة الرياضيات

يُقرأ الرمز $f(x)$:

f of x

مثال 4

إذا كان $f(x) = 2x + 6$ ، فأجب عن الأسئلة الآتية تبعاً:

1 أجد $f(3)$

$$f(x) = 2x + 6$$

$$f(3) = 2(3) + 6$$

$$= 12$$

الاقتران المُعطى

بتعويض $x = 3$

بالتبسيط

2 أجد $f(-4) + 10$

$$\begin{aligned} f(-4) + 10 &= (2(-4) + 6) + 10 \\ &= -2 + 10 \\ &= 8 \end{aligned}$$

بتعويض $x = -4$
بالتبسيط
بالتبسيط

أتعلم

يمكن استعمال حروف أخرى للدلالة على الاقتران غير حرف f ، مثل: g أو h .

3 أجد قيمة x التي تجعل $f(x) = -10$

$$\begin{aligned} f(x) &= 2x + 6 \\ -10 &= 2x + 6 \\ -16 &= 2x \\ x &= -8 \end{aligned}$$

الاقتران المُعطى
بتعويض $f(x) = -10$
بترح 6 من طرفي المعادلة
بقسمة طرفي المعادلة على 2

إذن، عندما $x = -8$ ، فإن $f(x) = -10$

أتحقق من فهمي

إذا كان $g(x) = 10 - x$ ، فأجب عن الأسئلة الآتية تبعاً:

(a) أجد $g(-5)$

(b) أجد $g(3) + 6$

(c) أجد قيمة x التي تجعل $g(x) = -35$

للاقترانات الخطية تطبيقات حياتية كثيرة.

مثال 5: من الحياة



درجات حرارة: يمثل الاقتران $t(m) = 19m + 65$ درجة الحرارة t بالفهرنهايت لفرن في أحد الأيام بعد تسخينه مدة m دقيقة.

1 أجد درجة حرارة الفرن بعد 10 دقائق.

أجد $t(10)$:

$$t(m) = 19m + 65$$

$$\begin{aligned} t(10) &= 19(10) + 65 \\ &= 255 \end{aligned}$$

الاقتران المُعطى
بتعويض $m = 10$
بالتبسيط

إذن، درجة حرارة الفرن بعد 10 دقائق من بدء تسخينه 255°F



إذا كانت أقصى درجة حرارة للفرن 350°F ، فأجد مجال الاقتران ومداه.

$$t(m) = 19m + 65$$

$$350 = 19m + 65$$

$$285 = 19m$$

$$m = 15$$

الاقتران المُعطى

$$t(m) = 350$$

ب طرح 65 من طرفي المُعادلة

بقسمة طرفي المُعادلة على 19

أَنعَلِّمُ

بما أن m تمثل الزمن، فإن أقل قيمة له هي 0

أَنعَلِّمُ

يمكن إيجاد مدى الاقتران الخطي بتعويض أقل قيمة وأعلى قيمة في المجال.

يصل الفرن إلى أقصى درجة حرارة عند تشغيله مدة 15 دقيقة؛ لذا فإن أكبر قيمة للزمن الذي يمثل المجال 15. وعليه، فإن مجال الاقتران هو $[0, 15]$.

لإيجاد مدى الاقتران أَعوِّضُ $m = 0$ في الاقتران لينتج $t(0) = 65$. وعليه، فإن مدى الاقتران هو $[65, 350]$.

أَتَحَقَّقُ مِنْ فَهْمِي




يمثل الاقتران $d(x) = 12x$ المسافة d بالكيلومتر التي تقطعها سيارةً باستعمال x لتر من الوقود. أجد مجال الاقتران ومداه إذا كان الحد الأقصى لسعة خزان السيارة من الوقود 40 L


الاقترانات غير الخطية

الاقتران غير الخطي (nonlinear function) اقتران لا يمكن كتابته على الصورة $f(x) = mx + b$ ، وتمثيله البياني ليس خطاً مستقيماً.

اقتران غير خطي



اقتران خطي



أَنعَلِّمُ

إذا احتوى الاقتران $f(x)$ على أي أس غير الواحد والصفير للمقدار x ، فإن الاقتران غير خطي.

ويمكن إيجاد قيمة الاقتران غير الخطي عند قيمة معينة بالتعويض، ثم اتباع أولويات العمليات.

أولويات العمليات الحسابية

مراجعة المفهوم

أولويات العمليات الحسابية، هي:

- (1) أجد قيمة المقدار داخل الأقواس.
- (2) أجد قيم المقادير الأسية والجذور جميعها.
- (3) أضرب أو أقسم من اليسار إلى اليمين (أيهما أسبق).
- (4) أجمع أو أطرح من اليسار إلى اليمين (أيهما أسبق).

مثال 6

إذا كان $g(x) = 2x^2 + 2x - 3$ ، فأجد كلاً مما يأتي:

أتعلم

ألاحظ أن أس المتغير في الاقتران $g(x)$ هو 2؛ لذا فهو ليس اقتراناً خطياً.

1 $g(-1)$

$$g(x) = 2x^2 + 2x - 3$$

الاقتران المعطى

$$g(-1) = 2(-1)^2 + 2(-1) - 3$$

بتعويض $x = -1$

$$= -3$$

بالتبسيط

2 $3g(0) + g(2)$

$$3g(0) + g(2) = 3(2(0)^2 + 2(0) - 3) + (2(2)^2 + 2(2) - 3)$$

بتعويض

$$x = 0, x = 2$$

$$= 3(-3) + 9$$

بالتبسيط

$$= 0$$

بالتبسيط



أتحقق من فهمي

إذا كان $h(x) = x^3 - 2x + 1$ ، فأجد كلاً مما يأتي:

a) $h(-2)$

b) $h(1) - 4h(0)$

أحدّد مجال كلّ علاقةٍ ممّا يأتي ومداهها، ثمّ أحدّد ما إذا كانت تمثّل اقتراناً أم لا:



3

x	4	2	-3	4	-4
y	0	-1	0	-1	0




4

x	-2	-1	0	1	2
y	-3	-3	-3	-3	-3




5 $\{(-2, 5), (-1, 2), (0, 4), (1, -9)\}$

6 $\{(4, 2), (1, 1), (0, 0), (1, -1), (4, -2)\}$

أحدّد ما إذا كان كلّ اقترانٍ ممّا يأتي مُنفصلاً أم مُتصلاً، ثمّ أحدّد مجاله ومداه:



أحدّد ما إذا كانت العلاقة المُعطى تمثيلها البيانيّ في كلّ ممّا يأتي تمثّل اقتراناً أم لا، وأبرّر إجابتي:



إذا كان $f(x) = 3x - 8$ ، فأجد:

15 قيمة x ، التي تجعل $f(x) = 19$

14 $2f(5) - 11$

13 $f(-3)$

إذا كان $h(x) = \frac{x+1}{x-1}$ ، فأجد كلاً مما يأتي:

16 $h(2)$

17 $h(3)$

18 $2h(0) - h(-2)$




تغذية: يمثل الاقتران $V(c) = 98c$ عدد وحدات فيتامين د، التي يمكن للإنسان أن يحصل عليها عند شربه c كوباً من الحليب

19 أجد عدد وحدات فيتامين د، التي يمكن للإنسان أن يحصل عليها عند شرب 8 أكواب من الحليب.

20 إذا كان الحد الأقصى لعدد أكواب الحليب التي يوصي الأطباء المرأة الحامل أن تشربها 4 أكواب، فأجد مجال الاقتران ومداه.

مهارات التفكير العليا



21 **اكتشف الخطأ:** تقول هديل إن التمثيل البياني المجاور يمثل اقتراناً خطياً؛ لأنه على شكل مستقيم. اكتشف الخطأ في قول هديل، وأصححه.

تبرير: أحدد الجملة الصحيحة والجملة الخطأ مما يأتي، وأبرر إجابتي:

22 كل اقتران هو علاقة.

23 كل علاقة هي اقتران.

24 إذا كان مجال الاقتران $(-\infty, \infty)$ ، فإن مداه أيضاً سيكون $(-\infty, \infty)$.

25 **تبرير:** أجد مجموعة قيم x ، التي تجعل العلاقة $\{(1, 5), (x, 8), (-7, 9)\}$ اقتراناً؛ حيث $x \in Z$ ، وأبرر إجابتي.

تفسير التمثيلات البيانية Interpreting Graphs

تفسير التمثيلات البيانية للعلاقات.


فكرة الدرس



المصطلحات



مسألة اليوم



منحنيات التحويل، منحنى الموقع - الزمن.

يبيّن الشكل المجاور التمثيل البياني لموقع سيارة أثناء حركتها بالنسبة إلى نقطة انطلاقها.


(1) كم دقيقة استمرت رحلة السيارة؟

(2) ما المدة الزمنية التي توقفتها السيارة أثناء الرحلة؟

التحويل بين وحدات القياس باستعمال منحنيات التحويل

تعلمت سابقاً التحويل بين وحدات القياس المختلفة باستعمال علاقات خطية تربط بينها، وسأتعلم اليوم كيفية قراءة **منحنيات التحويل** (conversion graphs) وتفسيرها، وهي منحنيات تستعمل لتمثيل العلاقات بين وحدات القياس المختلفة والتحويل بينها.

مثال 1




يبيّن منحنى التحويل المجاور العلاقة بين السنتيمتر (cm) والإنش (in). أستعمل المنحنى للإجابة عن كلّ مما يأتي:

1 أحول 4 in إلى وحدة السنتيمتر.

ألاحظ من التمثيل البياني أنّ 4 in على المحور y تقابل 10 cm على المحور x .


2 أحول 22 cm إلى وحدة الإنش.

ألاحظ من التمثيل البياني أنّ 22 cm على المحور x تقابل 8.7 in تقريباً على المحور y .



أتعلم

الإنش (inch) وحدة قياس طول تُستخدَم في بعض دول العالم.



3 أْبَيِّنْ كَيْفَ اسْتَعْمَلُ الْمُنْحَنِي الْمَجَاوِرَ لِتَحْوِيلِ 18 in إِلَى سَنْتِمِترَاتٍ.

بِمَا أَنَّ 18 in غَيْرُ مَوْجُودَةٍ عَلَى التَّمْثِيلِ الْبَيَانِيِّ، اتَّبِعْ الْخُطُوبَاتِ الْآتِيَةَ لِلتَّحْوِيلِ:

الْخُطُوبَةُ 1: أَجِدْ كَمْ سَنْتِمِترًا فِي الْإِنْشِ الْوَاحِدِ.


أَلَا حَظٌّ مِنَ التَّمْثِيلِ الْبَيَانِيِّ أَنَّ كَلَّ 1 in عَلَى الْمَحْوَرِ y يُقَابِلُ 2.5 cm تَقْرِيبًا عَلَى الْمَحْوَرِ x .

الْخُطُوبَةُ 2: أَضْرِبْ 18 in فِي 2.5

$$18 \times 2.5 = 45$$

إِذَنْ، 18 in تَسَاوِي 45 cm تَقْرِيبًا.

أَتَحَقَّقُ مِنْ فَهْمِي




يَبَيِّنُ مُنْحَنِي التَّحْوِيلِ الْمَجَاوِرُ الْعِلَاقَةَ بَيْنَ وَحَدَّتَيْ قِيَاسِ دَرَجَاتِ الْحَرَارَةِ الْفَهْرَنْهَائِيَّةِ وَالسَّلْسِيُوسِ. اسْتَعْمَلُ الْمُنْحَنِي لِلْإِجَابَةِ عَنْ كُلِّ مِمَّا يَأْتِي:

(a) أَحْوَلْ 35°C إِلَى وَحْدَةِ الْفَهْرَنْهَائِيَّةِ.

(b) أَحْوَلْ 50°F إِلَى وَحْدَةِ السَّلْسِيُوسِ.

(c) إِذَا كَانَتْ دَرَجَةُ حَرَارَةِ تَجَمُّدِ الْمَاءِ 0°C ، فَمَا دَرَجَةُ الْحَرَارَةِ الْمَقَابِلَةُ لَهَا بِالْفَهْرَنْهَائِيَّةِ؟


تَفْسِيرُ حَرَكَةِ الْأَجْسَامِ بِاسْتِعْمَالِ مُنْحَنِ الْمَوْقِعِ-الزَّمَنِ



يَكُونُ مِنَ الصَّعْبِ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ وَصْفُ حَرَكَةِ جَسْمٍ خِلَالَ مَدَّةٍ زَمْنِيَّةٍ مَحْدَدَةٍ بِالْكَلِمَاتِ؛ لِذَلِكَ تُسْتَعْمَلُ الْمُنْحَنِيَّاتُ لِتَمَثِيلِ تِلْكَ الْحَرَكَةِ بِوَضُوحٍ. يُسْتَعْمَلُ مُنْحَنِي الْمَوْقِعِ-الزَّمَنِ (position-time graph) لِتَمَثِيلِ التَّغْيِيرِ فِي مَوْقِعِ جَسْمٍ مُتَحَرِّكٍ خِلَالَ مَدَّةٍ زَمْنِيَّةٍ مَعْيِنَةٍ (بَيْنَ نَقْطَتَيْنِ زَمْنِيَّتَيْنِ) كَمَا يَوْضَحُ الشَّكْلُ الْمَجَاوِرُ، إِذْ يَظْهَرُ الْمَوْقِعُ مِنْ نَقْطَةِ الْبَدَايَةِ عَلَى الْمَحْوَرِ الرَّأْسِيِّ، وَالزَّمَنُ عَلَى الْمَحْوَرِ الْأَفْقِيِّ.

تعلّمت سابقاً في مبحث العلوم أنه يمكن إيجاد السرعة المتوسطة (\bar{v}_s) بقسمة المسافة الكلية المقطوعة (S) على الزمن الكلي المُستغرق للحركة (Δt)، ويمكن التعبير عن ذلك بالرموز عن طريق الصيغة الآتية:

$$\bar{v}_s = \frac{S}{\Delta t}$$



يمكن استعمال منحنيات الموقع - الزمن لإيجاد السرعة المتوسطة لجسم، وذلك بقسمة التغير في موقع الجسم ($y_2 - y_1$) على التغير في الزمن ($x_2 - x_1$)، والتي يمكن التعبير عنها بالرموز كالآتي:

$$\bar{v}_s = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$


ألاحظ أن صيغة السرعة المتوسطة تشبه صيغة الميل، إذن، سرعة الجسم المتوسطة تساوي ميل منحنى الموقع - الزمن.

أندكّر

يمكن إيجاد الميل (m) للمستقيم غير الرأسي المارّ بالنقطتين (x_1, y_1) و (x_2, y_2) على النحو الآتي:

$$m = \frac{\text{التغير الرأسي}}{\text{التغير الأفقي}} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

مثال 2: من الحياة



يبيّن التمثيل البياني المجاور رحلة أحمد بسيارته من منزله إلى مطار الملكة علياء الدوليّ ليستقبل أخاه العائد من السفر، حيث مكث بعض الوقت في المطار منتظراً وصول أخيه، ثم عاداً معاً إلى المنزل.

1 في أي ساعة غادر أحمد منزله؟

غادر أحمد منزله الساعة 9:00 عندما بدأ التمثيل البياني الحركة من المستوى الأفقيّ.

أندكّر

الوقت بصيغة الـ 24 ساعة هو نظام يبدأ فيه اليوم من منتصف الليل إلى منتصف الليل الذي يليه خلال دورة واحدة مكونة من الـ 24 ساعة اليومية.

2 ما البُعدُ بينَ منزلِ أحمدَ ومطارِ الملكةِ علياءِ الدوليِّ؟

أصبحَ مُنحنيَ الموقعِ - الزمنِ بينَ الساعةِ 11:00 والساعةِ 12:00 أفقيًّا، ما يعني أنَّ موقعَ أحمدَ بالنسبةِ إلى منزلهِ لم يتغيَّر في هذهِ المُدَّةِ، إذن يكونُ أحمدُ عندها قد وصلَ إلى المطارِ، وهذا يدلُّ على أنَّ المطارَ يبعدُ عن منزلِ أحمدَ 120 km

3 كم أمضى أحمدُ منَ الوقتِ في المطارِ؟

تقعُ القطعةُ الأفقيةُ منَ المُنحني بينَ الساعةِ 11:00 والساعةِ 12:00 وطولُها يساوي الزمنَ الذي أمضاهُ أحمدُ في المطارِ. إذن، أمضى أحمدُ ساعةً واحدةً في المطارِ.

4 أجدُ السرعةَ المتوسطةَ للسيارةِ في المُدَّةِ الزمنيةِ: 9:00–11:00

$$\begin{aligned} \bar{v}_s &= \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} && \text{صيغةُ السرعةِ المتوسطة} \\ &= \frac{120 - 0}{11 - 9} && \text{أعوّضُ عن } (x_1, y_1) \text{ بـ } (9, 0) \\ &= \frac{120}{2} = 60 && \text{وعن } (x_2, y_2) \text{ بـ } (11, 120) \\ & && \text{أبسّط} \end{aligned}$$

إذن السرعةُ المتوسطةُ للسيارةِ في المُدَّةِ الزمنيةِ 9:00 – 11:00 تساوي 60 km/h.

5 أجدُ السرعةَ المتوسطةَ للسيارةِ في المُدَّةِ الزمنيةِ 12:00–14:00، ثمَّ أبينُ ماذا تمثّل.


$$\begin{aligned} \bar{v}_s &= \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} && \text{صيغةُ السرعةِ المتوسطة} \\ &= \frac{0 - 120}{14 - 12} && \text{أعوّضُ عن } (x_1, y_1) \text{ بـ } (12, 120) \\ &= \frac{-120}{2} = -60 && \text{وعن } (x_2, y_2) \text{ بـ } (14, 0) \\ & && \text{أبسّط} \end{aligned}$$

بما أنَّ السرعةَ المتوسطةَ للسيارةِ سالبةٌ في المُدَّةِ الزمنيةِ 12:00–14:00 فإنَّ ذلكَ يعني أنَّ أحمدَ بدأ بالعودةِ إلى المنزلِ الساعةِ 12:00 بسرعةٍ ثابتةٍ مقدارُها 60 km/h، ووصلَ إلى منزلهِ الساعةَ 14:00

أذكّر

أثناءَ رحلةِ أحمدَ من منزلهِ إلى المطارِ وعودتهِ إلى المنزلِ مرّةً أخرى قد يُسرِّعُ أحيانًا ويبطئُ أحيانًا أخرى؛ نتيجةً الازدحام، أو التعبِ أو حالةِ الطقس؛ أي إنَّ سرعتَهُ تتغيَّر باستمرارٍ، وهذا يعني أنَّ حركتهُ غيرُ مُنتظمةٍ؛ لذا فإنَّنا نحسبُ سرعتَهُ المتوسطةَ.

أتحقق من فهمي



يبيّن التمثيل البيانيّ المجاورُ رحلةَ خالدٍ على درّاجته من منزله إلى المكتبة، حيثُ أمضى بعضَ الوقتِ فيها، ثمّ عادَ بدرّاجته إلى المنزل.

(a) في أيّ ساعةٍ غادرَ خالدٌ منزلهُ؟


(b) ما البُعدُ بينَ منزلِ خالدٍ والمكتبة؟

(c) كمّ أمضى خالدٌ منَ الوقتِ في المكتبة؟

(d) أجدُ السرعةَ المتوسطةَ لخالدٍ في المدّةِ الزمنيةّ 10:00–10:30، ثمّ أبيّنُ ماذا تمثّل.

يُظهرُ مُنحنيّ الموقعِ - الزمنِ في المثالِ السابقِ موقعَ جسمٍ مُتحرّكٍ بينَ أوقاتٍ مختلفةٍ منَ ساعاتِ اليومِ. ويوجدُ أيضًا نوعٌ آخرٌ منَ المُنحنياتِ يبيّنُ موقعَ الجسمِ المُتحرّكِ بعدَ مرورِ مدّةٍ زمنيّةٍ محدّدةٍ منَ لحظةِ انطلاقه كما هو موضّحُ في المثالِ الآتي.

مثال 3



يمثّل مُنحنيّ الموقعِ - الزمنِ المجاورُ رحلةَ حافلةٍ نقلتُ ركابًا من مدينةٍ إربدَ إلى مدينةِ المفرق؛ حيثُ توقّفَ سائقُ الحافلةِ في الموقفِ مدّةً منَ الزمنِ لتحميلِ الركابِ، ثمّ عادَ إلى مدينةِ إربد.

1 ما البُعدُ بينَ إربدَ والمفرق؟

أصبحَ مُنحنيّ الموقعِ - الزمنِ بعدَ ما يقاربُ 75 دقيقةً أفقيًّا، إذنُ تكونُ الحافلةُ عندها قد وصلتُ إلى مدينةِ المفرقِ وتوقّفتُ بعضَ الوقتِ، وهذا يدلُّ على أنّ مدينةَ إربدَ تبعدُ عنَ مدينةِ المفرقِ 50 km

أتعلّم

إذا احتوى مُنحنيّ الموقعِ - الزمنِ على أكثرَ منَ قطعةٍ مستقيمةٍ، فإنّ ذلكَ يعني أنّ السرعةَ المتوسطةَ للجسمِ تغيّرتُ أكثرَ منَ مرّةٍ أثناءَ حركته، معَ حدوثِ توقّفٍ في الحركةِ عندَ النقاطِ الفاصلةِ بينَ هذه القطعِ المستقيمة.

2 ما المدة الزمنية التي انتظرها سائق الحافلة في الموقف لتحميل الركاب؟

بما أن المنحنى أفقي بين 75 دقيقة و105 دقائق من انطلاق الحافلة من إربد إلى المفرق، فهذا يعني أن الحافلة توقفت 30 دقيقة في المفرق لتحميل الركاب.

3 ما زمن الرحلة كلها؟

ألاحظ من المنحنى أن زمن الرحلة كلها 195 دقيقة تقريباً؛ أي 3 ساعات وربع.

4 ماذا يمكننا القول عما يتعلق برحلة الحافلة من النقطة E إلى النقطة F؟

بدأت الحافلة بالعودة من مدينة المفرق إلى مدينة إربد بين هاتين النقطتين، واستغرقت رحلة العودة 90 دقيقة.

5 أحسب السرعة المتوسطة للحافلة بوحدة km / h بين النقطتين C و D.

$$\begin{aligned} \bar{v}_s &= \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} && \text{صيغة السرعة المتوسطة} \\ &= \frac{50 - 35}{75 - 45} && \text{أعوّض عن } (x_1, y_1) \text{ بـ } (45, 35) \\ & && \text{وعن } (x_2, y_2) \text{ بـ } (75, 50) \\ &= \frac{15 \text{ km}}{30 \text{ min}} && \text{أبسّط} \end{aligned}$$

وبما أن الحافلة قطعت 15 km في 30 min، إذن يمكنني إيجاد السرعة المتوسطة للحافلة في الساعة الواحدة.


$$\begin{aligned} &\frac{15 \text{ km}}{30 \text{ min}} && \text{السرعة المتوسطة للحافلة بوحدة km/min} \\ &= \frac{15 \times 2 \text{ km}}{30 \times 2 \text{ min}} && \text{أضرب في 2 لتحويل السرعة المتوسطة للحافلة} \\ & && \text{بوحدة الكيلومتر لكل ساعة} \\ &= \frac{30 \text{ km}}{60 \text{ min}} && \text{أبسّط} \\ &= \frac{30 \text{ km}}{1 \text{ h}} && \text{كل 60 min تساوي 1 ساعة} \end{aligned}$$

إذن، السرعة المتوسطة للحافلة من C إلى D تساوي 30 km/h

أتعلم

ألاحظ أن ميل المنحنى ثابت خلال هذه المدة، ما يعني أن السرعة المتوسطة للحافلة كانت ثابتة خلال رحلة العودة.

أتحقق من فهمي



بيِّن التمثيل البياني المجاورُ رحلةً بهاءَ بسيارته من مدينة الكرك متَّجِّهاً إلى عمله في مدينة العقبة عبر طريق الغور الأردني.

(a) ما البُعدُ بينَ مدينة الكركِ ومدينة العقبة؟

(b) ما المدةُ الزمنية التي استغرقتها بهاءٌ لأخذِ استراحةٍ أثناء الرحلة؟


(c) أحسبُ السرعةَ المتوسطةَ للسيارة منذ تحركَ بهاءٌ بعد الاستراحةِ وحتى وصوله إلى مدينة العقبة.

(d) إذا وصلَ بهاءٌ مدينة العقبة الساعة 1 p.m.، ففي أيِّ ساعة انطلقَ من مدينة الكرك؟

المقارنة بين جسمين تحركاً معاً باستعمال مُنحني الموقع- الزمن

يمكنُ رسمُ مُنحني الموقع - الزمن لجسمين مُتحرِّكين معاً على المستوى نفسه، وذلك بهدف إجراء مُقارناتٍ بين الجسمين من حيثُ الموقع، والزمن، والسرعة المتوسطة.

مثال 4




بيِّن التمثيل البياني المجاورُ سباقاً بين روان وهالة، حيث ركضتا إلى نهاية الطريق المُحاذاي لمنزلهما، وأخذت كلُّ منهما استراحةً قصيرةً، ثم عادتا ركضاً إلى نقطة البداية، وفي طريق العودة التوى كاحل روان.

1 أيُّهما أنهت السباق بوقتٍ أقصر: روان أم هالة؟ ولماذا؟

أنهت هالة السباق أولاً، حيث يظهر من التمثيل البياني أن مُنحني هالة عادَ إلى المحور x قبل مُنحني روان، حيث أنهت هالة السباق في 75 ثانية تقريباً، في حين أنهت روان السباق في 90 ثانية.

12 ثانية



2 ما مقدار الوقت الذي استراحت فيه هالة؟

ألاحظ أن كل خطوة أفقية في المستوى الإحداثي تمثل ثانيتين؛ لذا استراحت هالة مدة 12 ثانية كما يظهر في الشكل المجاور.

أتعلم

اقرأ مقياس الرسم للتمثيل البياني جيداً، وألاحظ أن كل مربع صغير يمثل ثانيتين.

3 بعد كم ثانية من بدء السباق التوى كاحل روان؟


التوى كاحل روان بعد 48 ثانية؛ لأن سرعتها قلت فجأة عند الثانية 48، ويظهر ذلك في التمثيل البياني، إذ قل ميل المنحنى بعد الثانية 48.

4 ماذا حدث بعد 68 ثانية من بدء السباق؟

ألاحظ أن المنحنيين تقاطعا في الثانية 68، وهذا يدل على أن هالة وروان كانتا على البعد نفسه من نقطة البداية/ النهاية في تلك اللحظة.

أتحقق من فهمي

رصد نمر غزالاً عندما كان أسفل شجرة، ثم بدأ بمطاردة الغزال حتى اصطاده. يبين التمثيل البياني الآتي المطاردة بين النمر والغزال.




(a) كم كان البعد بين الغزال والنمر عند بدء المطاردة؟

(b) ماذا فعل الغزال بين الثانية 0 والثانية 5؟


(c) كم ثانية ركض الغزال قبل أن يصطاده النمر؟

(d) كيف أستدل من التمثيل البياني على أن النمر أسرع من الغزال؟

يَبِينُ مُنْحَنَى التَّحْوِيلِ الْآتِي الْعِلَاقَةَ بَيْنَ الْمِلِيلْتَرِ وَوَحْدَةِ الْكُوبِ الْمَعْيَارِيِّ الَّتِي يُسْتَعْمَلُ لِقِيَاسِ الْكَمِيَّاتِ فِي الطَّبْخِ.



- 1 كمّ ميليتراً من السائل يقابل الكوب المعياري الواحد؟
- 2 كمّ كوباً معيارياً يقابل 150 mL؟
- 3 كمّ ميليتراً من السائل تحتاج إليه وصفة تتطلب كوباً ونصفاً.



يَبِينُ التَّمْثِيلُ الْبَيَانِيَّ الْمَجَاوِزُ رِحْلَةَ زَيْدٍ عَلَى دَرَجَتِهِ مِنْ مَنْزِلِهِ إِلَى الْمَرْكَزِ الثَّقَافِيِّ، وَفِي طَرِيقِ عَوْدَتِهِ إِلَى الْمَنْزَلِ تَوَقَّفَ عِنْدَ أَحَدِ الْمَحَالِّ التَّجَارِيَةِ.

4 فِي أَيِّ سَاعَةٍ غَادَرَ زَيْدُ الْمَنْزَلَ؟

5 كَمْ كِيلُومِتْرًا يَبْعُدُ الْمَرْكَزُ الثَّقَافِيُّ عَنِ مَنْزَلِ زَيْدٍ؟


6 كَمْ كِيلُومِتْرًا يَبْعُدُ الْمَحَلُّ التَّجَارِيُّ عَنِ مَنْزَلِ زَيْدٍ؟


7 كَمْ أَمْضَى زَيْدٌ مِنَ الْوَقْتِ فِي الْمَرْكَزِ الثَّقَافِيِّ؟

8 أَجِدُ السَّرْعَةَ الْمَتَوَسِّطَةَ لَزَيْدٍ فِي الْمُدَّةِ الزَّمْنِيَّةِ 15:30–16:00

أَتَعَلَّمُ

عِنْدَمَا أَقْرَأُ التَّمْثِيلَ الْبَيَانِيَّ أَحَدِّدُ مَقْيَاسَ الرَّسْمِ أَوَّلًا؛ لِمَعْرِفَةِ مَا يُمَثِّلُهُ كُلُّ مَرِيعٍ فِي الْمَسْتَوَى الْإِحْدَاثِيِّ، وَيُمْكِنُ التَّحَقُّقُ مِنْ ذَلِكَ بِالْعَدِّ. فَمَثَلًا يَشِيرُ السَّهْمُ فِي الشَّكْلِ أَدْنَاهُ إِلَى الْعَدِّ 16






شارك تميم وريان في سباق الجري لمسافة 5000 m، ويبيّن الشكل المجاور موقع كلّ منهما بالنسبة إلى نقطة البداية.

9 أيهما ركّض بسرعة متوسطة ثابتة؛ تميم أم ريان؟ أبرّر إجابتي.

11 من فاز بالسباق؛ ريان أم تميم؟ أبرّر إجابتي.

10 أجد السرعة المتوسطة لريان خلال السباق كاملاً.




ملاً كماً حوض استحمام بالماء، وعندما أصبحت فيه كمية مناسبة من الماء نزل فيه مدةً زمنية معينة، ثم خرج وأفرغ الحوض من الماء. يبيّن التمثيل البياني المجاور ارتفاع الماء في الحوض خلال هذه المدة.

12 ما ارتفاع الماء في الحوض قبل نزول كمال فيه؟


13 ما ارتفاع الماء في الحوض عندما نزل كمال فيه؟

14 كم دقيقة أمضى كمال في الحوض؟

مهارات التفكير العليا




15 تبرير: لماذا لا يمكن أن يكون أي جزء من منحنى الموقع - الزمن رأسياً كما هو مبين في الشكل المجاور؟ أبرّر إجابتي.



16 تبرير: يتدفق الماء بمعدل ثابت ومتساو في ثلاثة أنابيب تتصل بالأوعية R و P و Q المبيّنة أدناه لملئها، ويوضّح التمثيل البياني المجاور ارتفاع الماء في كلّ وعاء مع مرور الزمن.

أصل المنحنيات A و B و C بالوعاء المناسب لكل منها، وأبرّر إجابتي.




الاقتران التربيعي Quadratic Function

• تعرّف الاقتران التربيعي وخصائصه.

• تمثيل الاقتران التربيعي بيانياً في المستوى الإحداثي.

الاقتران التربيعي، الصورة القياسية، الاقتران الرئيس، قطع مكافئ، محور التماثل، الرأس، نقطة القيمة الصغرى، نقطة القيمة العظمى.



يمثل الاقتران $f(x) = -0.007x^2 + 0.51x + 0.8$ ارتفاع دعامة جسر على شكل قوسٍ عن سطح الماء بالأمتار؛ حيث x المسافة الأفقية من نقطة التقاء الدعامة اليسرى مع سطح الماء. هل يمكن أن تمر سفينة ارتفاعها 8 m أسفل الجسر؟ أبرّر إجابتي.

فكرة الدرس



المصطلحات



مسألة اليوم



خصائص الاقتران التربيعي


الاقتران التربيعي (quadratic function) اقتران يمكن كتابته على الصورة $f(x) = ax^2 + bx + c$ ؛ حيث a و b و c أعداد حقيقية، و $a \neq 0$ ، التي تسمى الصورة القياسية (standard form) للاقتران التربيعي، ومن أمثله:

$$f(x) = 4x^2 + 3x + 1$$

$$g(x) = x^2 - 2x$$

$$h(x) = 3x^2$$

يُعدُّ الاقتران $f(x) = x^2$ أبسط صور الاقتران التربيعي؛ لذا يُسمى الاقتران الرئيس (parent function) لعائلة الاقترانات التربيعية.




يأخذ التمثيل البياني للاقتران التربيعي شكل الحرف الإنجليزي U، ويُسمى قطعاً مكافئاً (parabola)، كما في الشكل المجاور، الذي يُظهر التمثيل البياني للاقتران $f(x) = x^2$.

محور التماثل (axis of symmetry) هو المُستقيم الرأسي الذي يقسم القطع المكافئ إلى جزأين متطابقتين، ويقطعه في نقطة واحدة تُسمى الرأس (vertex).


أنعلم

يَنبُجُ القطع المكافئ من تقاطع مُستوى مائل ومخروط.



محور تماثل الاقتران التربيعي ورأسه

مفهوم أساسي



مُعَادَلَةُ مَحْوَرِ التَّمَاثُلِ لِمُنْحَنِ الاقترانِ التَّربيعيِّ

$$f(x) = ax^2 + bx + c \quad \text{حيث } a \neq 0$$

$$x = -\frac{b}{2a} \quad \text{وإحداثيَّا رأسه هما:}$$

$$\left(-\frac{b}{2a}, f\left(-\frac{b}{2a}\right)\right)$$

مثال 1

أجد مُعَادَلَةَ مَحْوَرِ التَّمَاثُلِ، وإحداثيَّي رأسِ الاقترانِ التَّربيعيِّ $f(x) = 5x^2 - 10x + 4$

بما أن $a = 5$ و $b = -10$ ، فيمكن إيجاد مُعَادَلَةَ مَحْوَرِ التَّمَاثُلِ كالتالي:

$$x = -\frac{b}{2a}$$

مُعَادَلَةُ مَحْوَرِ التَّمَاثُلِ

$$= -\frac{-10}{2(5)}$$

بتعويض $a = 5, b = -10$

$$= 1$$

بالتبسيط

إذن، مُعَادَلَةُ مَحْوَرِ التَّمَاثُلِ هي: $x = 1$

لإيجاد إحداثيَّي الرأسِ، أعدُّ القيمةَ الناتجةَ عَن مُعَادَلَةِ مَحْوَرِ التَّمَاثُلِ هيَّ الإحداثيَّ x لرأسِ القطعِ المُكافئِ، ثمَّ أعوضُها في قاعدةِ الاقترانِ لإيجادِ الإحداثيَّ y .

$$f(x) = 5x^2 - 10x + 4$$

الاقترانُ المُعطى

$$f(1) = 5(1)^2 - 10(1) + 4$$

بتعويض $x = 1$

$$= -1$$

بالتبسيط


إذن، إحداثيَّا الرأسِ $(1, -1)$

أنتحَقُّ مِن فهمي 


أجد مُعَادَلَةَ مَحْوَرِ التَّمَاثُلِ، وإحداثيَّي رأسِ الاقترانِ التَّربيعيِّ $f(x) = x^2 + 2x - 1$

يكون التمثيل البياني للاقتران التربيعي $f(x) = ax^2 + bx + c$ حيث $a \neq 0$ مفتوحًا للأعلى إذا كان $a > 0$ ، وتُسمى أدنى نقطة فيه **نقطة القيمة الصغرى** (minimum point)، ويكون مفتوحًا للأسفل إذا كان $a < 0$ ، وتُسمى أعلى نقطة فيه **نقطة القيمة العظمى** (maximum point)، وتمثل نقطة القيمة الصغرى أو نقطة القيمة العظمى رأس القطع المكافئ.

$a > 0$



$a < 0$



مجال الاقتران التربيعي ومداه

مفهوم أساسي

مجال الاقتران التربيعي $f(x) = ax^2 + bx + c$ حيث $a \neq 0$ ، هو جميع الأعداد الحقيقية، أما مداه فيكون:

- مجموعة الأعداد الحقيقية التي تزيد على القيمة الصغرى أو تساويها إذا كان $a > 0$.
- مجموعة الأعداد الحقيقية التي تقل عن القيمة العظمى أو تساويها إذا كان $a < 0$.

لغة الرياضيات

يُشيرُ مُصطلحُ نقطة القيمة العظمى إلى النقطة (x, y) ، أما مُصطلحُ القيمة العظمى فيشيرُ إلى الإحداثي y لنقطة القيمة العظمى، وكذلك الأمرُ بالنسبة إلى نقطة القيمة الصغرى.

مثال 2

أجدُ القيمة العظمى أو الصغرى والمجال والمدى واتجاه الفتحة لكل قطع مكافئ مما يأتي:

1 $f(x) = x^2 + 6x + 9$

في الاقتران $f(x) = x^2 + 6x + 9$: $a = 1, b = 6$

بما أن $a > 0$ فالتمثيل البياني للاقتران التربيعي يكون مفتوحًا للأعلى، ويكون للاقتران قيمة صغرى يمكن إيجادها كالاتي:

الخطوة 1: أجدُ الإحداثيَّ x للرأسِ.

$$x = -\frac{b}{2a}$$

$$= -\frac{6}{2(1)}$$

$$= -3$$

الإحداثيَّ x للرأسِ

بتعويض $a = 1, b = 6$

بالتبسيط

الخطوة 2: أجدُ الإحداثيَّ y للرأسِ.

$$f(x) = x^2 + 6x + 9$$

$$f(-3) = (-3)^2 + 6(-3) + 9$$

$$= 0$$

الاقترانُ المُعطى

بتعويض $x = -3$

بالتبسيط

إذن، القيمةُ الصُّغرى للاقترانِ هي 0

المجال: جميعُ الأعدادِ الحقيقيَّةِ أو الفترة $(-\infty, \infty)$.

المدى: $\{y \mid y \geq 0\}$ أو الفترة $[0, \infty)$.

2 $f(x) = -\frac{1}{2}x^2 + x + 4$

في الاقترانِ $f(x)$: $a = -\frac{1}{2}, b = 1$

بما أن $a < 0$ ، فالتمثيلُ البيانيُّ للاقترانِ التربيعيِّ يكونُ مفتوحًا للأسفلِ، ويكونُ للاقترانِ قيمةً عظمى يمكنُ إيجادها كالاتي:

الخطوة 1: أجدُ الإحداثيَّ x للرأسِ.

$$x = -\frac{b}{2a}$$

$$= -\frac{1}{2(-\frac{1}{2})}$$

$$= 1$$

الإحداثيَّ x للرأسِ

بتعويض $a = -\frac{1}{2}, b = 1$

بالتبسيط

الدعم البيانيُّ


يُظهرُ التمثيلُ البيانيُّ للاقترانِ

$$f(x) = x^2 + 6x + 9$$

أنَّهُ مفتوحٌ للأعلى ورأسُهُ

النقطةُ $(-3, 0)$.

$$f(x) = x^2 + 6x + 9$$



الخطوة 2: أجدُ الإحداثيَّ y للرأسِ.

$$f(x) = -\frac{1}{2}x^2 + x + 4$$

الاقترانُ المُعطى

$$f(1) = -\frac{1}{2}(1)^2 + 1 + 4$$

بتعويضِ $x = 1$

$$= 4\frac{1}{2}$$

بالتبسيطِ

إذن، القيمةُ العُظمى للاقترانِ هيَ $4\frac{1}{2}$

المجال: جميعُ الأعدادِ الحقيقيَّةِ أو الفترة $(-\infty, \infty)$.

المدى: $\{y \mid y \leq 4\frac{1}{2}\}$ أو الفترة $(-\infty, 4\frac{1}{2}]$.

أتحققُ من فهمي

أجدُ القيمةَ العُظمى أو الصُّغرى والمجالَ والمدى واتِّجاهَ الفتحةِ لِكُلِّ قطعٍ مُكافئٍ ممَّا يأتي:

a) $f(x) = 2x^2 - 2x + 8$

b) $f(x) = -3x^2 + 12x + 9$

للاقترانِ التربيعةِ تطبيقاتٌ حياتيةٌ كثيرةٌ، منها الألعابُ الناريَّةُ، التي تتكوَّنُ من أنبوبٍ يحتوي على البارودِ ومجموعةٍ من الأغلفةِ الصغيرةِ تُسمَّى كُلُّ منها نجمةً، وعندَ إشعالِ الفتيلِ تنطلقُ النُّجومُ إلى الأعلى لِيَنفَجِرَ كُلُّ نجمٍ عندَ ارتفاعٍ مُعيَّنٍ، وَيَرسُمُ الصَّوِّ الناتجُ عن انفجارِ النِّجمِ في الجَوِّ قطعًا مُكافئًا.



أمثال 3: من الحياة ألعابٌ ناريَّةٌ: يمثِّلُ الاقترانُ $h(t) = -16t^2 + 72t + 520$

ارتفاعَ نجمةِ ألعابِ ناريَّةٍ عن سطحِ الأرضِ بالأمتارِ، بعدَ t

ثانيةً من انفجارِها.


الدَّعمُ البيانيُّ

يُظهرُ التمثيلُ البيانيُّ للاقترانِ

$$f(x) = -\frac{1}{2}x^2 + x + 4$$

أنَّهُ مفتوحٌ للأسفلِ ورأسُهُ

النقطةُ $(1, 4\frac{1}{2})$.



معلومة

تحتوي اللعبة النارية على فتيل يُشعل البارود، وعندما تسخن المواد الكيميائية تمتص ذراتها الطاقة فتنتج الأضواء، لتفقد الذرات طاقتها الزائدة. وتختلف كميات الطاقة والألوان تبعاً لاختلاف المواد الكيميائية المستخدمة.

1 أجد الارتفاع الذي انفجرت عنده النجمة في الجو.

الزمن الذي تنفجر عنده النجمة في الجو هو $t = 0$

$$h(t) = -16t^2 + 72t + 520$$

الاقتران المعطى

$$h(0) = -16(0)^2 + 72(0) + 520$$

بتعويض $t = 0$

$$= 520$$

بالتبسيط

إذن، انفجرت النجمة على ارتفاع 520 m من سطح الأرض.

2 أجد أقصى ارتفاع تصل إليه النجمة.

يصل النجم إلى أقصى ارتفاع له عند رأس القطع المكافئ؛ لذا أجد القيمة العظمى للقطع.

الخطوة 1: أجد الإحداثي t للرأس.

$$t = -\frac{b}{2a}$$

الإحداثي t للرأس

$$= -\frac{72}{2(-16)}$$

بتعويض $a = -16, b = 72$

$$= 2.25$$

بالتبسيط

الخطوة 2: أجد الإحداثي y للرأس.

$$h(t) = -16t^2 + 72t + 520$$

الاقتران المعطى

$$h(2.25) = -16(2.25)^2 + 72(2.25) + 520$$

بتعويض $t = 2.25$

$$= 601$$

بالتبسيط

إذن، أقصى ارتفاع تصل إليه النجمة 601 m

أتحقق من فهمي


كرة قدم: يمثل الاقتران $h(t) = -16t^2 + 64t$ ارتفاع كرة قدم عن سطح الأرض بالأقدام، بعد t ثانية من ركلها.

(a) أجد ارتفاع الكرة بعد 3 ثوانٍ من ركلها. (b) أجد أقصى ارتفاع تصل إليه الكرة.

تحديد خصائص الاقتران التربيعي من تمثيله البياني

تعلمت في المثالين السابقين تحديد خصائص الاقتران التربيعي من قاعدته، وسأتعلم في هذا المثال تحديد خصائصه من تمثيله البياني.


مثال 4



أجد إحداثيي الرأس ومعادلة محور التماثل، والقيمة العظمى أو الصغرى والمجال والمدى للقطع المكافئ الممثل بيانياً في المستوى الإحداثي المجاور:

الخطوة 1: أجد إحداثيي الرأس.

بما أن القطع مفتوح للأسفل فالرأس يمثل نقطته العظمى، وهي $(-2, 2)$.



الخطوة 2: أجد معادلة محور التماثل.

بما أن محور التماثل هو المستقيم الذي يقسم القطع المكافئ إلى جزأين متطابقتين، ويقطع القطع المكافئ في الرأس، فإن معادلة محور التماثل هي $x = -2$.

الخطوة 3: أجد القيمة العظمى.


بما أن القيمة العظمى هي الإحداثي y لنقطة الرأس، فإن القيمة العظمى للاقتران هي 2.

الخطوة 4: أجد المجال والمدى.

المجال: جميع الأعداد الحقيقية أو الفترة $(-\infty, \infty)$.

المدى: $\{y \mid y \leq 2\}$ أو الفترة $(-\infty, 2]$.

أتحقق من فهمي



أجد إحداثيي الرأس ومعادلة محور التماثل، والقيمة العظمى أو الصغرى والمجال والمدى للقطع المكافئ الممثل بيانياً في المستوى الإحداثي المجاور:

أذكر

الإحداثي x للرأس هو نفسه العدد الذي يظهر في معادلة محور التماثل.

تمثيل الاقتران التربيعي بيانياً

يمكن استعمال خصائص الاقتران التربيعي لتمثيله بيانياً.

تمثيل الاقتران التربيعي بيانياً

مفهوم أساسي

لتمثيل الاقتران التربيعي بيانياً، اتبع الخطوات الآتية:

الخطوة 1: أحدد اتجاه فتحة القطع المكافئ، وأجد معادلة محور التماثل وإحداثيي الرأس، وأحدّد إذا كان يمثل نقطة صغرى أم نقطة عظمى.

الخطوة 2: أجد نقطة تقاطع الاقتران مع المحور y .

الخطوة 3: أجد نقطة أخرى باختيار قيمة لـ x تقع في الجانب الذي يقع فيه المقطع y يمين محور التماثل أو يساره.

الخطوة 4: أمثل رأس القطع والنقطتين اللتين أوجدتهما من الخطوتين 2 و 3، ثم أستعمل التماثل لأعكس النقطتين من الخطوتين 2 و 3 حول محور التماثل؛ لإيجاد نقطتين أخريين على التمثيل البياني.

الخطوة 5: أصل بين النقاط بمنحنى أملس.

إرشاد

يمكن أخذ أي نقطتين في أي جهة من محور التماثل وإيجاد انعكاس لكل منهما.

مثال 5

أمثل الاقتران: $f(x) = -3x^2 + 6x + 5$ بيانياً.

الخطوة 1: أحدد اتجاه فتحة القطع المكافئ، وأجد معادلة محور التماثل وإحداثيي الرأس، وأحدّد إذا كان يمثل نقطة صغرى أم نقطة عظمى.

في الاقتران $f(x)$: $a = -3$, $b = 6$

بما أن $a < 0$ ، فالتمثيل البياني للقطع المكافئ يكون مفتوحاً للأسفل، ويمثل الرأس نقطته العظمى.

• **أَجِدْ مُعَادَلَةَ مَحْوَرِ التَّمَاثُلِ.**

$$x = -\frac{b}{2a}$$

$$= -\frac{6}{2(-3)}$$

$$= 1$$

مُعَادَلَةُ مَحْوَرِ التَّمَاثُلِ

$$a = -3, b = 6$$
 بتعويض

بالتبسيط

إذن، مُعَادَلَةُ مَحْوَرِ التَّمَاثُلِ هِيَ $x = 1$.

• **أَجِدْ إِحْدَائِيَّ الرَّأْسِ.**

$$f(x) = -3x^2 + 6x + 5$$

$$f(1) = -3(1)^2 + 6(1) + 5$$

$$= 8$$

الاقتران المُعطى

$$x = 1$$
 بتعويض

بالتبسيط

إذن، إِحْدَائِيَّ الرَّأْسِ $(1, 8)$.

الخطوة 2: أَجِدْ نَقْطَةَ تَقَاطَعِ الاقترانِ مَعَ المَحْوَرِ y .

لِإِيجَادِ نَقْطَةَ تَقَاطَعِ الاقترانِ مَعَ المَحْوَرِ y ، أَعْوِضْ $x = 0$ فِي قَاعِدَةِ الاقترانِ.

$$f(x) = -3x^2 + 6x + 5$$

$$f(0) = -3(0)^2 + 6(0) + 5$$

$$= 5$$

الاقتران المُعطى

$$x = 0$$
 بتعويض

بالتبسيط

إذن، نَقْطَةُ تَقَاطَعِ الاقترانِ مَعَ المَحْوَرِ y هِيَ $(0, 5)$.

الخطوة 3: أَجِدْ نَقْطَةً أُخْرَى بِاخْتِيَارِ قِيَمَةٍ لـ x تَقَعُ فِي الجَانِبِ الَّذِي يَقَعُ فِيهِ المَقْطَعُ y يَمِينَ

مَحْوَرِ التَّمَاثُلِ أَوْ يَسَارَهُ.

$$x = -1$$
 أختارُ

$$f(x) = -3x^2 + 6x + 5$$

$$f(-1) = -3(-1)^2 + 6(-1) + 5$$



$$= -4$$

الاقتران المُعطى

$$x = -1$$
 بتعويض

بالتبسيط

إذن، النَقْطَةُ الأُخْرَى هِيَ $(-1, -4)$.



الخطوة 4: أمثل النقاط في المستوى الإحداثي.

أمثل رأس القطع والنقطتين اللتين أوجدتهما من الخطوتين 2 و 3، وهما (0, 5) و (-1, -4)، ثم أستعمل التماثل لأعكس النقطتين (0, 5) و (-1, -4) حول محور التماثل؛ لإيجاد نقطتين أخريين على التمثيل البياني.

الخطوة 5: أصل بين النقاط بمنحنى أملس.

أتحقق من فهمي

أمثل الاقتران: $f(x) = x^2 - 4x - 5$

أتعلم

بما أن محور التماثل يقسم القطع المكافئ جزأين متطابقتين، فإن لكل نقطة على يسار هذا المحور نقطة تناظرها على يمينه وتبعد عنه المسافة نفسها، ويكون للنقطتين الإحداثي y نفسه.

إرشاد

أستعمل أوراق الرسم البياني الموجودة في نهاية كتاب التمارين.

أدرب وأحل المسائل

أجد إحداثيي الرأس ومعادلة محور التماثل، والقيمة العظمى أو الصغرى ومجال كل من الاقترانات التربيعية الآتية ومداهما:

1 $f(x) = 3x^2$

2 $f(x) = \frac{1}{2}x^2$

3 $f(x) = -x^2 + 5$

4 $f(x) = x^2 + 3$

5 $f(x) = 3x^2 + 6x - 2$




6 $f(x) = -8x + 2x^2$

7 $f(x) = -2x^2 - 6x + 4$

8 $f(x) = 5 + 16x - 2x^2$

9 $f(x) = -2(x-4)^2 - 3$

أجد إحداثيي الرأس ومعادلة محور التماثل، والقيمة العظمى أو الصغرى ومجال كل من القطوع المكافئة الآتية ومداهما:



أمثلُ كلاً من الاقترانات الآتية بيانياً: إرشاداً: أستمعلُ أوراق الرسم البيانيّ الموجودة في نهاية كتاب التمارين.

13 $f(x) = x^2 + 6x - 2$


14 $f(x) = 2x^2 - 10x + 1$

15 $f(x) = -3x^2 + 18x + 6$

16 $f(x) = -4x^2 - 8x + 7$

17 $f(x) = -\frac{1}{2}x^2 + 4x - 6$

18 $f(x) = 5x^2 - 20$



19 **حشرات:** يمثّل الاقتران $f(x) = -\frac{1}{20}x^2 + x$ ارتفاع جُنْدُبٍ

بالستيمتر فوق سطح الأرض عند قفزه؛ حيث x المسافة الأفقيّة من نقطة القفز. أجد أقصى ارتفاع يمكن أن يصل إليه الجُنْدُب.



رياضة: يمثّل الاقتران $h(t) = -4.9t^2 + 3.8t + 0.5$ ارتفاع كرة مضربٍ

بالأمتار فوق سطح الأرض، بعد t ثانية من ضرب سميّر لها.

20 أجد ارتفاع الكرة لحظة ضرب سميّر لها.

21 أجد أقصى ارتفاع يمكن أن تصل إليه الكرة.

مهارات التفكير العليا

22 **مسألة مفتوحة:** أكتب قاعدة اقترانٍ تربيعيٍّ مُعادلةً محور تماثله $x = -2$.

23 **أكتشف الخطأ:** حاول هشام ومَلِكُ إيجاد مُعادلة محور التّماثل للقطع المكافئ $f(x) = -2x^2 - 16x + 7$

فكانت إجابتاهما كالآتي. أيُّهما إجابتُهُ صحيحة؟ أبرّر إجابتي.

مَلِكُ


$$x = -\frac{b}{2a} = -\frac{(-16)}{2(-2)}$$

$$x = -4$$

هشامُ

$$x = -\frac{b}{2a} = -\frac{16}{2(-2)}$$

$$x = 4$$



24 **تحدّ:** أجد قاعدة الاقتران المُمثّل بيانياً في الشكل المُجاور.

استكشاف التحويلات الهندسيّة للاقتران التربيعي

Exploring Transformations of Quadratic Function

يمكنني استعمال برمجيّة جوجبرا؛ لاستكشاف أثر التحويلات الهندسيّة في منحنى الاقتران الرئيسي $f(x) = x^2$.

نشاط

الخطوة 1: أكتب قاعدة الاقتران $f(x) = x^2$ في شريط الإدخال، ثم أضغط ، ليظهر التمثيل البياني للاقتران.

الخطوة 2: انقر على أيقونة  Slider $a=2$ من شريط الأدوات، ثم انقر على الموقع الذي أريده في الشاشة، ليظهر مربع حوارٍ أحدّد فيه أعلى قيمة وأقل قيمة لـ a (مثلاً، أقل قيمة -10 وأعلى قيمة 10)، وأضبط الأيقونة على العدد 1 .

الخطوة 3: أكرّر الخطوة السابقة لإدراج مؤشّرين للتحكّم، وأسّمي أحدهما h ، والآخر k ، وأضبط المؤشّرين على العدد 0 .

الخطوة 4: أكتب القاعدة $g(x) = a(x-h)^2 + k$ في شريط الإدخال، ثم أضغط ، ليظهر التمثيل البياني للاقتران.

الخطوة 5: أحرّك المؤشّر a لتصبح قيمته مرّة أكبر من 1 ، ومرّة بين 0 و 1 ، ومرّة أقل من 1 ، ثمّ أجب عن الأسئلة الآتية:

- ما تأثير تغيير قيمة a عندما تكون أكبر من 1 في منحنى الاقتران g بالمقارنة مع منحنى الاقتران f ؟
- ما تأثير تغيير قيمة a عندما تكون بين 0 و 1 في منحنى الاقتران g بالمقارنة مع منحنى الاقتران f ؟
- ما تأثير تغيير قيمة a عندما تكون أصغر من 0 في منحنى الاقتران g بالمقارنة مع منحنى الاقتران f ؟


أتعلّم

يمكنني تغيير مواقع المؤشرات في الشاشة وترتيبها فوق بعضها باستعمال خاصيّة النقر والسحب.

الخطوة 6: أحرِّك المؤشِّر h بحيثُ تصبح قيمته مرَّةً أكبر من 0، ومرَّةً أقل من 0، ثمَّ أجبْ عن الأسئلة الآتية:

- في أيِّ الاتجاهات يتحرَّك الاقتران g عند تحريك المؤشِّر h ؟
- ما تأثيرُ تغييرِ قيمة h عندما تكون أكبر من 0 في منحنى الاقتران g بالمقارنة مع منحنى الاقتران f ؟
- ما تأثيرُ تغييرِ قيمة h عندما تكون أصغر من 0 في منحنى الاقتران g بالمقارنة مع منحنى الاقتران f ؟

الخطوة 7: أحرِّك المؤشِّر k بحيثُ تصبح قيمته مرَّةً أكبر من 0، ومرَّةً أقل من 0، ثمَّ أجبْ عن الأسئلة الآتية:



- في أيِّ الاتجاهات يتحرَّك الاقتران g عند تحريك المؤشِّر k ؟
- ما تأثيرُ تغييرِ قيمة k عندما تكون أكبر من 0 في منحنى الاقتران g بالمقارنة مع منحنى الاقتران f ؟
- ما تأثيرُ تغييرِ قيمة k عندما تكون أصغر من 0 في منحنى الاقتران g بالمقارنة مع منحنى الاقتران f ؟

الخطوة 8: أضبط المؤشِّرات الثلاثة على أعدادٍ اختارها، ثمَّ أصفُ علاقةَ منحنى الاقتران g بمُنحنى الاقتران الرئيس f .

أتعلَّم

يمكنني تغيير لون الاقتران، بالتَّقرُّب على مُنحناه واختيار (settings) ثمَّ (color) من القائمة التي تظهرُ يمينَ الشاشة، ومنها أختارُ لونًا.

التحويلات الهندسيّة للاقتران التربيعيِّ Transformations of Quadratic Function

تمثيلُ مُنحنياتِ الاقتراناتِ التربيعيَّةِ الناتجةِ عن تطبيقِ تحويلِ هندسيٍّ أو أكثرَ على مُنحنيِ الاقترانِ الرئيسيِّ.

التحويلُ الهندسيُّ، الانسحابُ، الانسحابُ الرأسِيُّ، الانسحابُ الأفقيُّ، التمدُّدُ، الانعكاسُ، صيغةُ الرأسِ.


فكرةُ الدرسِ



المصطلحاتُ




مسألةُ اليومِ



بيِّنُ الشكلُ المُجاورُ التمثيلَ البيانيَّ لمُنحنييِ الاقترانِيَّيْنِ
 $f(x) = x^2$ و $g(x) = x^2 - 2$.

ما العلاقةُ بينَ مُنحنييِ الاقترانِيَّيْنِ f و g ؟

الانسحابُ



تعلَّمتُ سابقاً أنَّ الاقترانَ الرئيسيَّ لعائلةِ الاقتراناتِ التربيعيَّةِ هُوَ
 $f(x) = x^2$ ، الذي يأخذُ مُنحناهُ شكلَ القطعِ المُكافئِ، كما في
الشكلِ المُجاورِ.


أمَّا مُنحنياتُ الاقتراناتِ التربيعيَّةِ الأخرى فَهِيَ ناتجةٌ مِنْ تطبيقِ تحويلِ هندسيٍّ
(transformation) أو أكثرَ على مُنحنيِ الاقترانِ الرئيسيِّ، بحيثُ تغيَّرُ هذهِ التحويلاتُ
الهندسيَّةُ موقعَ الاقترانِ الرئيسيِّ أو شكله.

يُعدُّ الانسحابُ (translation) أحدَ التحويلاتِ الهندسيَّةِ التي تؤثرُ في موقعِ الاقترانِ
الرئيسِ وتنقلُه إمَّا إلى الأعلى أو إلى الأسفلِ أو إلى اليمينِ أو إلى اليسارِ دونَ تغييرِ في أبعادهِ.

عندَ إضافةِ الثابتِ الموجبِ k إلى قاعدةِ الاقترانِ الرئيسيِّ $f(x)$ أو طرحه منها، فإنَّ مُنحنيِ
الاقترانِ $f(x) \pm k$ هُوَ مُنحنيِ الاقترانِ الرئيسيِّ مُزاحاً إلى الأعلى أو إلى الأسفلِ بمقدارِ k
وحدةً، ويُسمَّى هذا التحويلُ الانسحابَ الرأسِيَّ (vertical translation).

إذا كان $f(x) = x^2$ وكان k عددًا حقيقيًّا موجبًا، فإنَّ:

- مُنحني $g(x) = x^2 + k$ ، هو مُنحني $f(x)$ مُزاحًا إلى الأعلى k وحدةً.
- مُنحني $g(x) = x^2 - k$ ، هو مُنحني $f(x)$ مُزاحًا إلى الأسفل k وحدةً.



مثال 1

أَصِفْ كيفَ يرتبطُ مُنحني كلِّ اقترانٍ ممَّا يأتي بِمُنحني الاقترانِ الرئسيِّ $f(x) = x^2$ ، ثمَّ أمثلهُ بيانياً:


1 $g(x) = x^2 + 2$

مُنحني $g(x)$ هو مُنحني $f(x) = x^2$ مُزاحًا وَحَدَّيْنِ إلى الأعلى .
 لتمثيلِ مُنحني $g(x)$ بيانياً أتبعُ الإجراءاتِ الآتيةَ:

- أختارُ مجموعةً مِنَ النقطِ التي تقعُ على مُنحني $f(x) = x^2$.

• أضيفُ 2 للإحداثيِّ y للنقطِ التي اخترتها.

• أمثّلُ النقطِ الجديدةَ في المُستوى الإحداثيِّ، ثمَّ أصلُ بينها بِمُنحني أملَسَ، كما يظهرُ في الشكلِ المُجاورِ.



أتعلمُ


عند اختيار مجموعة من النقطِ على مُنحني الاقترانِ الرئسيِّ يُفَضَّلُ أنْ تتوسَّطَ نقطةُ الرأسِ هذهِ النقطِ. فمثلاً، يمكنُ اختيارُ النقطِ الآتيةَ:

- $(-2, 4)$, $(-1, 1)$,
 $(0, 0)$, $(1, 1)$, $(2, 4)$

2 $h(x) = x^2 - 3$

منحنى $h(x)$ هو منحنى $f(x) = x^2$ مُزاحًا 3 وحداتٍ إلى الأسفل.

لتمثيل منحنى $h(x)$ بيانياً أتبع الإجراءات الآتية:



- أختار مجموعةً من النقاط التي تقع على منحنى $f(x) = x^2$.
- أطرح 3 من الإحداثي y للنقاط التي اخترتها.
- أمثل النقاط الجديدة في المستوى الإحداثي، ثم أصِل بينها بمنحنى أملس، كما يظهر في الشكل المُجاور.

أتحقق من فهمي

أصف كيف يرتبط منحنى كلٍ اقترانٍ مما يأتي بمنحنى الاقتران الرئيس $f(x) = x^2$ ، ثم أمثله بيانياً:

a) $p(x) = x^2 + 3$

b) $t(x) = x^2 - 4$



عند إضافة الثابت الموجب h إلى قيم x جميعها في مجال الاقتران $f(x)$ أو طرحه منها، فإن منحنى الاقتران $f(x \pm h)$ هو منحنى الاقتران الرئيس مُزاحًا إلى اليمين أو إلى اليسار بمقدار h وحدة، ويسمى هذا التحويل **الانسحاب الأفقي** (horizontal translation).

الانسحاب الأفقي للاقتران التربيعي

مفهوم أساسي

إذا كان $f(x) = x^2$ وكان h عددًا حقيقيًا موجبًا، فإن:

- منحنى $g(x) = (x - h)^2$ هو منحنى $f(x)$ مُزاحًا إلى اليمين h وحدة.
- منحنى $g(x) = (x + h)^2$ هو منحنى $f(x)$ مُزاحًا إلى اليسار h وحدة.



أفكر

لماذا يُعبّر عن الإزاحة إلى اليمين بالطرح $(x - h)$ ، وإلى اليسار بالجمع $(x + h)$ ؟

إرشاد


أستعمل أوراق الرسم البياني الموجودة في نهاية كتاب التمارين.

مثال 2

أصف كيف يرتبط مُنحني كلِّ اقترانٍ ممَّا يأتي بِمُنحني الاقترانِ الرئيسِ $f(x) = x^2$ ، ثمَّ أمثلهُ بيانياً:

1 $g(x) = (x-3)^2$


مُنحني $g(x)$ هُوَ مُنحني $f(x) = x^2$ مُزاحاً 3 وَحداتٍ إلى اليمين. لتمثيل مُنحني $g(x)$ بيانياً اتَّبِعِ الإِجراءاتِ الآتية:



- أختارُ مجموعةً مِنَ النِّقاطِ تقعُ على مُنحني $f(x) = x^2$.
- أضيفُ 3 إلى الإحداثي x للنِّقاطِ التي اخترتها.
- أمثُلُ النِّقاطِ الجديدةَ في المُستوى الإحداثيِّ، ثمَّ أصِلُ بينها بِمُنحنيٍّ أملَسَسَ، كما يظهرُ في الشِّكلِ المُجاوِرِ.

2 $h(x) = (x+2)^2$

مُنحني $h(x)$ هُوَ مُنحني $f(x) = x^2$ مُزاحاً وَحدتينِ إلى اليسارِ. لتمثيل مُنحني $h(x)$ بيانياً اتَّبِعِ الإِجراءاتِ الآتية:



- أختارُ مجموعةً مِنَ النِّقاطِ التي تقعُ على مُنحني $f(x) = x^2$.
- أطرحُ 2 مِنَ الإحداثيِّ x للنِّقاطِ التي اخترتها.
- أمثُلُ النِّقاطِ الجديدةَ في المُستوى الإحداثيِّ، ثمَّ أصِلُ بينها بِمُنحنيٍّ أملَسَسَ، كما يظهرُ في الشِّكلِ المُجاوِرِ.

أتحقِّقُ مِن فهمي

أصف كيف يرتبط مُنحني كلِّ اقترانٍ ممَّا يأتي بِمُنحني الاقترانِ الرئيسِ $f(x) = x^2$ ، ثمَّ أمثلهُ بيانياً:

a) $p(x) = (x-4)^2$

b) $t(x) = (x+3)^2$

إرشادٌ

أستعملُ أوراقَ الرسمِ البيانيِّ الموجودةَ في نهايةِ كتابِ التمارينِ.

التمدد


التمدد (dilation) هو تحويل هندسي يؤدي إلى توسيع منحنى الاقتران أو تضيقه، فعند ضرب الاقتران الرئيس $f(x)$ بالثابت a ؛ حيث a عدد حقيقي موجب، فإن منحنى الاقتران $af(x)$ هو توسيع أو تضيق رأسي لمنحنى الاقتران $f(x)$.

تمدد الاقتران التربيعي

مفهوم أساسي

إذا كان $f(x) = x^2$ وكان a عددًا حقيقيًا موجبًا، فإن منحنى $g(x) = ax^2$ هو:

- توسيع رأسي بمعامل مقداره a لمنحنى $f(x)$ ، إذا كانت $a > 1$.
- تضيق رأسي بمعامل مقداره a لمنحنى $f(x)$ ، إذا كانت $0 < a < 1$.




مثال 3

أصف كيف يرتبط منحنى كل اقتران مما يأتي بمنحنى الاقتران الرئيس $f(x) = x^2$ ، ثم أمثله بيانياً:

1 $g(x) = 2x^2$

منحنى $g(x)$ هو توسيع رأسي لمنحنى $f(x) = x^2$ بمعامل مقداره 2 لتمثيل منحنى $g(x)$ بيانياً أتبع الإجراءات الآتية:




- أختار مجموعة من النقاط تقع على منحنى $f(x) = x^2$.
- أضرب الإحداثي y للنقاط التي اخترتها في 2.
- أمثل النقاط الجديدة في المستوى الإحداثي، ثم أصل بينها بمنحنى أملس، كما يظهر في الشكل المجاور.

أتعلم

ألاحظ أن منحنى الاقتران التربيعي عندما يتوسع رأسيًا، فإنه يبدو أضيق أفقيًا من الاقتران الرئيس.

2 $h(x) = \frac{1}{2}x^2$

مُنحنى $h(x)$ هُوَ تضييقٌ رأسيٌّ لِمُنحنى $f(x) = x^2$ بمعاملٍ مقداره $\frac{1}{2}$
لتمثيل مُنحنى $h(x)$ بيانياً أتبع الإجراءات الآتية:



- أختارُ مجموعةً مِنَ النقطِ التي تقعُ على مُنحنى $f(x) = x^2$
- أضربُ الإحداثيَّ y للنقطِ التي اخترتها في $\frac{1}{2}$
- أمثلُ النقطِ الجديدةَ في المُستوى الإحداثيِّ، ثمَّ أصِلُ بينها بِمُنحنى أملَس، كما يظهرُ في الشكلِ المُجاوِرِ.

أتحققُ مِن فهمي

أصفُ كيفَ يرتبطُ مُنحنى كلِّ اقترانٍ ممَّا يأتي بِمُنحنى الاقترانِ الرئيسِ $f(x) = x^2$ ، ثمَّ أمثلهُ بيانياً:

a) $g(x) = 3x^2$

b) $g(x) = \frac{1}{3}x^2$

أنعلّم

ألاحظُ أنَّ مُنحنى الاقترانِ التربيعيِّ عندما يضيّقُ رأسيّاً، فإنّه يبدو أوسعَ أفقيّاً من الاقترانِ الرئيسِ.

إرشادٌ

أستعملُ أوراقَ الرسمِ البيانيِّ الموجودةَ في نهايةِ كتابِ التمارينِ.

الانعكاسُ



الانعكاسُ (reflection) هُوَ تحويلٌ هندسيٌّ يعكسُ مُنحنى الاقترانِ حولَ مُستقيمٍ مُحدّدٍ.

الانعكاسُ

مفهومٌ أساسيٌّ

إذا كانَ $f(x) = x^2$ فإنَّ:

- مُنحنى $g(x) = -f(x)$ ، هُوَ انعكاسُ لِمُنحنى $f(x)$ حولَ المحورِ x .
- مُنحنى $g(x) = f(-x)$ ، هُوَ انعكاسُ لِمُنحنى $f(x)$ حولَ المحورِ y .



أنعلّم

انعكاسُ الاقترانِ $f(x) = x^2$ حولَ المحورِ y يُعطي الاقترانَ نفسه؛ لأنَّ:

$$f(-x) = (-x)^2 = x^2$$


مثال 4

أصِفْ كيف يرتبط مُنحني كلِّ اقترانٍ ممَّا يأتي بِمُنحني الاقترانِ الرئيس $f(x) = x^2$ ، ثمَّ أمثلهُ بيانياً:

1 $g(x) = -4x^2$

مُنحني $g(x)$ هو انعكاسٌ لِمُنحني $f(x) = x^2$ حول المحورِ x ، ثمَّ توسيعُ رأسيٍّ بِمعاملٍ مقدارُهُ 4

لتمثيل مُنحني $g(x)$ بيانياً اتَّبِعِ الإجراءاتِ الآتية:




- أختارُ مجموعةً مِنَ النقطِ تقعُ على مُنحني $f(x) = x^2$
- أضربُ الإحداثيَّ y للنقطِ التي اخترتها في -4
- أمثلُ النقطِ الجديدةَ في المُستوى الإحداثيِّ، ثمَّ أصلُ بينها بِمُنحني أملس، كما يظهرُ في الشكلِ المُجاورِ.

2 $h(x) = -\frac{1}{3}x^2 + 2$

مُنحني $h(x)$ هو انعكاسٌ لِمُنحني $f(x) = x^2$ حول المحورِ x ، ثمَّ تضيقُ رأسيٍّ بِمعاملٍ مقدارُهُ $\frac{1}{3}$ ، ثمَّ انسحابُ وحدتينِ إلى الأعلى.

لتمثيل مُنحني $h(x)$ بيانياً اتَّبِعِ الإجراءاتِ الآتية:



- أختارُ مجموعةً مِنَ النقطِ التي تقعُ على مُنحني $f(x) = x^2$
- أضربُ الإحداثيَّ y للنقطِ التي اخترتها في $-\frac{1}{3}$
- أضيفُ 2 إلى الإحداثيَّ y للنقطِ الناتجةِ مِنَ الخطوةِ السابقةِ.
- أمثلُ النقطِ مِنَ الخطوةِ السابقةِ في المُستوى الإحداثيِّ، ثمَّ أصلُ بينها بِمُنحني أملس، كما يظهرُ في الشكلِ المُجاورِ.

أتحقق من فهمي


أصف كيف يرتبط منحنى كل اقتران مما يأتي بمنحنى الاقتران الرئيس $f(x) = x^2$ ، ثم أمثله بيانياً:

a) $g(x) = -\frac{1}{2}x^2$

b) $g(x) = -x^2 - 4$

كتابة التحويل الهندسي للاقتران التربيعي

تسمى الصيغة $f(x) = a(x-h)^2 + k$ صيغة الرأس (vertex form) للاقتران التربيعي؛ حيث $a \neq 0$ و (h, k) هـو رأس القطع المكافئ، ويمكن استعمالها لكتابة قاعدة الاقتران التربيعي الناتج من تطبيق تحويل هندسي أو أكثر على الاقتران التربيعي الرئيس، بحيث يمثل h الانسحاب الأفقي، ويمثل k الانسحاب الرأسي، أما قيمة a فتمثل التمدد الرأسي، وتمثل إشارة a الانعكاس.



أتعلم

سميت الصيغة

$$f(x) = a(x-h)^2 + k$$

بصيغة الرأس للاقتران

التربيعي؛ لأنه يمكن بها

تحديد الرأس بسهولة.

مثال 5

إذا كان منحنى الاقتران $g(x)$ ناتجاً من انعكاس منحنى الاقتران الرئيس $f(x) = x^2$ حول المحور x ، ثم توسيع رأسي بمعامل مقدار 2، ثم انسحاب إلى اليسار بمقدار وحدتين، ثم انسحاب إلى الأعلى بمقدار 3 وحدات، فأجب عن الأسئلة الآتية:

أكتب قاعدة الاقتران $g(x)$ باستعمال صيغة الرأس.

- بما أن الانعكاس حول المحور x ، ومعامل التوسيع الرأسي 2، فإن $a = -2$
- بما أن الانسحاب الأفقي إلى اليسار بمقدار 2، فإن $h = -2$
- بما أن الانسحاب الرأسي إلى الأعلى بمقدار 3، فإن $k = 3$

أتعلم

أستعمل الإشارة السالبة

للدلالة على الانعكاس

حول المحور x ،

والانسحاب إلى اليسار

وإلى الأسفل.

$$g(x) = a(x-h)^2 + k$$

صيغة الرأس للاقتران التربيعي

$$= -2(x - (-2))^2 + 3$$

بتعويض $a = -2, h = -2, k = 3$

$$= -2(x + 2)^2 + 3$$

بالتبسيط

2 أجد إحداثيي رأس القطع، ومعادلة محور التماثل، والقيمة العظمى أو الصغرى للاقتران $g(x)$.


بما أن $g(x) = -2(x + 2)^2 + 3$ ، فإن:

- رأس القطع $(-2, 3)$
- معادلة محور التماثل $x = -2$
- القيمة العظمى 3

أذكر

بما أن $a < 0$ ، فإن رأس القطع المكافئ يمثل نقطة القيمة العظمى.

$$g(x) = -2(x+2)^2 + 3$$



3 أمثل الاقتران $g(x)$ بيانياً.

يمكنني استعمال التحويلات الهندسية لتمثيل منحنى الاقتران، كما في الشكل المُجاور.

أتحقق من فهمي

إذا كان منحنى الاقتران $g(x)$ ناتجاً من انعكاس منحنى الاقتران الرئيس $f(x) = x^2$ حول المحور x ، ثم تضيق رأسي بمعامل مقداره $\frac{1}{2}$ ، ثم انسحاب إلى اليمين بمقدار 3 وحدات، ثم انسحاب إلى الأسفل بمقدار 5 وحدات، فأجب عن الأسئلة الآتية:

(a) أكتب قاعدة الاقتران $g(x)$ باستعمال صيغة الرأس.

(b) أجد إحداثيي رأس القطع، ومعادلة محور التماثل، والقيمة العظمى أو الصغرى للاقتران $g(x)$.

(c) أمثل الاقتران $g(x)$ بيانياً.

إرشاد

استعمل أوراق الرسم البياني الموجودة في نهاية كتاب التمارين.

أَصِفْ كَيْفَ يَرْتَبِطُ مُنْحَنِي كُلِّ اقْتِرَانٍ مِمَّا يَأْتِي بِمُنْحَنِ الْاقْتِرَانِ الرَّئِيسِ $f(x) = x^2$ ، ثُمَّ أَمْثَلُهُ بِيَانِيًّا:

1 $h(x) = x^2 + 5$

2 $g(x) = x^2 - 6$

3 $h(x) = (x - 2)^2$

4 $g(x) = (x + 1)^2$

5 $v(x) = (x - 1)^2 + 3$

6 $u(x) = (x + 2)^2 - 4$

7 $l(x) = \frac{1}{4}x^2$

8 $m(x) = 2x^2 - 3$

9 $h(x) = -\frac{1}{3}x^2 - 1$

10 $g(x) = -4(x + 2)^2 + 3$

11 $p(x) = (x - 7)^2 + 1$

12 $t(x) = 2(x - 3)^2 - 10$




إِرْشَادٌ: أَسْتَعْمَلُ أَوْرَاقَ الرَّسْمِ الْبِيَانِيِّ الْمَوْجُودَةَ فِي نِهَآيَةِ كِتَابِ التَّمَارِينِ.

أَصِلُ الْاقْتِرَانَ بِتَمَثِيلِهِ الْبِيَانِيِّ فِي كُلِّ مِمَّا يَأْتِي:

13 $a(x) = 4(x + 8)^2 - 3$

14 $b(x) = -2(x - 8)^2 + 3$

15 $c(x) = -\frac{1}{2}(x + 3)^2 + 8$



إِذَا كَانَ مُنْحَنِي الْاقْتِرَانِ $g(x)$ نَاتِجًا مِنْ اِنْعِكَاسِ مُنْحَنِ الْاقْتِرَانِ الرَّئِيسِ $f(x) = x^2$ حَوْلَ الْمَحْوَرِ x ، ثُمَّ تَوْسِيعِ رَأْسِيٍّ بِمِعَامِلٍ مَقْدَارُهُ 4، ثُمَّ اِنْسِحَابٍ إِلَى الْأَعْلَى بِمِقْدَارٍ وَحَدَّتَيْنِ، فَاجِبْ عَنِ الْأَسْئَلَةِ الْآتِيَةِ:

16 أَكْتُبْ قَاعِدَةَ الْاقْتِرَانِ $g(x)$ بِاسْتِعْمَالِ صِيغَةِ الرَّأْسِ.

17 أَجِدْ إِحْدَائِيَّيْ رَأْسِ الْقَطْعِ، وَمُعَادَلَةَ مَحْوَرِ التَّمَاثُلِ، وَالْقِيَمَةَ الْعُظْمَى أَوِ الصُّغْرَى لِلْاقْتِرَانِ $g(x)$.

18 أَمْثِلْ الْاقْتِرَانَ $g(x)$ بِيَانِيًّا.


آليات ثقيلة: يمثل الاقتران $l(t) = -10t^2 + 200$ العلاقة بين عدد لترات الوقود $l(t)$ المتبقية في خزان آلية ثقيلة والزمن t بالساعات خلال مدة عملها؛ حيث $t \geq 0$.



- 19 ماذا تمثل نقطة رأس القطع المكافئ في سياق المسألة؟ أبرر إجابتي.
- 20 هل يمكن أن يكون معامل t^2 موجباً في مواقف حياتية مشابهة؟ أبرر إجابتي.
- 21 أصف العلاقة بين منحنى الاقتران $l(t)$ ، ومنحنى الاقتران الأصلي $f(t) = t^2$.

مهارات التفكير العليا


تبرير: في الشكل الآتي، إذا كان منحنى الاقتران g ناتجاً من تحويل هندسي أو أكثر لمنحنى الاقتران f ، فأجب عن السؤالين الآتيين:



22 أصف التحويلات الهندسية التي مرَّ بها منحنى الاقتران f لينتج الاقتران g ، وأبرر إجابتي.

23 أكتب قاعدة الاقتران g بصيغة الرأس.

24 **تحَدِّد:** أكتب بصيغة الرأس قاعدة الاقتران المُمثَّل بيانياً في الشكل الآتي:



اختبار نهاية الوحدة







أحدّد مجال كل علاقة مما يأتي ومداهها، ثم أحدّد ما إذا كانت تمثّل اقتراناً أم لا:

6 $\{(-1, 6), (4, 2), (2, 36), (1, 6)\}$

7 $\{(5, -4), (-2, 3), (5, -1), (2, 3)\}$

8

x	-4	-2	0	3
y	-2	1	2	1



15 **كرة:** ركّل خليل كرة عن سطح الأرض. إذا كانت العلاقة بين ارتفاع الكرة عن سطح الأرض h بالمتري والزمن t بالثواني مُعطاة بالاقتران $h = -5t^2 + 17t$ ، فأجد أقصى ارتفاع تصل إليه الكرة والزمن الذي تحتاج إليه حتى تصل إلى أقصى ارتفاع.

أختار رمز الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي:

1 مجال العلاقة:

هُوَ: $\{(3, 5), (2, -2), (1, 5), (0, -2), (1, 2)\}$

a) $\{0, 1, 2, 3\}$ b) $\{-2, 2, 5\}$

c) $\{0, 2, 3\}$ d) $\{-2, 0, 1\}$

2 إذا كان $f(x) = x^2 + 2x - 3$ ، فإن $f(1)$ تساوي:


a) -3 b) -1 c) 0 d) 3

3 مُعادلة محور التماثل للاقتران $f(x) = x^2 - 10x + 1$:

a) $y = 5$ b) $x = 10$

c) $x = 5$ d) $x = -5$

4 أيّ الاقترانات الآتية يعبر عن المنحنى المُمثّل بيانياً؟



a) $f(x) = -4x^2$ b) $f(x) = -4x^2 + 3$

c) $f(x) = x^2 + 3$ d) $f(x) = 1 - 4x^2$

5 إحداثيّات نقطة رأس القطع المكافئ للاقتران التربيعي هما $y = x^2 + 2x + 3$:

a) (0, 3) b) (2, 11)

c) (1, 6) d) (-1, 2)

قذيفة: يمثل الاقتران $h(t) = -16(t - 6)^2 + 576$ ارتفاع قذيفة عن سطح الأرض بالأمتار، بعد t ثانية من قذفها.

27 أجد ارتفاع القذيفة بعد 4 ثوانٍ من قذفها.

28 أجد أقصى ارتفاع تصل إليه القذيفة.

29 أصف علاقة مُنحني الاقتران $h(t)$ بمنحني الاقتران $f(t) = t^2$.

تدريب على الاختبارات الدولية

30 التحويلات اللذان أثر في مُنحني الاقتران $f(x) = x^2$ للحصول على مُنحني الاقتران $h(x) = 2(x-3)^2$ ، هما:

(a) تضيق رأسي وانسحاب 3 وحدات إلى اليمين.

(b) تضيق رأسي وانسحاب 3 وحدات إلى اليسار.

(c) توسيع رأسي وانسحاب 3 وحدات إلى اليسار.

(d) توسيع رأسي وانسحاب 3 وحدات إلى اليمين.

31 مدى الاقتران التربيعي $f(x) = 12x - 3x^2 + 3$

a) $\{y | y \leq 15\}$ b) $\{y | y \geq 15\}$

c) $\{y | y \leq 3\}$ d) $\{y | y \geq 3\}$


32 أي الاقترانات الآتية تمثل القطع المكافئ في الشكل الآتي؟

a) $y = -\frac{1}{3}x^2 - 4$

b) $y = -\frac{1}{3}x^2 + 4$

c) $y = -3x^2 - 4$

d) $y = 3x^2 + 4$



أجد إحداثيي الرأس ومعادلة محور التماثل، والقيمة العظمى أو الصغرى، ومجال كل من الاقترانات التربيعية الآتية ومداهما، ثم أمثلها بيانياً:

16 $f(x) = 2x^2 + 12x + 4$

17 $f(x) = -8x^2 - 16x - 9$

18 $f(x) = 3x^2 - 18x + 15$

19 $f(x) = -\frac{1}{2}x^2 - 11x + 6$

أصف كيف يرتبط مُنحني كل اقتران مما يأتي بمنحني الاقتران الرئيس $f(x) = x^2$ ، ثم أمثلها بيانياً:

20 $p(x) = 4(x - 6)^2 - 9$



21 $p(x) = \frac{1}{2}(x + 8)^2$

22 $t(x) = -3x^2 + 5$

23 $h(x) = (x + 5)^2$

24 $g(x) = -(x + 4)^2 - 3$

أجد إحداثيي الرأس ومعادلة محور التماثل، والقيمة العظمى أو الصغرى، ومجال كل من القطوع المكافئة الآتية ومداهما:



ما أهميّةُ هذهِ
الوحدةِ؟

تُستعملُ المُعادلاتُ كثيرًا لنمذجةِ حركةِ الأجسامِ في
المواقفِ الحياتيّةِ والعمليّةِ، ويمكنُ عن طريقِ حلِّ تلكِ
المُعادلاتِ تحديدُ قيمٍ مهمّةٍ في هذهِ المواقفِ، مثل:
تحديدِ زمنِ تحليقِ الجسمِ المقذوفِ قبلَ ارتطامِهِ
بالأرضِ، أو المسافةِ الأفقيّةِ التي تقطعُها
الدلافينُ عندَ قفزها خارجَ الماءِ.

سأتعلّمُ في هذهِ الوحدةِ:

- ◀ حلّ المُعادلةِ التربيعةِ بيانيًا.
- ◀ حلّ المُعادلةِ التربيعةِ بالتحليلِ.
- ◀ حلّ المُعادلةِ التربيعةِ بإكمالِ المُربّعِ.
- ◀ حلّ المُعادلةِ التربيعةِ باستعمالِ القانونِ العامِّ.
- ◀ حلّ مُعادلاتِ خاصّةِ.

تعلّمتُ سابقًا:

- ✓ تحليلِ المقاديرِ الجبريّةِ بإخراجِ العاملِ
المُشترِكِ الأكبرِ، وتجميعِ الحدودِ.
- ✓ تحليلِ الفرقِ بينِ مُربّعي حدّينِ، وتحليلِ
ثلاثيّ الحدودِ على الصورةِ $x^2 + bx + c$
- ✓ التمثيلِ البيانيِّ لِمُنحنى الاقترانِ التربيعةِ.



بناءً منجنيق، وكتابةً الاقتران الممثل لحركة الكرة المقذوفة منه،
وحل المعادلة التربيعية المرتبطة بالاقتران.

أعواد آيس كريم، سيليكون لاصق، مطاطات، غطاء بلاستيكي، كرة
مطاطية، ساعة مؤقتة.

فكرة المشروع



المواد والأدوات



خطوات تنفيذ المشروع:

1 أشاهد المقطع المرئي (الفيديو) في الرمز المجاور.

2 أنفذ خطوات صناعة المنجنيق من أعواد الآيس كريم، كما في المقطع المرئي.

3 باستعمال المنجنيق، أطلق كرة مطاطية بجانب حائط، وأحدّد أقصى ارتفاع تصل إليه، وأستعمل الساعة المؤقتة لأحدّد بعد كم ثانية وصلت إلى سطح الأرض.

4 أستعمل المعلومات من الخطوة السابقة لكتابة قاعدة الاقتران التربيعي الممثل لمنحنى القطع المكافئ، الذي يمثل ارتفاع الكرة المطاطية بالنسبة إلى الزمن، وأستعين بالصيغة: $f(t) = -5t^2 + vt$ ؛ حيث t الزمن بالثواني، و $f(t)$ ارتفاع الكرة بالأمتار، و v السرعة الابتدائية.

5 أبحث في شبكة الإنترنت عن تصميمين آخرين للمنجنيق من أعواد الآيس كريم باستعمال الكلمات المفتاحية: catapult with popsicle sticks، وأتبع الخطوات اللازمة لتنفيذ التصميمين.

6 أطلق الكرة المطاطية باستعمال كل من التصميمين، وأنفذ الخطوتين 3 و 4 مرة أخرى، وأقارن بين الاقترانات الناتجة من حيث: أقصى ارتفاع، والمدّة التي بقيت فيها الكرة في الهواء.

7 أكتب المعادلة التربيعية الخاصة بكل تصميم من التصميم الثلاثة، وأحلّها باستعمال الطرائق الآتية (إن أمكن): التمثيل البياني، والتحليل، وإكمال المربع، والقانون العام، وأبين أي الطرائق لا يمكن حل المعادلات التربيعية بها.

عرض النتائج:

أعدّ عرضًا تقديميًا أبين فيه خطوات تنفيذ المشروع موضحةً بالصور، وبعض الصعوبات التي واجهتها في أثناء العمل.



حلُّ المُعادلاتِ التربيعيةِ بيانيًّا

Solving Quadratic Equations by Graphing



حلُّ المُعادلةِ التربيعيةِ بيانيًّا.

المُعادلةُ التربيعيةُ، جذورُ المُعادلةِ، أصفارُ الاقترانِ.

يمثِّلُ الاقترانُ $h(t) = -5t^2 + 10t$ ارتفاعَ دولفينٍ بالمترِ فوق سطحِ الماءِ بعدَ t ثانيةً من ظهوره فوق هذا السطح. كم ثانيةً يبقى الدولفينُ خارجَ الماءِ؟

فكرةُ الدرس



المصطلحاتُ



مسألةُ اليوم



حلُّ المُعادلةِ التربيعيةِ بيانيًّا

المُعادلةُ التربيعيةُ (quadratic equation) مُعادلةٌ يمكنُ كتابتها على الصورة: $ax^2 + bx + c = 0$ ، حيث $a \neq 0$ ، والتي تُسمَّى الصورة القياسية للمُعادلةِ التربيعيةِ، ولكلِّ مُعادلةٍ تربيعيةٍ اقترانٌ تربيعيٌّ مُرتبطٌ بها يمكنُ الحصولُ عليه بوضع $f(x)$ بدلاً من العددِ 0

المُعادلةُ التربيعيةُ

$$2x^2 - 3x + 8 = 0$$

الاقترانُ التربيعيُّ المُرتبطُ بالمُعادلةِ

$$f(x) = 2x^2 - 3x + 8$$

يمكنُ حلُّ المُعادلةِ التربيعيةِ بتحديدِ قِيمِ x التي يقطعُ عندها منحنى الاقترانِ التربيعيِّ المُرتبطُ بالمُعادلةِ المحورَ x ، وتُسمَّى تلكَ القِيمُ **جذورُ المُعادلةِ** (roots of the equation) أو **أصفارَ الاقترانِ** (zeros of the function).

يمكنُ حلُّ المُعادلةِ التربيعيةِ بيانيًّا باتِّباعِ الخُطواتِ الآتية:

حلُّ المُعادلةِ التربيعيةِ بيانيًّا

مفهومٌ أساسيٌّ

لحلِّ المُعادلاتِ التربيعيةِ بيانيًّا اتَّبِعِ الخُطواتِ الآتية:


الخطوةُ 1: اكتبِ المُعادلةَ بالصورة القياسية $ax^2 + bx + c = 0$

الخطوةُ 2: أمثلُ بيانيًّا الاقترانَ التربيعيَّ المُرتبطَ بالمُعادلةِ وهو: $f(x) = ax^2 + bx + c$

الخطوةُ 3: أجدُ قِيمَ x التي يقطعُ عندها منحنى الاقترانِ المُرتبطِ المحورَ x ، إن وُجِدَتْ، وهي أصفارُ الاقترانِ المُرتبطِ، التي تُعدُّ حلولَ المُعادلةِ.

أتعلَّمُ

يمكنُ أن يكونَ للمُعادلةِ التربيعيةِ حلانِ حقيقيانِ مختلفانِ، أو حلٌّ حقيقيٌّ واحدٌ، أو ألا يكونَ لها حلولٌ حقيقيةٌ.



حلُّ المُعادلة التربيعية بيانيًا: حلان حقيقيان مختلفان

يكون للمعادلة التربيعية حلان حقيقيان، إذا قطع منحنى الاقتران التربيعي المرتبط المحور x في نقطتين مختلفتين، كما في الشكل المجاور.

مثال 1

أحلُّ المعادلة $x^2 + 2x = 3$ بيانيًا.

الخطوة 1: أكتب المعادلة بالصورة القياسية، ثم أكتب الاقتران التربيعي المرتبط بالمعادلة.


$$x^2 + 2x = 3$$

المعادلة المُعطاة

$$x^2 + 2x - 3 = 0$$

ب طرح 3 من طرفي المعادلة

إذن، الاقتران التربيعي المرتبط بالمعادلة: $f(x) = x^2 + 2x - 3$



الخطوة 2: أمثل الاقتران التربيعي المرتبط بالمعادلة بيانيًا.

• بما أن $a > 0$ ، فالتمثيل البياني للقطع المكافئ يكون مفتوحًا للأعلى.

• معادلة محور التماثل: $x = -1$

• إحداثيات الرأس: $(-1, -4)$

• نقطة تقاطع الاقتران مع المحور y ، هي: $(0, -3)$ ، ونقطة أخرى تقع في الجانب الذي يقع

فيه المقطع y من محور التماثل وهي مثلًا: $(1, 0)$.

• أمثل الرأس والنقطتين في المستوى الإحداثي، ثم أستعمل التماثل لأعكسهما.

الخطوة 3: أجد القيم التي يقطع عندها المنحنى المحور x .

يقطع المنحنى المحور x عند $x = 1, -3$

إذن، للمعادلة جذران، هما: $x = 1, x = -3$

التحقق: أتتحقق من صحة كل من الحلين بالتعويض في المعادلة الأصلية.

$$x^2 + 2x = 3$$

المعادلة المُعطاة

$$x^2 + 2x = 3$$

$$(-3)^2 + 2(-3) \stackrel{?}{=} 3$$

بالتعويض

$$(1)^2 + 2(1) \stackrel{?}{=} 3$$

$x = -3$ or $x = 1$

$$3 = 3 \quad \checkmark$$

بالتبسيط

$$3 = 3 \quad \checkmark$$

أتذكّر

القطع المكافئ مفتوح للأعلى إذا كانت $a > 0$ ومفتوح للأسفل إذا كانت $a < 0$

أتذكّر

معادلة محور التماثل لمنحنى الاقتران التربيعي $f(x) = ax^2 + bx + c$ حيث $a \neq 0$ هي $x = -\frac{b}{2a}$ رأسه $\left(-\frac{b}{2a}, f\left(-\frac{b}{2a}\right)\right)$


أتحقق من فهمي

أحلُّ المعادلة $2x^2 - 2 = 0$ بيانياً.

إرشاد

أستعمل أوراق الرسم البياني الموجودة في نهاية كتاب التمارين.

حلُّ المعادلة التربيعية بيانياً: حل حقيقي واحد.




يكون للمعادلة التربيعية حل حقيقي واحد إذا قطع منحنى الاقتران التربيعي المرتبط المحور x في نقطة واحدة فقط، كما في الشكل المجاور.

مثال 2

أحلُّ المعادلة $-x^2 - 4x - 4 = 0$ بيانياً.

الخطوة 1: أكتب المعادلة بالصورة القياسية، ثم أكتب الاقتران التربيعي المرتبط بالمعادلة. ألاحظ أن المعادلة مكتوبة بالصورة القياسية. إذن، الاقتران التربيعي المرتبط بالمعادلة:

$$f(x) = -x^2 - 4x - 4$$



الخطوة 2: أمثل الاقتران المرتبط بالمعادلة بيانياً.

- بما أن $a < 0$ ، فالتمثيل البياني للقطع المكافئ يكون مفتوحاً للأسفل.
- معادلة محور التماثل: $x = -2$
- إحداثي الرأس: $(-2, 0)$

- نقطة تقاطع الاقتران مع المحور y ، هي: $(0, -4)$ ، ونقطة أخرى تقع في الجانب الذي يقع فيه المقطع y من محور التماثل وهي مثلاً: $(-1, -1)$.
- أمثل الرأس والنقطتين في المستوى الإحداثي، ثم أستعمل التماثل لأعكسهما.

الخطوة 3: أجد القيم التي يقطع عندها المنحنى المحور x .

يقطع المنحنى المحور x عند -2

إذن، للمعادلة جذرٌ وحيدٌ، هو: $x = -2$

أتعلم

ألاحظ أن الإحداثي x لرأس القطع هو حل المعادلة الوحيد، عندما يكون للمعادلة حل واحد فقط.

التحقّق: أتحقّق من صحّة الحلّ الوحيد بالتعويض في المُعادلة الأصليّة.

$$-x^2 - 4x - 4 = 0$$

المُعادلة المُعطاة

$$-(-2)^2 - 4(-2) - 4 \stackrel{?}{=} 0$$


بالتعويض $x = -2$

$$0 = 0 \quad \checkmark$$

بالتبسيط

أتحقّق من فهمي

أحلّ المُعادلة $x^2 - 8x = -16$ بيانياً.



حلّ المُعادلة التربيعيّة بيانياً: لا توجد حلول حقيقيّة.


لا يكون للمُعادلة التربيعيّة حلّ حقيقيّ إذا لم يقطع منحنى الاقتران التربيعيّ المرتبط بالمُعادلة التربيعيّة المحور x ، كما في الشكل المُجاور.

مثال 3

أحلّ المُعادلة $x^2 + 2x + 4 = 0$ بيانياً.

الخطوة 1: أكتب المُعادلة بالصورة القياسية، ثمّ أكتب الاقتران التربيعيّ المرتبط بالمُعادلة. ألاحظ أنّ المُعادلة مكتوبة بالصورة القياسية. إذن، الاقتران التربيعيّ المرتبط بالمُعادلة:

$$f(x) = x^2 + 2x + 4$$



الخطوة 2: أمثل الاقتران المرتبط بالمُعادلة بيانياً.

- بما أن $a > 0$ ، فالتمثيل البيانيّ للقطع المكافئ يكون مفتوحاً للأعلى.
- مُعادلة محور التماثل: $x = -1$
- إحداثيّ الرأس: $(-1, 3)$
- نقطة تقاطع الاقتران مع المحور y ، هي: $(0, 4)$ ، ونقطة أخرى تقع في الجانب الذي يقع فيه المقطع y من محور التماثل وهي مثلاً: $(1, 7)$.
- أمثل الرأس والنقطتين في المستوى الإحداثيّ، ثمّ أستعمل التماثل لأعكسهما.

الخطوة 3: أجد القيم التي يقطع عندها المنحنى المحور x .

ألاحظ أن التمثيل البياني للاقتران المرتبط لا يقطع المحور x .

إذن، لا يوجد جذر حقيقي للمعادلة.

أتحقق من فهمي

أحلل المعادلة $4x = 5 + x^2$ بيانياً.

إرشاد

أستعمل أوراق الرسم البياني الموجودة في نهاية كتاب التمارين.


يأخذ مسار بعض المقذوفات شكل القطع المكافئ؛ لذا يمكن استعمال خصائص الاقترانات التربيعية لتحديد زمن بقاء المقذوف في الهواء والمسافة الأفقية التي يقطعها.

مثال 4: من الحياة

نوافير: يمثل الاقتران $h(x) = 3x - x^2$ ارتفاع قطرة ماء متدفقة من فوهة نافورة بالأمتار عندما تكون على بعد x متراً من الفوهة. أستعمل التمثيل البياني لأجد أبعاد نقطة أفقية تصل إليها قطرة الماء.

يكون ارتفاع قطرة الماء عند خروجها من فوهة النافورة 0 m، ويكون ارتفاعها 0 m عند عودتها إلى سطح الأرض؛ لذا فإن أبعاد نقطة أفقية تصلها قطرة الماء تكون عندما يقطع الاقتران $h(x) = 3x - x^2$ المحور x .

إذن، أحلل المعادلة $3x - x^2 = 0$ بيانياً لأحدد هاتين القيمتين.



الخطوة 1: أمثل الاقتران $h(x) = 3x - x^2$ بيانياً.

الخطوة 2: أجد القيم التي يقطع عندها المنحنى المحور x .


بما أن المقطع x للاقتران هو 3، فإن أبعاد نقطة تصل إليها قطرة الماء هي على بعد 3 m من النافورة.

معلومة

برع المهندسون المسلمون في العصر الأندلسي في تصميم النوافير، وابتكروا لها طرائق ميكانيكية معقدة لضخ الماء من غير محركات.

أفكر

لماذا اكتفي بتمثيل الاقتران فوق المحور x الموجب؟



أتحقق من فهمي

فيزياء: في تجربة فيزيائية، قذفت صفاة كتلة إلى الأعلى، فمَثَّل الاقتران $h(t) = -5t^2 + 20t$ ارتفاع هذه الكتلة بالأمتار، بعد t ثانية من قذفها. أستعمل التمثيل البياني لأجد زمن بقاء الكتلة في الهواء.

أندرب وأحل المسائل

أحل كلاً من المعادلات الآتية بيانياً:

1 $x^2 - 9 = 0$

2 $x^2 - 5x = 0$

3 $-12x^2 = 16$

4 $-x^2 + 12x = 36$

5 $x^2 - 6x + 9 = 0$

6 $x^2 - 6x = 7$

7 $x^2 + x - 6 = 0$

8 $x^2 = 6x - 8$


9 $-x^2 + 4 = 3x$

10 $x^2 + 3x + 6 = 0$

11 $2x^2 - 5x = -6$

12 $2x^2 + 32 = -20x$

إرشاد: أستعمل أوراق الرسم البياني الموجودة في نهاية كتاب التمارين.



رياضة: يبين الشكل المُجاور ارتفاع لاعبِ جُمبازِ $f(t)$ بالأمتار بعد t ثانية من وثبه عن سطح الأرض.

13 كم ثانية بقي اللاعب في الهواء؟

14 ما أقصى ارتفاع وصل إليه اللاعب؟

15 هل يمثل الاقتران $f(t) = -5t^2 + 10t$ حركة لاعبِ الجُمبازِ؟

أبرر إجابتي.



16 **طيور:** التقط نسر سمكة من بحيرة وطار بها، وعندما وصل إلى ارتفاع 9 m تمكنت السمكة من التحرر لتسقط مرة أخرى في البحيرة. إذا علمت أن الاقتران $h(t) = -5t^2 + 9$ يمثل ارتفاع السمكة بالأمتار بعد t ثانية من سقوطها، فاستعمل التمثيل البياني لأجد زمن بقاء السمكة في الهواء.

مهارات التفكير العليا

17 **أكتشف المختلف:** أي المعادلات الآتية مختلفة؟ أبرر إجابتي.


$$x^2 - 6x + 8 = 0$$

$$x^2 - 2x - 3 = 0$$

$$x^2 + 2x - 3 = 0$$

$$x^2 + 5x - 6 = 0$$

18 **تبرير:** بين الشكل الآتي مستطيلاً مساحته 50 m^2 . استعمل التمثيل البياني لأجد قيمة x ، وأبرر إجابتي.



مسألة مفتوحة: أكتب معادلة تحقق الوصف المعطى في كل مما يأتي:

19 معادلة تربيعية ليس لها جذر حقيقي.

20 معادلة تربيعية لها جذر حقيقي واحد.

21 معادلة تربيعية لها جذران صحيحان موجبان.

حلُّ المُعادلاتِ التربيعيةِ بالتحليلِ (1) Solving Quadratic Equations by Factoring (1)

حلُّ المُعادلاتِ التربيعيةِ بالتحليلِ.

خاصيةُ الضربِ الصِّفريِّ.

فكرةُ الدرس



المصطلحات



مسألةُ اليوم



يمثلُ الاقترانُ $h(t) = -16t^2 + 7t$ ارتفاعَ كَنغُرٍ بالقدمِ فوقَ سطحِ الأرضِ بعدَ t ثانيةٍ مِنْ قفزِهِ. كمَ ثانيةً تقريباً يحتاجُ الكَنغُرُ ليعودَ إلى سطحِ الأرضِ؟

حلُّ المُعادلاتِ التربيعيةِ بالتحليلِ، وبخاصيةِ الضربِ الصِّفريِّ.

تعلَّمتُ في الدرسِ السابقِ حلَّ المُعادلاتِ التربيعيةِ بيانياً، وسأتعلَّمُ في هذا الدرسِ حلَّها جبرياً.

أَتأمَّلُ كُلاً مِنَ الجُمَلِ الآتيةِ:

$$6(0) = 0 \quad 0(-5) = 0 \quad (7-7)(0) = 0$$

ألاحظُ أنَّ أحدَ العاملينِ على الأقلِّ في كلِّ حالةٍ ممَّا سبقَ يُساوي صِفراً؛ لذا فإنَّ حاصلَ ضربِهما يُساوي صِفراً، وهذا ما يُسمَّى **بخاصيةِ الضربِ الصِّفريِّ** (zero-product property).

خاصيةُ الضربِ الصِّفريِّ

مفهومٌ أساسيٌّ

بالكلمات: إذا كانَ حاصلُ ضربِ عدديْنِ حقيقيَّيْنِ يُساوي صِفراً، فإنَّ أحدهما على الأقلِّ يجبُ أن يكونَ صِفراً.

بالرموز: إذا كانَ a و b عدديْنِ حقيقيَّيْنِ، وكانَ $ab = 0$ ، فإنَّ:

$$a = 0 \quad \text{or} \quad b = 0$$

يمكنُ استعمالُ خاصيةِ الضربِ الصِّفريِّ والتحليلِ لحلِّ المُعادلاتِ التربيعيةِ، فإذا كانَ أحدُ طرفي مُعادلةٍ مكتوباً بالصورة التحليلية، والطرفُ الآخرُ هو 0، فيمكنُ استعمالُ خاصيةِ الضربِ الصِّفريِّ لحلِّها.

أذكُر

كتابةُ مقدارٍ جبريِّ بالصورة التحليلية يعني تحليلاً كاملاً. مثل:

$$\begin{aligned} \bullet x^2 + 5x &= x(x + 5) \\ \bullet x^2 + 3x + 2 &= (x + 2)(x + 1) \end{aligned}$$

حلُّ المُعادلة التربيعية بالتحليل

لحلُّ المُعادلات التربيعية بالتحليل، اتَّبِعْ الخُطوات الآتية:

الخطوة 1: أنقل جميع الحدود إلى الطرف الأيسر من المُعادلة، وأترك الصفر في الطرف الأيمن.

الخطوة 2: أحلل المقدار الجبري في الطرف الأيسر من المُعادلة على صورة حاصل ضرب عاملين.

الخطوة 3: أساوي كل عامل بالصفر (خاصية الضرب الصفرية)، وأحل كل مُعادلة خطية.

الخطوة 4: حلول المُعادلة التربيعية هي حلول المُعادلتين الخطيتين.

حلُّ المُعادلات التربيعية بالتحليل: إخراج العامل المشترك الأكبر

تعلّمت سابقاً أنه يمكن تحليل المقدار الجبري بإخراج العامل المشترك الأكبر لحدوده، ويمكن استعمال هذه الطريقة من التحليل لحلُّ المُعادلات التربيعية، كما في المثال الآتي:

أذكّر

إخراج العامل المشترك الأكبر لحدودٍ مقداري جبري هي عملية عكسية لعملية التوزيع.

مثال 1

أحلُّ كلاً من المُعادلات الآتية:

1 $x^2 = -5x$

$x^2 = -5x$ المُعادلة المُعطاة

$x^2 + 5x = 0$ بجمع $5x$ إلى طرفي المُعادلة

$x(x + 5) = 0$ بإخراج العامل المشترك الأكبر

$x = 0$ or $x + 5 = 0$ خاصية الضرب الصفرية

$x = -5$ بحل كل مُعادلة

إذن، الجذران هما: $-5, 0$

التحقّق: أعوّض قيمتي x في المُعادلة الأصليّة.

عندما $x = 0$

$$x^2 = -5x$$

$$(0)^2 \stackrel{?}{=} -5(0)$$

$$0 = 0 \quad \checkmark$$

عندما $x = -5$

$$x^2 = -5x$$

$$(-5)^2 \stackrel{?}{=} -5(-5)$$

$$25 = 25 \quad \checkmark$$

2 $6x^2 = 20x$

$$6x^2 = 20x$$

$$6x^2 - 20x = 0$$

$$2x(3x - 10) = 0$$

$$2x = 0 \quad \text{or} \quad 3x - 10 = 0$$

$$x = 0 \quad x = \frac{10}{3}$$

المُعادلة المُعطاة

بَطْرَح $20x$ مِنْ طَرَفِيّ المُعادلة

بِإِخْرَاجِ الْعَامِلِ الْمُشْتَرِكِ الْأَكْبَرِ

خَاصِيَّةُ الضَّرْبِ الصَّفْرِيِّ

بِحَلِّ كُلِّ مُعادلةٍ

إِذْن، الْجِذْرَانِ هُمَا: $0, \frac{10}{3}$

التحقّق: أعوّض قيمتي x في المُعادلة الأصليّة.

أتحقّق مِنْ فهمي 

أحلُّ كُلاًّ مِنْ المُعادلاتِ الآتية:

a) $x^2 - 3x = 0$

b) $8x^2 = -12x$

حلُّ المُعادلاتِ التربيعيّةِ بالتحليل: الصورة القياسيّة $x^2 + bx + c = 0$

إذا كان المقدار الجبري $x^2 + bx + c$ قابلاً للتحليل، فيمكن أيضاً استعمال خاصيّة الضرب

الصّفريّ لحلّ المُعادلة التربيعيّة المكتوبة بالصورة القياسيّة $x^2 + bx + c = 0$.

أتذكّر

لتحليل ثلاثي حدودٍ على الصورة $x^2 + bx + c$ ، أبحثُ عَنْ عدديّين صحيحين m وَ n مجموعُهُما يُساوي b ، وحاصلُ ضربِهِما يُساوي c ، ثمّ أكتبُ $x^2 + bx + c$ على الصورة $(x+m)(x+n)$.

مثال 2

أحلُّ كلاً مِنَ المُعادلاتِ الآتية:

1 $x^2 + 6x + 8 = 0$

$$x^2 + 6x + 8 = 0$$

$$(x + 4)(x + 2) = 0$$

$$x + 4 = 0 \quad \text{or} \quad x + 2 = 0$$

$$x = -4 \qquad x = -2$$

المُعادلةُ المُعطاةُ

بالتحليلِ إلى العواملِ

خاصيةُ الضربِ الصّفريِّ

بحلِّ كلِّ مُعادلةٍ

إذن، الجذرانِ هما: $-4, -2$

التحقُّق: أعوِّض قيمتي x في المُعادلةِ الأصليَّةِ.

أندكّر

بما أن $b = 6, c = 8$ فأبحثُ عن عدديْن صحيحَيْن موجبيْن مجموعُهُما 6 وحاصلُ ضربِهِما 8

2 $x^2 - 8x + 12 = 0$

$$x^2 - 8x + 12 = 0$$

$$(x - 6)(x - 2) = 0$$

$$x - 6 = 0 \quad \text{or} \quad x - 2 = 0$$

$$x = 6 \qquad x = 2$$

المُعادلةُ المُعطاةُ

بالتحليلِ إلى العواملِ

خاصيةُ الضربِ الصّفريِّ

بحلِّ كلِّ مُعادلةٍ

إذن، الجذرانِ هما: $6, 2$

التحقُّق: أعوِّض قيمتي x في المُعادلةِ الأصليَّةِ.

أندكّر

بما أن $b = -8, c = 12$ فأبحثُ عن عدديْن صحيحَيْن سالبَيْن مجموعُهُما -8 وحاصلُ ضربِهِما 12

3 $x^2 + 5x = 6$

$$x^2 + 5x = 6$$

$$x^2 + 5x - 6 = 0$$

$$(x - 1)(x + 6) = 0$$

$$x - 1 = 0 \quad \text{or} \quad x + 6 = 0$$

$$x = 1 \qquad x = -6$$

المُعادلةُ المُعطاةُ

ب طرح 6 من طرفي المُعادلةِ

بالتحليلِ إلى العواملِ

خاصيةُ الضربِ الصّفريِّ

بحلِّ كلِّ مُعادلةٍ

إذن، الجذرانِ هما: $1, -6$

التحقُّق: أعوِّض قيمتي x في المُعادلةِ الأصليَّةِ.

أندكّر

بما أن $b = 5, c = -6$ فأبحثُ عن عدديْن صحيحَيْن مُختلفَيْن في الإشارةِ مجموعُهُما 5 وحاصلُ ضربِهِما -6

أنتحَقِّقْ مِنْ فَهْمِي

أحلُّ كُلِّ مِّنَ الْمُعَادَلَاتِ الْآتِيَةِ:

a) $x^2 + 7x = -6$

b) $x^2 - 9x + 8 = 0$

c) $x^2 - 4x - 21 = 0$

حلُّ الْمُعَادَلَاتِ التَّرْبِيعِيَّةِ بِالتَّحْلِيلِ: تَحْلِيلُ الْفَرْقِ بَيْنَ مُرَبَّعَيْنِ

يُمْكِنُ اسْتِعْمَالُ خَاصِيَّةِ الضَّرْبِ الصُّفْرِيِّ وَالتَّحْلِيلِ لِحَلِّ مُعَادَلَاتٍ تَرْبِيعِيَّةٍ تَتَضَمَّنُ فَرْقًا بَيْنَ مُرَبَّعَيْنِ فِي أَحَدِ طَرَفَيْهَا، وَصَفْرًا فِي طَرَفِهَا الْآخَرَ.

مثال 3

أحلُّ كُلِّ مِّنَ الْمُعَادَلَاتِ الْآتِيَةِ:

1 $x^2 - 36 = 0$

$$x^2 - 36 = 0$$

المُعَادَلَةُ الْمُعْطَاةُ

$$(x - 6)(x + 6) = 0$$

بِتَحْلِيلِ الْفَرْقِ بَيْنَ مُرَبَّعَيْنِ

$$x - 6 = 0 \quad \text{or} \quad x + 6 = 0$$

خَاصِيَّةِ الضَّرْبِ الصُّفْرِيِّ

$$x = 6$$

$$x = -6$$

بِحَلِّ كُلِّ مُعَادَلَةٍ

إِذْنُ، الْجَذْرَانِ هُمَا: $6, -6$

التَّحْقِيقُ: أَعْوِضْ قِيَمَتَيْ x فِي الْمُعَادَلَةِ الْأَصْلِيَّةِ.

2 $8x^2 - 50 = 0$

$$8x^2 - 50 = 0$$

المُعَادَلَةُ الْمُعْطَاةُ

$$4x^2 - 25 = 0$$

بِقِسْمَةِ طَرَفِي الْمُعَادَلَةِ عَلَى 2

$$(2x - 5)(2x + 5) = 0$$

بِتَحْلِيلِ الْفَرْقِ بَيْنَ مُرَبَّعَيْنِ

$$2x - 5 = 0 \quad \text{or} \quad 2x + 5 = 0$$

خَاصِيَّةِ الضَّرْبِ الصُّفْرِيِّ

$$x = \frac{5}{2}$$

$$x = -\frac{5}{2}$$

بِحَلِّ كُلِّ مُعَادَلَةٍ

إِذْنُ، الْجَذْرَانِ هُمَا: $\frac{5}{2}, -\frac{5}{2}$

التَّحْقِيقُ: أَعْوِضْ قِيَمَتَيْ x فِي الْمُعَادَلَةِ الْأَصْلِيَّةِ.

أَتَذَكَّرُ

الْفَرْقُ بَيْنَ مُرَبَّعَيْ حَدَّيْنِ يُسَاوِي نَاتِجَ ضَرْبِ مَجْمُوعِ الْحَدَّيْنِ فِي الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا.

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

أَتَذَكَّرُ

يَحْتَاجُ تَحْلِيلُ بَعْضِ الْمَقَادِيرِ الْجَبْرِيَّةِ إِلَى إِجْرَاءِ خُطَوَاتَيْنِ، مِثْلُ: إِخْرَاجِ الْعَامِلِ الْمُشْتَرَكِ الْأَكْبَرِ لِلْحُدُودِ جَمِيعِهَا، ثُمَّ تَحْلِيلِ مَا تَبَقِيَ مِنْ الْمَقْدَارِ بِاسْتِعْمَالِ تَحْلِيلِ الْفَرْقِ بَيْنَ مُرَبَّعَيْنِ، أَوْ تَحْلِيلِ الْعِبَارَةِ التَّرْبِيعِيَّةِ.

أتحقق من فهمي

أحلُّ كلاً من المعادلات الآتية:

a) $4x^2 - 1 = 0$

b) $2x^2 - 18 = 0$

حلُّ المعادلات التربيعية بالتحليل: تحليل المربع الكامل ثلاثي الحدود

تعلّمت سابقاً أنّ ثلاثي الحدود على الصورة $a^2 + 2ab + b^2$ أو الصورة $a^2 - 2ab + b^2$ يُسمّى مُربّعاً كاملاً ثلاثي الحدود، ويمكن تحليله كالآتي:

$$a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)(a + b)$$

$$a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)(a - b)$$

إذن، ينتج المربع الكامل ثلاثي الحدود من ضرب مقدار جبري في نفسه، وهذا يعني وجود عاملٍ مُكرّرٍ عند حلِّ مُعادلةٍ تربيعيةٍ تحتوي على مُربّعٍ كاملٍ ثلاثيٍّ حدودٍ في أحد طرفيها وتحتوي في طرفها الآخر على صفر، وحينها تكفي مُساواة أحد هذين العاملين بالصفر عند استخدام خاصية الضرب الصفري.

مثال 4

أحلُّ المعادلة: $9x^2 + 6x + 1 = 0$

$$9x^2 + 6x + 1 = 0$$

المُعادلة المُعطاة

$$(3x)^2 + 2(3x)(1) + 1^2 = 0$$

أكتب الطرف الأيسر على الصورة $a^2 + 2ab + b^2$

$$(3x + 1)(3x + 1) = 0$$

بتحليل المربع الكامل ثلاثي الحدود

$$3x + 1 = 0$$

خاصية الضرب الصفري


$$x = -\frac{1}{3}$$

بحلُّ المعادلة

إذن، للمعادلة جذرٌ واحدٌ، هو: $-\frac{1}{3}$

التحقّق: أعوّض قيمة x في المُعادلة الأصليّة.

الدعم البياني:



يظهر في الشكل المُجاور مُنحنى الاقتران التربيعي المرتبط بالمعادلة $9x^2 + 6x + 1 = 0$ ، الذي يقطع المحور x في نقطة واحدة؛ ما يعني وجود حل واحد للمعادلة.

أتحقق من فهمي

أحلُّ المعادلة: $x^2 - 6x + 9 = 0$

حلُّ المعادلات التربيعية باستعمال الجذر التربيعي

تعلّمت سابقاً أنّه يمكنُ حلُّ المعادلات على الصورة $x^2 = c$ ؛ حيث $c \geq 0$ ، باستعمال تعريف الجذر التربيعي للعدد الموجب؛ حيث: $x = \pm\sqrt{c}$ ، أمّا إذا لم تكن المعادلة التربيعية مكتوبة على الصورة $x^2 = c$ ، فاستعمل العمليات الجبرية لكتابة x^2 وحده في أحد طرفي المعادلة أولاً، إن أمكن، ثمّ أحلُّ المعادلة بأخذ الجذر التربيعي لكل طرف.

مثال 5

أحلُّ كلاً من المعادلات الآتية:

1 $3x^2 - 27 = 0$

$3x^2 - 27 = 0$

المعادلة المُعطاة

$3x^2 = 27$

بجمع 27 إلى طرفي المعادلة

$x^2 = 9$

بقسمة طرفي المعادلة على 3

$x = \pm\sqrt{9}$

بأخذ الجذر التربيعي للطرفين

$x = \pm 3$

بالتبسيط

إذن، الجذران هما: 3، -3

التحقق: للتحقق، أعوّض قيمتي x في المعادلة الأصلية.

أفكّر

هل يمكنُ حلُّ الفرع 1 من المثال 5 بطريقة أخرى؟

2 $(x + 4)^2 = 49$

$$(x + 4)^2 = 49$$

$$x + 4 = \pm\sqrt{49}$$

$$x + 4 = \pm 7$$

$$x = -4 \pm 7$$

$$x = -4 + 7 \quad \text{or} \quad x = -4 - 7$$

$$x = 3 \quad \text{or} \quad x = -11$$

المعادلة المُعطاة

بأخذ الجذر التربيعي للطرفين

بالتبسيط

ب طرح 4 من طرفي المعادلة

بفصل الحليين

بالتبسيط

إذن، الجذران هما: $3, -11$

التحقق: للتحقق، أعوض قيمتي x في المعادلة الأصلية.

أتحقق من فهمي 

أحلُّ كلاً من المعادلات الآتية:

a) $4x^2 - 100 = 0$

b) $(x - 1)^2 = 16$

أدرب وأحل المسائل 

أحلُّ كلاً من المعادلات الآتية:

1 $4x^2 + 9x = 0$

2 $7x^2 = 6x$

3 $x^2 + 5x + 4 = 0$

4 $x^2 - 2x - 15 = 0$

5 $t^2 - 8t + 16 = 0$

6 $x^2 - 18x = -32$

7 $x^2 + 2x = 24$

8 $x^2 = 17x - 72$

9 $2m^2 = 50$

10 $x^2 - 9 = 0$

11 $x^2 - 25 = 0$

12 $\frac{1}{3}x^2 - 3 = 0$

13 $s^2 + 20s + 100 = 0$

14 $y^2 + \frac{1}{2}y = -\frac{1}{16}$

15 $9m^2 - 12m + 4 = 0$

16 $(x + 1)^2 = 4$

17 $9(x - 1)^2 = 16$

18 $5x^2 + 2 = 6$




19 **فرشاة:** سقطت فرشاة طلاءٍ من يد سفيان. إذا مثل الاقتران $h(t) = 3 - 5t^2$ ارتفاع تلك الفرشاة بالأمتار عن الأرض، بعد t ثانية من سقوطها، فبعد كم ثانية تصل إلى الأرض؟

أعمار: إذا كان عمر لينة x عامًا، ويكبرها زوجها بثلاثة أعوام، وكان حاصل ضرب عمريهما 700، فأجد:

20 معادلة تربيعية تمثل الموقف. 21 عمر لينة.

22 **حديقة:** حديقة مستطيلة الشكل يزيد طولها على عرضها بمقدار 40 m، ومساحتها 48000 m^2 ، يريد مزارع إحاطتها بسيياج. أجد طول السيياج.



23 **هندسة:** بين الشكل المجاور مثلثًا مساحته 40 cm^2 . أجد ارتفاعه h ، وطول قاعدته.

24 أحل المسألة الواردة في بداية الدرس.

مهارات التفكير العليا

25 **اكتشف الخطأ:** حلّ سلمان ومهندّ المعادلة التربيعية $x^2 - 3x - 4 = 0$ ، كما هو مبين أدناه. أيهما إجابته صحيحة؟ أبرر إجابتي.

مهندّ

$$x(x - 3) = 4$$

$$x = 4 \quad \text{or} \quad x - 3 = 4$$

$$x = 7$$

سلمان

$$x^2 - 3x - 4 = 0$$

$$(x - 4)(x + 1) = 0$$

$$x - 4 = 0 \quad \text{or} \quad x + 1 = 0$$

$$x = 4 \quad \quad \quad x = -1$$

تبرير: أحدّد عدد حلول كل معادلة ممّا يأتي من دون حلّها، وأبرر إجابتي:

26 $y^2 = -36$

27 $a^2 - 12 = 6$


28 $n^2 - 15 = -15$

29 **تبرير:** أكتب معادلة تربيعية على الصورة القياسية، جذراها $x = -4$, $x = 6$ ، وأبرر إجابتي.

حلُّ المُعادلاتِ التربيعيّةِ بالتّحليلِ (2)

Solving Quadratic Equations by Factoring (2)

- تحليلُ ثلاثيّ الحدودِ على الصورة $ax^2 + bx + c$.
- حلُّ المُعادلاتِ التربيعيّةِ على الصورة $ax^2 + bx + c = 0$ بالتّحليلِ.



إذا كان الاقتران $h(t) = -5t^2 + 7t + 6$ يمثّل ارتفاعَ غطّاسٍ بالأمتارِ فوق سطحِ الماءِ، بعدَ t ثانيةً من قفزِهِ عَن مَنصّةِ القفزِ. فما الزمنُ الذي يستغرقُهُ للوصولِ إلى سطحِ الماءِ؟

فكرة الدرس



مسألة اليوم



تحليلُ ثلاثيّ الحدودِ $ax^2 + bx + c$

تعلّمتُ سابقاً كيفَ أحلُّ ثلاثيّ الحدودِ $x^2 + bx + c$ ، الذي معاملُ x^2 فيه يساوي 1 و b و c عدداً صحيحان، ويمكنُ أيضاً تحليلُ بعضِ ثلاثياتِ الحدودِ التي على الصورة $ax^2 + bx + c$ ؛ حيثُ $a \neq 0$ و $a \neq 1$ و a و b و c أعدادٌ صحيحةٌ، بطريقةٍ مشابهةٍ.

ألاحظُ النمطَ الآتي في عمليّةِ ضربِ المقدارينِ الجبريّين $(2x + 1)$ و $(4x + 5)$:

$$(2x+1)(4x+5) = 8x^2 + 10x + 4x + 5 \\ = 8x^2 + 14x + 5$$

$$10 + 4 = 14 \quad \text{and} \quad 10 \times 4 = 8 \times 5$$

$$ax^2 + mx + nx + c \\ ax^2 + bx + c$$

$$m + n = b \quad \text{and} \quad mn = ac$$

إذن، لتحليلِ ثلاثيّ الحدودِ $8x^2 + 14x + 5$ أجدُ عددينِ m و n حاصلُ ضربِهما 8×5 أو 40، ومجموعُهُما 14.

أتعلّم

عند ضربِ مقدارينِ جبريّين، فإنَّ كلاً منهما يكونُ عاملاً لنتائجِ الضربِ.

تحليلُ ثلاثيّ الحدودِ $ax^2 + bx + c$

مفهومٌ أساسيٌّ

لتحليلِ ثلاثيّ الحدودِ $ax^2 + bx + c$ ، حيثُ $a \neq 0$ ، و a و b و c أعدادٌ صحيحةٌ، أجدُ عددينِ صحيحينِ m و n حاصلُ ضربِهما يساوي (ac) ، ومجموعُهُما يساوي b ، ثمَّ أكتبُ $ax^2 + bx + c$ على الصورة $ax^2 + mx + nx + c$ ، ثمَّ أحلُّ بتجميعِ الحدودِ.

إذا كانت إشارة c موجبة في ثلاثي الحدود $ax^2 + bx + c$ ، حيث $a > 0$ ، و a و b و c أعداداً صحيحة، فإن لكل من m و n الإشارة نفسها، ويعتمد تحديد إشارتي m و n (موجبة أو سالبة) على إشارة b ، فإذا كانت إشارة b موجبة فإن إشارة كل منهما موجبة، وإذا كانت إشارة b سالبة فإن إشارة كل منهما سالبة.

أتعلم

لتسهيل عملية التحليل من الأفضل أن أجعل معامل x^2 موجباً.

مثال 1

$$6x^2 + 23x + 7$$

بما أن $a = 6$ ، $b = 23$ ، $c = 7$ ، فأبحث عن عددين حاصل ضربهما $6 \times 7 = 42$ ومجموعهما 23.

وبما أن إشارة كل من c و b موجبة، فأنشئ جدولاً أنظم فيه أزواج عوامل العدد 42 الموجبة، ثم أحدد العاملين اللذين مجموعهما 23.

مجموع العاملين	أزواج عوامل العدد 42
43	1, 42
23	2, 21

العاملان الصحيحان

$$\begin{aligned}
 6x^2 + 23x + 7 &= 6x^2 + mx + nx + 7 && \text{بكتابة القاعدة} \\
 &= 6x^2 + 2x + 21x + 7 && \text{بتعويض } m = 2, n = 21 \\
 &= (6x^2 + 2x) + (21x + 7) && \text{بتجميع الحدود ذات العوامل المشتركة} \\
 &= 2x(3x + 1) + 7(3x + 1) && \text{بتحليل كل تجميع بإخراج العامل المشترك الأكبر} \\
 &= (3x + 1)(2x + 7) && \text{إخراج } (3x + 1) \text{ عاملاً مشتركاً}
 \end{aligned}$$

أتتحقق: أتتحقق من صحة التحليل بضرب العاملين:

$$\begin{aligned}
 (3x+1)(2x+7) &= 6x^2 + 21x + 2x + 7 && \text{خاصية التوزيع} \\
 &= 6x^2 + 23x + 7 && \text{بالتبسيط}
 \end{aligned}$$

أتتحقق من فهمي

$$2x^2 + 7x + 6$$

إذا كانت إشارة c موجبة وإشارة b سالبة في ثلاثي الحدود $ax^2 + bx + c$ ، حيث $a > 0$ ،
و a و b و c أعداد صحيحة، فإن إشارة كل من m و n تكون سالبة.

مثال 2

أحلل كلاً مما يأتي:

1 $3x^2 - 14x + 8$

بما أن $a = 3$ ، $b = -14$ ، $c = 8$ ، فأبحث عن عددين حاصل ضربيهما $3 \times 8 = 24$
ومجموعهما -14

بما أن إشارة b سالبة وإشارة c موجبة، فأنشئ جدولاً أنظّم فيه أزواج عوامل العدد 24 السالبة،
ثم أحدد العاملين اللذين مجموعهما -14

مجموع العاملين	أزواج عوامل العدد 24
-25	-1, -24
-14	-2, -12

العاملان الصحيحان

$$3x^2 - 14x + 8 = 3x^2 + mx + nx + 8 \quad \text{بكتابة القاعدة}$$

$$= 3x^2 - 2x - 12x + 8 \quad \text{بتعويض } m = -2, n = -12$$

$$= (3x^2 - 2x) + (-12x + 8) \quad \text{بتجميع الحدود ذات العوامل المشتركة}$$

$$= x(3x - 2) + (-4)(3x - 2) \quad \text{بتحليل كل تجميع بإخراج العامل المشترك الأكبر}$$

$$= (3x - 2)(x - 4) \quad \text{بإخراج } (3x - 2) \text{ عاملاً مشتركاً}$$

اتحقق: أتحقق من صحة التحليل بضرب العاملين:

$$(3x - 2)(x - 4) = 3x^2 - 12x - 2x + 8 \quad \text{خاصية التوزيع}$$

$$= 3x^2 - 14x + 8 \quad \checkmark \quad \text{بالتبسيط}$$

2 $20x^2 - 80x + 35$

الخطوة 1: أخرج العامل المشترك الأكبر أولاً.

$20x^2 - 80x + 35 = 5(4x^2 - 16x + 7)$ **بالتحليل بإخراج العامل المشترك الأكبر**

الخطوة 2: أحلل المقدار $4x^2 - 16x + 7$

بما أن $a = 4, b = -16, c = 7$ ، فأبحث عن عددين حاصل ضربهما $4 \times 7 = 28$ ومجموعهما -16

بما أن b سالبة و c موجبة، فأنشئ جدولاً أنظّم فيه أزواج عوامل العدد 28 السالبة، ثم أحدد العاملين اللذين مجموعهما -16

مجموع العاملين	أزواج عوامل العدد 28
-29	-1, -28
-16	-2, -14

العاملان الصحيحان

$4x^2 - 16x + 7 = 4x^2 + mx + nx + 7$ **بكتابة القاعدة**

$= 4x^2 - 2x - 14x + 7$ بتعويض $m = -2, n = -14$

$= (4x^2 - 2x) + (-14x + 7)$ بتجميع الحدود ذات العوامل المشتركة

$= 2x(2x-1) + (-7)(2x-1)$ بتحليل كل تجميع بإخراج العامل المشترك الأكبر

$= (2x-1)(2x-7)$ بإخراج $(2x-1)$ عاملاً مشتركاً

أتحقق: أتحقق من صحة التحليل بضرب العاملين:

$(2x-1)(2x-7) = 4x^2 - 14x - 2x + 7$ **خاصية التوزيع**

$= 4x^2 - 16x + 7$ **بالتبسيط**

إذن، $20x^2 - 80x + 35 = 5(2x-1)(2x-7)$

أتعلم

في بعض الأحيان يكون عامل مشترك بين جميع حدود ثلاثي الحدود، وفي هذه الحالة أستعمل خاصية التوزيع لتحليل ثلاثي الحدود بإخراج العامل المشترك الأكبر أولاً قبل البدء بعملية التحليل.

أتحقق من فهمي

أحلل كلاً مما يأتي:

a) $9x^2 - 33x + 18$

b) $5x^2 - 13x + 6$

إذا كانت إشارة c سالبة في ثلاثي الحدود $ax^2 + bx + c$ ، حيث $a > 0$ ، و a و b و c أعداد صحيحة، فإن m و n إشارتين مختلفتين.

مثال 3

أحلل $3x^2 - 7x - 6$

بما أن $c = -6$ ، $b = -7$ ، $a = 3$ ، فأجد عددين حاصل ضربيهما $3 \times -6 = -18$ ومجموعهما -7

بما أن إشارة c سالبة، فأنشئ جدولاً أنظم فيه أزواج عوامل العدد (-18) مختلفة الإشارة، ثم أحدد العاملين اللذين مجموعهما -7

مجموع العاملين	أزواج عوامل العدد -18
-17	$1, -18$
17	$-1, 18$
-7	$2, -9$

العاملان الصحيحان

$$3x^2 - 7x - 6 = 3x^2 + mx + nx - 6$$

بكتابة القاعدة

$$= 3x^2 + 2x - 9x - 6$$

بتعويض $m = 2$ ، $n = -9$

$$= (3x^2 + 2x) + (-9x - 6)$$

بتجميع الحدود ذات العوامل المشتركة

$$= x(3x+2) + (-3)(3x+2)$$

بتحليل كل تجميع بإخراج العامل المشترك الأكبر

$$= (3x+2)(x-3)$$

بإخراج $(3x + 2)$ عاملاً مشتركاً

أتحقق: أتحقق من صحّة التحليل بضرب العاملين:

$$(3x+2)(x-3) = 3x^2 - 9x + 2x - 6$$

$$= 3x^2 - 7x - 6 \quad \checkmark$$

خاصية التوزيع

بالتبسيط

أتحقق من فهمي

أحلّ $3x^2 - 3x - 6$

حلّ المعادلات على الصورة $ax^2 + bx + c = 0$ بالتحليل

يمكن حلّ المعادلات التربيعية على الصورة $ax^2 + bx + c = 0$ ، حيث $a \neq 0$ ، و a و b و c أعداد صحيحة، بالتحليل أولاً، ثم استعمال خاصية الضرب الصفريّ.

مثال 4

أحلّ كلّاً من المعادلات الآتية:

1 $3x^2 - 4x + 1 = 0$

$$3x^2 - 4x + 1 = 0$$

المعادلة المعطاة

$$(3x - 1)(x - 1) = 0$$

بالتحليل إلى العوامل

$$3x - 1 = 0 \quad \text{or} \quad x - 1 = 0$$

خاصية الضرب الصفريّ

$$x = \frac{1}{3} \quad x = 1$$

بحلّ كلّ معادلة

إذن، الجذران هما: $1, \frac{1}{3}$

2 $30x^2 - 5x = 5$

$$30x^2 - 5x = 5$$

المعادلة المعطاة

$$30x^2 - 5x - 5 = 0$$

ب طرح 5 من طرفي المعادلة

$$6x^2 - x - 1 = 0$$

بقسمة طرفي المعادلة على 5

$$(3x + 1)(2x - 1) = 0$$

بالتحليل إلى العوامل

أذكّر

إذا كانت إشارة c موجبة، وإشارة b سالبة في ثلاثي الحدود $ax^2 + bx + c$ ، حيث $a > 0$ ، و a و b و c أعداد صحيحة، فإن إشارة كل من m و n سالبة.

أذكّر

أحرص دائماً على إخراج العامل المشترك الأكبر أولاً قبل البدء بعملية التحليل.

$$3x+1 = 0 \text{ or } 2x-1 = 0$$

$$x = -\frac{1}{3} \quad x = \frac{1}{2}$$

خاصية الضرب الصفري

بحل كل معادلة

إذن، الجذران هما: $-\frac{1}{3}, \frac{1}{2}$

أتحقق من فهمي


أحلُّ كلاً من المعادلات الآتية:

a) $2x^2 - 5x + 2 = 0$

b) $2x^2 + 6x = -4$

يمكن استعمال حل المعادلات التربيعية بالتحليل في كثير من التطبيقات الحياتية.

مثال 5: من الحياة



بركة: بركة أسماك زينة مستطيلة الشكل طولها 8 m وعرضها 6 m، يحيط بها ممر عرضه x m، كما في الشكل المجاور. إذا كانت المساحة المخصصة للبركة والممر معاً 120 m^2 ، فأجد عرض الممر x .

طول المنطقة المخصصة للبركة والممر معاً يساوي $(2x + 8) \text{ m}$ وعرضها $(2x + 6) \text{ m}$. بما أن مساحة هذه المنطقة 120 m^2 ، فيمكن كتابة معادلة لإيجاد قيمة x على النحو الآتي:

$$(2x + 6)(2x + 8) = 120$$

مساحة البركة والممر

$$4x^2 + 16x + 12x + 48 = 120$$

خاصية التوزيع

$$4x^2 + 28x + 48 = 120$$

بالتبسيط

$$4x^2 + 28x - 72 = 0$$

بالتبسيط

$$x^2 + 7x - 18 = 0$$

بقسمة طرفي المعادلة على 4

$$(x + 9)(x - 2) = 0$$

بالتحليل إلى العوامل

$$x + 9 = 0 \text{ or } x - 2 = 0$$

$$x = -9 \quad x = 2$$

بما أن الطول لا يمكن أن يكون سالبًا، فإن عرض الممر يساوي 2 m

خاصية الضرب الصفري

بحل كل معادلة

أتحقق من فهمي

محمية: محمية طبيعية مستطيلة الشكل يزيد طولها على مثلثي عرضها بمقدار 1 km. إذا كانت مساحتها 136 km^2 ، فأجد أبعادها.

معلومة

يهدف إنشاء المحميات الطبيعية إلى حماية الأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات، ومن أهم تلك المحميات في الأردن محمية ضانا للمحيط الحيوي، التي تقع في محافظة الطفيلة وتبلغ مساحتها 320 km^2

أدرب وأحل المسائل

أحل كل ما يأتي:

1 $3x^2 + 11x + 6$

2 $8x^2 - 30x + 7$

3 $6x^2 + 15x - 9$

4 $4x^2 - 4x - 35$

5 $12x^2 + 36x + 27$

6 $6r^2 - 14r - 12$

أحل كل ما من المعادلات الآتية:

7 $24x^2 - 19x + 2 = 0$

8 $18t^2 + 9t + 1 = 0$

9 $5x^2 + 8x + 3 = 0$

10 $5x^2 - 9x - 2 = 0$

11 $4t^2 - 4t - 35 = 0$

12 $6x^2 + 15x - 9 = 0$

13 $28s^2 - 85s + 63 = 0$

14 $9d^2 - 24d - 9 = 0$

15 $8x(x + 1) = 16$


16 $13x^2 = 11 - 2x$

17 $8x - 16 - x^2 = 0$

18 $2t^2 - t = 15$

19 $(2x + 1)(5x + 2) = (2x - 2)(x - 2)$

20 $8x^2 + 6x + 3 = 2x^2 + x + 2$



هندسة: يظهر في الشكل المجاور مستطيل باللون الأصفر مساحته 35 cm^2 ، صنَعته شروق بقصّ أشرطة عرض كل منها $x \text{ cm}$ من جوانب ورقة مستطيلة الشكل طولها 9 cm ، وعرضها 7 cm ، أجد:

21 عرض الشريط.


22 أبعاد المستطيل الجديد.



23 **بطاقة:** بطاقة دعوة مستطيلة الشكل يزيد طولها على مثلي عرضها بمقدار 3 cm إذا كانت مساحتها 90 cm^2 ، فأجد طولها وعرضها.

24 أحل المسألة الواردة في بداية الدرس.

مهارات التفكير العليا



تبرير: يبيّن الشكل المجاور مثلثاً قائم الزاوية.

25 أبن، بالاعتماد على الشكل، أن $20x^2 - 24x - 9 = 0$ ، وأبرر إجابتي.

إرشاد: أستخدم نظرية فيثاغورس

26 أجد مساحة المثلث.

27 **أكتشف المختلف:** أي المقادير الآتية مختلفة؟ أبرر إجابتي.

$$(2x - 3)(x + 2)$$

$$x(2x - 3) + 2(2x - 3)$$

$$(2x + 3)(x - 2)$$

$$2x(x + 2) - 3(x + 2)$$

28 **نحد:** أجد جميع قيم الثابت k ؛ حيث يمكن تحليل ثلاثي الحدود $2x^2 + kx + 12$ إلى عاملين باستعمال الأعداد الصحيحة.

حلُّ المُعادلاتِ التربيعيةِ بإكمالِ المُربَّعِ

Solving Quadratic Equations
by Completing the Square

حلُّ المُعادلاتِ التربيعيةِ بإكمالِ المُربَّعِ.

إكمالُ المُربَّعِ.

فكرةُ الدرس



المصطلحاتُ



مسألةُ اليوم




ألقي أحمدُ طُعماً في الماءِ مِن ارتفاعِ مترٍ واحدٍ. إذا كانَ الاقترانُ $h(t) = -5t^2 + 8t + 1$ يمثُل ارتفاعَ هذا الطُعْمِ بالمترِ فوقَ سطحِ الماءِ، بعدَ t ثانيةً مِن إلقائه، فبعدَ كم ثانيةً يصلُ إلى سطحِ الماءِ؟


إكمالُ المُربَّعِ

تعلَّمتُ سابقاً حلَّ المُعادلةِ التربيعيةِ التي على الصورةِ $(x + m)^2 = n$ ؛ حيثُ $n \geq 0$ ، وذلكَ بأخذِ الجذرِ التربيعيِّ لطرفي المُعادلةِ.


ألاحظُ أنَّ المقدارَ $(x + m)^2$ هو الصورةُ التحليليةُ للمُربَّعِ الكاملِ $x^2 + 2mx + m^2$ ، وهذا يقودُنَا إلى استنتاجِ أنَّه يمكنُ حلَّ المُعادلاتِ التربيعيةِ التي تحوي مُربَّعاً كاملاً ثلاثيَّ الحدودِ معامِلَ x^2 فيه يُساوي 1 باستخدامِ الجذرِ التربيعيِّ. ولكن، ماذا عن المُعادلاتِ التي لا تحوي مُربَّعاً كاملاً؟



تمثُلُ القطعُ الجبريةُ المُجاورةُ المقدارَ الجبريَّ $x^2 + 6x$



ويمكنُ إعادةُ ترتيبِ القطعِ الجبريةِ لِتُشكِّلَ جزءاً من مُربَّعٍ، كما في الشكلِ المُجاورِ. ألاحظُ أنَّ القطعَ الخضراءَ قُسمتْ مجموعتينِ في كلِّ منها 3 قطعٍ.



يمكنُ إكمالُ المُرَبَّعِ بإضافةِ 3^2 أو 9 قطعٍ مفردةٍ.
 إذن، المُرَبَّعُ الكاملُ ثلاثيُّ الحدودِ الناتجُ هو
 $(x + 3)^2$ أو $x^2 + 6x + 9$

يمكنُ التعبيرُ عنَ الخُطواتِ السابقةِ جبريًّا كما يأتي:

$$x^2 + 6x + 9$$

$$[\frac{1}{2}(6)]^2$$

وبشكلٍ عامٍّ، يمكنُ تحويلُ المقدارِ التربيعيِّ الذي على الصورة $x^2 + bx$ إلى مُرَبَّعٍ كاملٍ ثلاثيِّ الحدودِ بإضافةِ $(\frac{b}{2})^2$ ، وتُسمَّى هذه العمليةُ **إكمالُ المُرَبَّعِ** (completing the square).

إكمالُ المُرَبَّعِ

مفهومٌ أساسيٌّ

بالكلمات: لإكمالِ مُرَبَّعِ أيِّ مقدارٍ تربيعيٍّ على الصورة $x^2 + bx$ ، اتَّبِعْ الخُطواتِ الآتية:

الخُطوةُ 1: أجدُ نصفَ b .

الخُطوةُ 2: أربِّعُ الناتجَ مِنَ الخُطوةِ 1

الخُطوةُ 3: أضيفُ الناتجَ مِنَ الخُطوةِ 2 إلى $x^2 + bx$.

بالرموز: $x^2 + bx + (\frac{b}{2})^2 = (x + \frac{b}{2})^2$

أتعلَّم

اتَّبِعْ الخُطواتِ نفسَها،
 سواءً كانت b موجبةً أو
 سالبةً.

مثال 1

أجعلُ كلَّ مقدارٍ ممَّا يأتي مُرَبَّعًا كاملًا، ثمَّ أحلُّ المُرَبَّعَ الكاملَ ثلاثيِّ الحدودِ الناتجَ:

1 $x^2 + 12x$

$$\frac{12}{2} = 6$$

بإيجاد $\frac{b}{2}$

$$6^2 = 36$$

بإيجاد $(\frac{b}{2})^2$

$$x^2 + 12x + 36$$

بإضافةِ $(\frac{b}{2})^2$ إلى المقدارِ الأصليِّ

إذن، المقدار الناتج بعد إكمال المربع هو $x^2 + 12x + 36$ ، ويمكن تحليله كما يأتي:

$$x^2 + 12x + 36 = (x + 6)^2 \quad \text{بتحليل المربع الكامل ثلاثي الحدود}$$

2 $x^2 - 26x$

$$\frac{-26}{2} = -13 \quad \text{بإيجاد } \frac{b}{2}$$

$$(-13)^2 = 169 \quad \left(\frac{b}{2}\right)^2 \text{ بإيجاد}$$

$$x^2 - 26x + 169 \quad \text{بإضافة } \left(\frac{b}{2}\right)^2 \text{ إلى المقدار الأصلي}$$

إذن، المقدار الناتج بعد إكمال المربع هو $x^2 - 26x + 169$ ، ويمكن تحليله كما يأتي:

$$x^2 - 26x + 169 = (x - 13)^2 \quad \text{بتحليل المربع الكامل ثلاثي الحدود}$$

أتحقق من فهمي 

أجعل كل مقدار مما يأتي مربعاً كاملاً، ثم أحل المربع الكامل ثلاثي الحدود الناتج:

a) $x^2 + 2x$

b) $x^2 - 14x$

حل المعادلات التربيعية على الصورة $x^2 + bx + c = 0$ بإكمال المربع

يمكنني استعمال إكمال المربع لحل أي معادلة تربيعية على الصورة $x^2 + bx + c = 0$ ، وذلك يتطلب فصل المقدار $x^2 + bx$ في الطرف الأيسر أولاً، ثم أكمل المربع.

مثال 2

أحلُّ كلاً من المعادلات الآتية بإكمال المربع، مقرباً إجابتي لأقرب جزء من عشرة (إن لزم):

1 $x^2 + 4x - 12 = 0$

$$x^2 + 4x - 12 = 0 \quad \text{المعادلة المُعطاة}$$

$$x^2 + 4x = 12 \quad \text{بجمع 12 إلى طرفي المعادلة}$$

$$x^2 + 4x + 4 = 12 + 4 \quad \text{بإكمال المربع بإضافة } 4 = \left(\frac{4}{2}\right)^2 \text{ إلى طرفي المعادلة}$$

$$(x + 2)^2 = 16 \quad \text{بتحليل المربع الكامل ثلاثي الحدود}$$

أفكر

هل يمكن حلُّ الفرع 1 من المثال بالتحليل؟ أبرر إجابتي.

$$x + 2 = \pm 4$$

$$x = -2 \pm 4$$

$$x = -2 + 4 \quad \text{or} \quad x = -2 - 4$$

$$x = 2 \quad \quad \quad x = -6$$

بأخذ الجذر التربيعي للطرفين

بطرح 2 من طرفي المعادلة

بفصل الحدين

بالتبسيط

إذن، جذرا المعادلة 2, -6

التحقق: للتحقق، أعوض قيمتي x في المعادلة الأصلية.

$$2 \quad x^2 - 3x - 1 = 0$$

$$x^2 - 3x - 1 = 0$$

المعادلة المعطاة

$$x^2 - 3x = 1$$

بجمع 1 إلى طرفي المعادلة

$$x^2 - 3x + \frac{9}{4} = 1 + \frac{9}{4} \quad \text{ياكمال المربع بإضافة } \frac{9}{4} = \left(\frac{-3}{2}\right)^2 \text{ إلى طرفي المعادلة}$$

$$\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 = \frac{13}{4}$$

بتحليل المربع الكامل ثلاثي الحدود

$$x - \frac{3}{2} = \pm \frac{\sqrt{13}}{2}$$

بأخذ الجذر التربيعي للطرفين

$$x = \frac{3}{2} \pm \frac{\sqrt{13}}{2}$$

بجمع $\frac{3}{2}$ من طرفي المعادلة

$$x = \frac{3}{2} + \frac{\sqrt{13}}{2} \quad \text{or} \quad x = \frac{3}{2} - \frac{\sqrt{13}}{2}$$

بفصل الحدين

$$x \approx 3.3 \quad \quad \quad x \approx -0.3$$

باستعمال الآلة الحاسبة

إذن، جذرا المعادلة التقريبيان 3.3, -0.3

أتحقق من فهمي 

أحلُّ كلاً من المعادلات الآتية ياكمال المربع، مُقرَّباً إجابتي لأقرب جزءٍ من عشرة (إن لزم):

a) $x^2 + 8x + 7 = 0$

b) $x^2 - 5x - 3 = 0$

أفكّر

هل يمكن حلُّ الفرع 2
من المثال بالتحليل؟ أبرر
إجابتي.

حلُّ المُعادلاتِ التربيعيةِ على الصورةِ $ax^2 + bx + c = 0$ بإكمالِ المُربَّعِ.

لحلِّ المُعادلةِ التربيعيةِ على الصورةِ $ax^2 + bx + c = 0$ ؛ حيثُ $a \neq 1$ ، أقسِمُ كلَّ حدٍّ في المُعادلةِ على a ، ثمَّ أفصلُ الحدَّينِ اللذينِ يحتويانِ على x^2 و x في الطرفِ الأيسرِ أولاً، ثمَّ أُكْمِلُ المُربَّعَ.

مثال 3

أحلُّ كلاً من المُعادلاتِ الآتيةِ بإكمالِ المُربَّعِ:

1 $2x^2 - 12x + 8 = 0$

$2x^2 - 12x + 8 = 0$ المُعادلةُ المُعطاةُ

$x^2 - 6x + 4 = 0$ بقسمةِ كلِّ حدٍّ على 2

$x^2 - 6x = -4$ بطرحِ 4 من طرفي المُعادلةِ

$x^2 - 6x + 9 = -4 + 9$ بإكمالِ المُربَّعِ بإضافةِ $9 = \left(\frac{-6}{2}\right)^2$ إلى طرفي المُعادلةِ

$(x-3)^2 = 5$ بتحليلِ المُربَّعِ الكاملِ ثلاثيِّ الحدودِ

$x - 3 = \pm\sqrt{5}$ بأخذِ الجذرِ التربيعيِّ للطرفينِ

$x = 3 \pm\sqrt{5}$ بجمعِ 3 إلى طرفي المُعادلةِ

$x = 3 + \sqrt{5}$ or $x = 3 - \sqrt{5}$ بفصلِ الحليْنِ

إذن، جذرا المُعادلةِ $3 - \sqrt{5}, 3 + \sqrt{5}$

التحقُّق: للتحقق، أعوِّضْ قيمتي x في المُعادلةِ الأصليةِ.

2 $3x^2 + 6x + 15 = 0$

$3x^2 + 6x + 15 = 0$ المُعادلةُ المُعطاةُ

$x^2 + 2x + 5 = 0$ بقسمةِ كلِّ حدٍّ على 3

$x^2 + 2x = -5$ بطرحِ 5 من طرفي المُعادلةِ


$x^2 + 2x + 1 = -5 + 1$ بإكمالِ المُربَّعِ بإضافةِ $1 = \left(\frac{2}{2}\right)^2$ إلى طرفي المُعادلةِ

$(x + 1)^2 = -4$ بتحليلِ المُربَّعِ الكاملِ ثلاثيِّ الحدودِ

بما أنَّه لا توجدُ أعدادٌ حقيقيةٌ مُربَّعاتها سالبةٌ، فالمُعادلةُ ليس لها حُلُولٌ حقيقيةٌ.

الدَّعمُ البيانيُّ

يظهرُ في الشكلِ الآتي مُنحنى الاقترانِ التربيعيِّ المُرتبطِ بالمُعادلةِ $3x^2 + 6x + 15 = 0$ الذي لا يقطعُ المحورَ x ؛ ما يعني عدمَ وجودِ حُلُولٍ حقيقيةٍ للمُعادلةِ.



أتحقق من فهمي


أحلُّ كلاً من المعادلات الآتية بإكمال المربع:

a) $2x^2 + 20x - 10 = 0$

b) $2x^2 + 8x + 12 = 0$

يمكن استعمال حل المعادلات التربيعية بطريقة إكمال المربع في كثير من التطبيقات الحياتية.

مثال 4: من الحياة



تصميم: تمرُّ سكة قطارٍ أعلى جسرٍ قوسيٍّ، ويمثل الاقتران $h(x) = -x^2 + 10x - 18$ ارتفاع أي نقطة على الجسر عن سطح الأرض بالمتر، و x البعد الأفقي للنقطة بالمتر عن عمود إنارة بجانب الجسر، كما في الشكل المجاور. أجد طول قاعدة القوس d ، مقرباً إيجابياً لأقرب جزءٍ من عشرة.

أفترض أن مستوى سطح الأرض يمثل المحور x ، إذن تمثل كل من نقطة بداية القوس ونهايته حلاً للمعادلة المرتبطة بالاقتران $h(x)$.

الخطوة 1: أحلُّ المعادلة المرتبطة بالاقتران.

$$-x^2 + 10x - 18 = 0$$

$$x^2 - 10x + 18 = 0$$

$$x^2 - 10x = -18$$

$$x^2 - 10x + 25 = -18 + 25 \quad \text{ياكمل المربع بإضافة } \left(\frac{-10}{2}\right)^2 = 25 \text{ إلى طرفي المعادلة}$$

$$(x - 5)^2 = 7$$

$$x - 5 = \pm\sqrt{7}$$

$$x = 5 \pm\sqrt{7}$$

$$x = 5 + \sqrt{7} \quad \text{or} \quad x = 5 - \sqrt{7}$$

$$x \approx 7.6$$

$$x \approx 2.4$$

المعادلة المرتبطة بالاقتران

بقسمة كل حدٍّ على -1

ب طرح 18 من طرفي المعادلة

بتحليل المربع الكامل ثلاثي الحدود

بأخذ الجذر التربيعي للطرفين

بجمع 5 إلى طرفي المعادلة

بفصل الحلين

باستعمال الآلة الحاسبة

أتعلم

ألاحظ أنه لا يمكن حل المعادلة المرتبطة بالاقتران بالتحليل؛ لذا أحلها بإكمال المربع.

الخطوة 2: أجد طول قاعدة القوس d .


لإيجاد طول قاعدة القوس d أطرح أحد الحلين من الآخر.

$$d = 7.6 - 2.4 = 5.2$$

إذن، طول قاعدة القوس 5.2 m تقريباً.

أتحقق من فهمي

تصميم: صمم مهندس نموذجاً لجسر مشاة على شكل قطع مكافئ، بحيث يمثل الاقتران:



ارتفاع الجسر عن

قاعدة النموذج بالديسيمتر، و x البعد الأفقي

بالديسيمتر عن إشارة ضوئية، كما في الشكل

المجاور. أجد طول قاعدة الجسر d ، مقرباً

إجابتي لأقرب جزء من عشرة.

أندرب وأحل المسائل

أجعل كل مقدار مما يأتي مربعاً كاملاً، ثم أحلل المربع الكامل ثلاثي الحدود الناتج:

1 $x^2 + 4x$

2 $x^2 + 14x$

3 $x^2 - 3x$

4 $x^2 + 8x$

5 $x^2 - 2x$

6 $x^2 + 22x$

أجد قيمة c في كل مما يأتي، ثم أجد المقدار الجبري الذي يعبر عن النموذج:

7

	x	2
x	x^2	$2x$
2	$2x$	c

8

	x	8
x	x^2	$8x$
8	$8x$	c

9

	x	10
x	x^2	$10x$
10	$10x$	c

أحلُّ كلاً من المعادلات الآتية بإكمال المربع:

10 $x^2 + 4x = 12$

11 $x^2 - 14x = -13$

12 $x^2 - 6x - 11 = 0$

13 $x^2 + 4x - 1 = 0$

14 $x^2 + 14x - 5 = 0$

15 $x^2 - 6x + 3 = 0$

16 $x^2 + 13x + 35 = 0$

17 $x^2 + 2x - 1 = 0$

18 $x^2 + 2x - 3 = 0$

أحلُّ كلاً من المعادلات الآتية بإكمال المربع، مقرباً إجابتي لأقرب جزء من عشرة (إن لزم):

19 $x^2 + 2x - 9 = 0$


20 $x^2 - 4x - 7 = 0$

21 $x^2 + 2x - 5 = 0$

22 $2x^2 - 6x - 3 = 0$

23 $4x^2 - 8x + 1 = 0$

24 $2x^2 + 5x - 10 = 0$



25 هندسة: يبين الشكل المجاور شبه منحرف مساحته 20 cm^2 . أجد قيمة x ، مقرباً إجابتي لأقرب جزء من عشرة.

إرشاد: مساحة شبه المنحرف تساوي نصف مجموع طولي الضلعين المتوازيين مضروباً في الارتفاع.



26 ضفادع: وقف ضفدع على جذع شجرة يرتفع 1 m عن سطح الأرض، ثم قفز إلى سطح الأرض ليُمثل الاقتران $h(t) = -5t^2 + 15t + 1$ ارتفاعه بالمتر عن سطح الأرض بعد t ثانية من قفزه عن الجذع. بعد كم ثانية يصل الضفدع إلى سطح الأرض؟ أقرب إجابتي لأقرب جزء من عشرة.

27 أحل المسألة الواردة في بداية الدرس.

مهارات التفكير العليا

28 تبرير: أجد جميع قيم الثابت b ، التي تجعل المقدار $x^2 + bx + 25$ مربعاً كاملاً، وأبرر إجابتي.

29 تبرير: هل يمكن حل المعادلة $x^2 + 10x = -20$ بطريقة التحليل وإكمال المربع؟ أبرر إجابتي.

30 مسألة مفتوحة: أكتب معادلة تربيعية تُحل بطريقة إكمال المربع لا بطريقة التحليل، ويكون جذراها عددين حقيقيين موجبين.

حلُّ المُعادلاتِ التربيعيّةِ باستعمالِ القانونِ العامِّ

Solving Quadratic Equations Using the Quadratic Formula

حلُّ المُعادلةِ التربيعيّةِ باستعمالِ القانونِ العامِّ.
القانونُ العامُّ، المُميّزُ.

فكرةُ الدرس



المصطلحاتُ



مسألةُ اليوم



في لعبةِ رميِ القرصِ، رمى لاعبُ القرصِ فَمَثَلَ الاقترانُ
في لعبةِ رميِ القرصِ، رمى لاعبُ القرصِ فَمَثَلَ الاقترانُ
الارتفاعَ $f(x) = -0.04x^2 + 0.84x + 2$ بالمتّر عن سطحِ
الأرضِ، حيث x المسافةُ الأفقيّةُ بالمتّر بينَ اللاعبِ والقرصِ. أجدُ المسافةَ
الأفقيّةَ بينَ اللاعبِ والقرصِ عندما يصلُ القرصُ إلى سطحِ الأرضِ.

القانونُ العامُّ

تعلّمتُ في الدرسِ السابقِ حلُّ المُعادلاتِ التربيعيّةِ باستعمالِ طريقةِ إكمالِ المُربّعِ، ويمكنُ بهذهِ الطريقةِ اشتقاقَ قانونِ يُستعملُ
لحلِّ أيِّ مُعادلةٍ تربيعيّةٍ مكتوبةٍ على الصورةِ القياسيةِ $ax^2 + bx + c = 0$ ، كما سألاحظُ عندَ تنفيذِ النشاطِ المفاهيميِّ الآتي:

حلُّ المُعادلةِ التربيعيّةِ بإكمالِ المُربّعِ

نشاطُ مفاهيميِّ

توضّحُ الخُطواتُ الآتيةُ طريقةَ حلِّ أيِّ مُعادلةٍ تربيعيّةٍ على الصورةِ $ax^2 + bx + c = 0$ حيث $a \neq 0$. باستعمالِ طريقةِ
إكمالِ المُربّعِ، أصفُ الإجراءَ الذي تمَّ في كلِّ خُطوةٍ:

1 $ax^2 + bx + c = 0$

2 $ax^2 + bx = -c$

3 $x^2 + \frac{b}{a}x = \frac{-c}{a}$

4 $x^2 + \frac{b}{a}x + \left(\frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{-c}{a} + \left(\frac{b}{2a}\right)^2$

5 $\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2}{4a^2} - \frac{c}{a}$

6 $\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2}{4a^2} - \frac{4ac}{4a^2}$

7 $x + \frac{b}{2a} = \pm \sqrt{\frac{b^2 - 4ac}{4a^2}}$

8 $x = -\frac{b}{2a} \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

9 $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

تُسمى الصيغة التي جرى التوصل إليها في السطر الأخير من النشاط السابق **القانون العام** (quadratic formula).

حلُّ المعادلة التربيعية بالقانون العام

مفهوم أساسي

يمكن إيجاد الحلين الحقيقيين للمعادلة التربيعية $ax^2 + bx + c = 0$ بالقانون العام على النحو الآتي:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

حيث $a \neq 0$ و $b^2 - 4ac \geq 0$.

مثال 1

أحلُّ كلاً من المعادلات الآتية بالقانون العام، مقرباً إجابتي لأقرب جزءٍ من عشرة (إن لزم):

1 $2x^2 - 3x = 5$

الخطوة 1: أكتب المعادلة بالصورة القياسية.

$$2x^2 - 3x = 5$$

المعادلة المُعطاة

$$2x^2 - 3x - 5 = 0$$

ب طرح 5 من طرفي المعادلة

الخطوة 2: أطبق القانون العام.

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

صيغة القانون العام

$$= \frac{-(-3) \pm \sqrt{(-3)^2 - 4(2)(-5)}}{2(2)}$$

بتعويض $a = 2, b = -3, c = -5$

$$= \frac{3 \pm \sqrt{9 + 40}}{4}$$

بالتبسيط

$$= \frac{3 \pm \sqrt{49}}{4} = \frac{3 \pm 7}{4}$$

بالجمع، ثم إيجاد الجذر التربيعي

$$x = \frac{3 - 7}{4} \quad \text{or} \quad x = \frac{3 + 7}{4}$$

بفصل الحلين

$$x = -1 \quad x = \frac{10}{4} = \frac{5}{2}$$

بالتبسيط

إذن، جذرا المعادلة هما $-1, \frac{5}{2}$

أتعلم

بما أنه يمكن إيجاد الجذر التربيعي للعدد 49، فلا حاجة إلى استعمال الآلة الحاسبة؛ لذا تكون قيمة الجذر دقيقة وليست تقريبية.

2 $5x^2 - 11x = 4$

$$5x^2 - 11x = 4$$

$$5x^2 - 11x - 4 = 0$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$= \frac{-(-11) \pm \sqrt{(-11)^2 - 4(5)(-4)}}{2(5)}$$

$$= \frac{11 \pm \sqrt{121 + 80}}{10}$$

$$= \frac{11 \pm \sqrt{201}}{10}$$

$$x = \frac{11 - \sqrt{201}}{10} \quad \text{or} \quad x = \frac{11 + \sqrt{201}}{10}$$

$$x \approx -0.3$$

$$x \approx 2.5$$

الخطوة 1: أكتب المعادلة بالصورة القياسية.

المعادلة المُعطاة

ب طرح 4 من طرفي المعادلة

الخطوة 2: أطبق القانون العام.

صيغة القانون العام

بتعويض $a = 5, b = -11, c = -4$

بالتبسيط

بالجمع

بفصل الحليين

باستعمال الآلة الحاسبة

إذن، جذرا المعادلة التقريبيان $-0.3, 2.5$

أتحقق من فهمي

أحلُّ كلاً من المعادلات الآتية بالقانون العام، مُقرِّباً إجابتي لأقرب جزءٍ من عشرة (إن لزم):

a) $3x^2 + 16x = -5$

b) $x^2 - 2x = 4$

المُمَيِّز

تعلّمت سابقاً أنّ للمعادلة التربيعية حلّين حقيقيين مختلفين، أو حلاً حقيقياً واحداً، أو لا توجد لها حلول حقيقية، ويمكن تحديد عدد الحلول الحقيقية للمعادلة التربيعية قبل حلها باستعمال **المُمَيِّز** (discriminant)، وهو المقدار التربيعي الذي يقع أسفل الجذر التربيعي في القانون العام $(b^2 - 4ac)$ ، ويُرْمَزُ إليه بالرمز Δ .

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

المُمَيِّز

أتعلّم




بما أنّ $\sqrt{201}$ عددٌ غير نسبيّ، لذا استعمل الآلة الحاسبة لإيجاد قيمة تقريبية للحلّ، أمّا القيمة الدقيقة للحلّ فتكون بالابقاء على الجذر كما هو.

رموز رياضية

الرمز Δ إغريقيّ، ويُقرأ دلّتا.

استعمال المميز

مميز المعادلة التربيعية $ax^2 + bx + c = 0$ هو $\Delta = b^2 - 4ac$ ، ويمكن استعماله لتحديد عدد حلول المعادلة التربيعية كما يأتي:

إشارة المميز Δ	$\Delta > 0$ موجب	$\Delta = 0$ صفر	$\Delta < 0$ سالب
عدد الحلول	حلان حقيقيان مختلفان	حل حقيقي واحد	لا توجد حلول حقيقية
مثال بياني			

مثال 2

أحدّد عدد الحلول الحقيقية لكل معادلة تربيعية مما يأتي باستعمال المميز:

1 $x^2 - 4x + 3 = 0$

$\Delta = b^2 - 4ac$

صيغة المميز

$= (-4)^2 - 4(1)(3)$


بتعويض $a=1, b=-4, c=3$

$= 4$

بالتبسيط

بما أن $\Delta > 0$ ، إذن للمعادلة حلان حقيقيان مختلفان.

الدعم البياني:



يُظهر التمثيل البياني المُجاوِرُ لمنحنى الاقتران التربيعي المرتبط بالمعادلة $x^2 - 4x + 3 = 0$ وجود حلين حقيقيين مختلفين لها.

2 $x^2 - 2x + 1 = 0$

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$= (-2)^2 - 4(1)(1)$$


$$= 0$$

صيغة المُميز

$$a=1, b=-2, c=1 \text{ بتعويض}$$

بالتبسيط

بما أن $\Delta = 0$ ، إذن للمعادلة حل حقيقي واحد.



الدعم البياني:

يُظهر التمثيل البياني المُجاور لمنحنى الاقتران التربيعي المُرتبط بالمعادلة $x^2 - 2x + 1 = 0$ وجود حل حقيقي واحد.

3 $x^2 - x + 1 = 0$

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$= (-1)^2 - 4(1)(1)$$


$$= -3$$

صيغة المُميز

$$a=1, b=-1, c=1 \text{ بتعويض}$$

بالتبسيط

بما أن $\Delta < 0$ ، إذن ليس للمعادلة أي حل حقيقي.



الدعم البياني:

يُظهر التمثيل البياني المُجاور لمنحنى الاقتران التربيعي المُرتبط بالمعادلة $x^2 - x + 1 = 0$ عدم وجود أي حل حقيقي للمعادلة.

أتحقق من فهمي

أحدّد عدد الحلول الحقيقية لكل معادلة تربيعية مما يأتي باستعمال المُميز:

a) $-x^2 + 4x - 4 = 0$

b) $2x^2 + 8x - 3 = 0$

c) $x^2 - 6x + 11 = 0$

اختيار الطريقة الأنسب لحل المعادلة التربيعية

تعلمت خمس طرائق لحل المعادلات التربيعية، وفي بعض الأحيان يكون استعمال إحدى هذه الطرائق أنسب من استعمال الطرائق الأخرى، ويبيّن الجدول الآتي ملخصاً لهذه الطرائق وإيجابيات كل منها وسلبياتها.

طرائق حل المعادلات التربيعية

ملخص المفهوم

الطريقة	الإيجابيات	السلبيات
التمثيل البياني	<ul style="list-style-type: none"> يمكن استعمالها لحل أي معادلة تربيعية. يمكن بسهولة تحديد الحلول من التمثيل. 	<ul style="list-style-type: none"> قد لا تُعطي حلولاً دقيقة.
التحليل إلى العوامل	<ul style="list-style-type: none"> من أفضل الطرائق لتجربتها أولاً. تُعطي إجابة مباشرة إذا كانت المعادلة قابلة للتحليل أو كان الحد الثابت صفرًا. 	<ul style="list-style-type: none"> ليست جميع المعادلات التربيعية قابلة للتحليل.
استعمال الجذور التربيعية	<ul style="list-style-type: none"> تُستعمل لحل المعادلات على الصورة $(x + a)^2 = c$، حيث $c \geq 0$ 	<ul style="list-style-type: none"> لا تُستعمل إذا كان الحد bx موجودًا.
إكمال المربع	<ul style="list-style-type: none"> يمكن استعمالها لحل أي معادلة تربيعية على الصورة $ax^2 + bx + c = 0$. من الأسهل استعمالها إذا كان $a = 1$ و b عددًا زوجيًا. 	<ul style="list-style-type: none"> في بعض الأحيان تكون الحسابات معقدة.
القانون العام	<ul style="list-style-type: none"> يمكن استعمالها لحل أي معادلة تربيعية على الصورة $ax^2 + bx + c = 0$. تُعطي حلولاً دقيقة. 	<ul style="list-style-type: none"> قد تستغرق وقتاً أطول من باقي الطرائق لإجراء الحسابات.

مثال 3

أحل كل معادلة مما يأتي باستعمال أي طريقة، وأبرر سبب اختيار الطريقة:

1 $x^2 + 5x - 14 = 0$

يمكن تحليل الطرف الأيسر من المعادلة بسهولة؛ لذا أحلها باستعمال التحليل إلى العوامل.

$x^2 + 5x - 14 = 0$	المعادلة المُعطاة
$(x + 7)(x - 2) = 0$	بالتحليل إلى العوامل
$x + 7 = 0$ or $x - 2 = 0$	خاصية الضرب الصفري
$x = -7$ $x = 2$	بحل كل معادلة

إذن، جذرا المعادلة هما 2، -7

أتذكّر

أجرب أولاً طريقة التحليل إلى العوامل قبل باقي الطرائق.

2 $x^2 - 8x - 3 = 0$

بما أن معامل x^2 يساوي 1، ومعامل x عدد زوجي، فمن الأفضل استعمال طريقة إكمال المربع.

$x^2 - 8x - 3 = 0$	المعادلة المُعطاة
$x^2 - 8x = 3$	بجمع 3 إلى طرفي المعادلة
$x^2 - 8x + 16 = 3 + 16$	بإكمال المربع بإضافة $16 = \left(\frac{-8}{2}\right)^2$ إلى طرفي المعادلة
$(x - 4)^2 = 19$	بتحليل المربع الكامل ثلاثي الحدود
$x - 4 = \pm\sqrt{19}$	بأخذ الجذر التربيعي للطرفين
$x = 4 \pm\sqrt{19}$	بجمع 4 إلى طرفي المعادلة
$x = 4 + \sqrt{19}$ or $x = 4 - \sqrt{19}$	بفصل الحدين

إذن، جذرا المعادلة $4 + \sqrt{19}$ ، $4 - \sqrt{19}$

أفكر

هل يمكن حل المعادلة بالتحليل؟ أبرر إجابتي.

3 $2x^2 - 15x = -19$

بما أنه لا يمكن تحليل المعادلة والأعداد فيها كبيرة، فاستعمل القانون العام.

الخطوة 1: أكتب المعادلة بالصورة القياسية.

$$2x^2 - 15x = -19 \quad \text{المعادلة المعطاة}$$

$$2x^2 - 15x + 19 = 0 \quad \text{بجمع 19 إلى طرفي المعادلة}$$

الخطوة 2: استعمل المميز لتحديد عدد الحلول الحقيقية للمعادلة.

$$\Delta = b^2 - 4ac \quad \text{صيغة المميز}$$

$$= (-15)^2 - 4(2)(19) \quad \text{بتعويض } a = 2, b = -15, c = 19$$

$$= 73 \quad \text{بالتبسيط}$$

بما أن $\Delta > 0$ ، إذن للمعادلة حلان حقيقيان مختلفان.

الخطوة 3: أطبق القانون العام.

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad \text{صيغة القانون العام}$$

$$x = \frac{-(-15) \pm \sqrt{73}}{2(2)} \quad \text{بتعويض } a = 2, b = -15, \Delta = 73$$

$$= \frac{15 \pm \sqrt{73}}{4} \quad \text{بالتبسيط}$$

$$x = \frac{15 - \sqrt{73}}{4} \quad \text{or} \quad x = \frac{15 + \sqrt{73}}{4} \quad \text{بفصل الحلين}$$

$$\text{إذن، جذرا المعادلة } \frac{15 - \sqrt{73}}{4}, \frac{15 + \sqrt{73}}{4}$$

أتحقق من فهمي 

أحل كل معادلة مما يأتي باستعمال أي طريقة، وأبرر سبب اختيار الطريقة:

a) $x^2 + 3x - 28 = 0$

b) $-x^2 - 10x = 11$

c) $3x^2 - 13x = 5$

أتعلم

يُفضّل تحديد عدد الحلول الحقيقية للمعادلة قبل البدء بحلّها باستعمال القانون العام.

يُستعمل القانون العام كثيرًا في حلّ المعادلات التربيعية التي تُتمدج تطبيقات حياتية أو علمية؛ لأنّ قيمّ المعاملات في تلك المعادلات قد لا تكون بسيطة؛ ما يجعلها غير قابلةٍ للتحليل.

مثال 4: مِنَ الحِياة

حرائقُ الغابات: أُطلقت قذيفةٌ لإطفاء حريقٍ شَبَّ في إحدى الغابات، فَمَثَلَ الاقتران $h(x) = -0.001x^2 + 0.5x + 4$ ارتفاعها بالمتّر عن سطح الأرض؛ حيث x المسافة الأفقية بين القذيفة والمدفع. أجد المسافة الأفقية بين موقع سقوط القذيفة والمدفع.

إذا افترضنا أنّ سطح الأرض يمثّل المحور x ، فإنّ أحد جذريّ المعادلة $-0.001x^2 + 0.5x + 4 = 0$ يمثّل موقع سقوط القذيفة.

أستعمل القانون العامّ لحلّ المعادلة:

$$-0.001x^2 + 0.5x + 4 = 0$$

المعادلة المرتبطة بالاقتران

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

صيغة القانون العامّ

$$x = \frac{-(-0.5) \pm \sqrt{(-0.5)^2 - 4(-0.001)(4)}}{2(-0.001)}$$

بتعويض $a = -0.001$,

$b = 0.5$, $c = 4$

$$x = \frac{-0.5 \pm \sqrt{0.266}}{-0.002}$$

بالتبسيط

$$x = \frac{-0.5 + \sqrt{0.266}}{-0.002} \quad \text{or} \quad x = \frac{-0.5 - \sqrt{0.266}}{-0.002}$$

بفصل الحليّين

$$x \approx -7.9$$

$$x \approx 507.9$$

باستعمال الآلة الحاسبة

بما أنّ موقع سقوط القذيفة يكون أمام المدفع وليس خلفه، فأستثني القيمة السالبة. إذن، يبعُد موقع سقوط القذيفة عن المدفع 507.9 m تقريبًا.

أتحقّق من فهمي

في مناورة تدريبية للقوّات المسلّحة الأردنيّة - الجيش العربيّ، أُطلقت قذيفة من ارتفاع 2 m، فَمَثَلَ الاقتران $h(x) = -0.001x^2 + 0.9x + 2$ ارتفاعها بالمتّر عن سطح الأرض؛ حيث x المسافة الأفقية بين القذيفة وموقع إطلاقها. أجد المسافة الأفقية بين موقع إطلاق القذيفة وموقع سقوطها.



معلومة

استطاع العلماء مؤخرًا تطوير قنابل تحتوي على موادّ تُطفئ الحرائق، تُطلق باستخدام مدافع من مسافة تصل إلى 5 km نحو مناطق الاشتعال التي يصعب الوصول إليها، مثل الغابات.



أحلُّ كُلِّ مِنَ الْمُعَادَلَاتِ الْآتِيَةِ بِالْقَانُونِ الْعَامِّ، مَقْرَبًا إِجَابَتِي لِأَقْرَبِ جُزْءٍ مِنْ عَشْرَةٍ (إِنْ لَزِمَ):

1 $2x^2 + x - 8 = 0$

2 $3x^2 + 5x + 1 = 0$

3 $x^2 - x - 10 = 0$

4 $4x^2 + 3 = -9x$

5 $6x^2 + 22x + 19 = 0$

6 $x^2 + 3x = 6$

7 $3x^2 + 1 = 7x$

8 $2x^2 + 11x + 4 = 0$

9 $4x^2 + 5x = 3$

10 $4x^2 = 9x - 4$

11 $7x^2 = 2 - 3x$

12 $5x^2 - 10x + 1 = 0$

أحدّد عددَ الحُلُولِ الْحَقِيقِيَّةِ لِكُلِّ مُعَادَلَةٍ تَرْبِيعِيَّةٍ مِمَّا يَأْتِي بِاسْتِعْمَالِ الْمُمَيِّزِ:

13 $x^2 - 6x + 10 = 0$

14 $2x^2 - 12x = -18$


15 $-5x^2 + 8x + 9 = 0$

أحلُّ كُلِّ مُعَادَلَةٍ مِمَّا يَأْتِي بِاسْتِعْمَالِ أَيِّ طَرِيقَةٍ، وَأَبْرُرُ سَبَبَ اخْتِيَارِ الطَّرِيقَةِ:

16 $x^2 + 4x = 15$

17 $9x^2 - 49 = 0$


18 $x^2 + 4x - 60 = 0$



19 **صناعة:** تجري صناعة صندوق معدنيّ من صفيحةٍ مُرَبَّعةٍ الشَّكْلِ بقطع 4 مُرَبَّعاتٍ متطابقةٍ من زوايا الصَّفِيحَةِ، طَوَّلِ ضَلَعِ كُلِّ مُرَبَّعٍ مِنْهَا 2 m، ثمَّ تُطَوَّى الْجَوَانِبُ لِتَشْكِيلِ الصُّنْدُوقِ. إِذَا كَانَ حَجْمُ الصُّنْدُوقِ 144 m^3 ، فَأَجِدْ أبعادَ الصَّفِيحَةِ الْأَصْلِيَّةِ الَّتِي صُنِعَ مِنْهَا الصُّنْدُوقُ، مَقْرَبًا إِجَابَتِي لِأَقْرَبِ جُزْءٍ مِنْ عَشْرَةٍ.

20 **حديقة:** حديقةٌ مستطيلةُ الشَّكْلِ يَزِيدُ طَوَّلُهَا عَلَى عَرْضِهَا بِمَقْدَارِ 5 m. إِذَا كَانَتْ مِسَاحَتُهَا 60 m^2 ، فَأَجِدْ أبعادَها، مَقْرَبًا إِجَابَتِي لِأَقْرَبِ جُزْءٍ مِنْ مِئَةٍ.

21 هندسة: بيّن الشكل الآتي مثلثاً مساحته 10 cm^2 . أجد قيمة x ، مقرباً إجابتي لأقرب جزءٍ من عشرة.




22 أحل المسألة الواردة في بداية الدرس.


مهارات التفكير العليا

تبرير: أصل كل معادلة في ما يأتي بالتمثيل البياني للافتراض المرتبط بها، وأبرر إجابتي:


23 $x^2 - 6x + 25 = 0$



24 $2x^2 - 20x + 50 = 0$



25 $3x^2 + 6x - 9 = 0$



26 تحدّ: حلّت رنيّم معادلةً تربيعيةً باستعمال القانون العامّ فكانت إجابتها $x = \frac{3 \pm \sqrt{37}}{2}$. أجد المعادلة التربيعية التي حلّتها رنيّم.

27 أكتشف الخطأ: يقول نور إنّ مُميّز المعادلة $2x^2 + 5x - 1 = 0$ هو 17. أكتشف الخطأ الذي وقع فيه نور وأصحّحه.

حلُّ مُعادلاتٍ خاصَّةٍ

Solving Special Equations

حلُّ مُعادلاتٍ خاصَّةٍ أُسِّ المُتغيِّر فيها عددٌ صحيحٌ موجبٌ أكبر من 2

الصورة التربيعية.

فكرة الدرس



المصطلحات



مسألة اليوم



w cm

$(2w + 4)$ cm

$(18 - w)$ cm

كيسٌ للهدايا على شكلٍ مُتوازيٍ مستطيلاتٍ، حجمُهُ 1152 cm^3 ، وأبعادهُ بدلالةِ المُتغيِّر w موضَّحةُ في الشكلِ المُجاورِ. أجدُ أبعادهُ.

تعلَّمتُ في الدروسِ السابقةِ حلَّ المُعادلاتِ التربيعيةِ بطرائقٍ مُتنوعةٍ، وسأتعلَّمُ في هذا الدرسِ حلَّ مُعادلاتِ أُسِّ المُتغيِّر فيها عددٌ صحيحٌ موجبٌ أكبر من 2 باستعمالِ التحليلِ والتجميعِ وخاصيةِ الضربِ الصِّفريِّ.

حلُّ المُعادلاتِ بإخراجِ العاملِ المُشتركِ الأكبرِ

تعلَّمتُ سابقاً أنَّ تحليلَ المقدارِ الجبريِّ بإخراجِ العاملِ المُشتركِ الأكبرِ لحدوده هو عمليةٌ عكسيةٌ لعمليةِ التوزيعِ، ويمكنُ الإفادةُ من إخراجِ العاملِ المُشتركِ الأكبرِ في تبسيطِ وحلِّ مُعادلاتِ أُسِّ المُتغيِّر فيها عددٌ صحيحٌ أكبر من 2.

أتعلَّمُ

أحتاجُ في بعضِ المُعادلاتِ إلى استعمالِ طرائقِ حلِّ المُعادلاتِ التربيعيةِ التي تعلَّمتُها سابقاً، بعدَ إخراجِ العاملِ المُشتركِ الأكبرِ.

مثال 1

أحلُّ كلاً من المُعادلاتِ الآتية:

1 $x^3 + 4x^2 = 5x$

$$x^3 + 4x^2 = 5x$$

المُعادلةُ المُعطاةُ

$$x^3 + 4x^2 - 5x = 0$$

ب طرح $5x$ من طرفي المُعادلةِ

$$x(x^2 + 4x - 5) = 0$$

بالتحليلِ بإخراجِ العاملِ المُشتركِ الأكبرِ

$$x(x + 5)(x - 1) = 0$$

بالتحليلِ إلى العواملِ

$$x = 0 \quad \text{or} \quad x + 5 = 0 \quad \text{or} \quad x - 1 = 0$$

خاصيةُ الضربِ الصِّفريِّ

$$x = -5 \quad x = 1$$

بحلِّ كلِّ مُعادلةٍ

إذن، جذورُ المُعادلةِ $-5, 0, 1$

أتعلَّمُ

أكتبُ جميعَ حدودِ المُعادلةِ في الطرفِ الأيسرِ من المُعادلةِ قبلَ إخراجِ العاملِ المُشتركِ الأكبرِ.

2 $2x^3 = 18x$

$2x^3 = 18x$ المعادلة المُعطاة

$2x^3 - 18x = 0$ بِطرح $18x$ من طرفي المعادلة

$2x(x^2 - 9) = 0$ بالتحليل بإخراج العامل المشترك الأكبر

$2x(x - 3)(x + 3) = 0$ بتحليل الفرق بين مربعين

$2x = 0$ or $x - 3 = 0$ or $x + 3 = 0$ خاصية الضرب الصفري

$x = 0$ $x = 3$ $x = -3$ بحل كل معادلة

إذن، جذور المعادلة $-3, 0, 3$

أتحقق من فهمي أحلُّ كلاً من المعادلات الآتية:

a) $x^3 + 12x = 7x^2$

b) $x^3 = 25x$

حلُّ المعادلات بالتجميع

يمكن حلُّ المعادلات التي تحتوي على أربعة حدود جبرية أو أكثر باستعمال طريقة التجميع، وذلك بتجميع الحدود التي تحتوي على عوامل مُشتركة بينها، ثم استعمال خاصية الضرب الصفري لحلُّ المعادلة.

مثال 2

أحلُّ كلاً من المعادلات الآتية:

1 $x^3 - 2x^2 + 9x - 18 = 0$

$x^3 - 2x^2 + 9x - 18 = 0$ المعادلة المُعطاة

$(x^3 - 2x^2) + (9x - 18) = 0$ بتجميع الحدود ذات العوامل المُشتركة

$x^2(x - 2) + 9(x - 2) = 0$ بتحليل كلِّ تجميع بإخراج العامل المشترك الأكبر

$(x - 2)(x^2 + 9) = 0$ إخراج $(x - 2)$ عاملاً مُشترَكًا

$x - 2 = 0$ or $x^2 + 9 = 0$ خاصية الضرب الصفري

$x = 2$ بحلُّ المعادلة

بما أنه لا يوجد حلُّ حقيقي للمعادلة $x^2 + 9 = 0$ لأنَّ ممیزها سالب، فإنَّ للمعادلة الأصلية جذرًا وحيدًا هو 2

أتذكر

للتحقُّق من صحَّة الحلِّ، أعوِّض قيمَ x في المعادلة الأصلية.

أتذكر

يمكن تحليل المقدار الجبري بالتجميع إذا تحققت الشروط الآتية جميعها:

- إذا احتوى على أربعة حدود أو أكثر.
- إذا احتوى على عوامل مُشتركة بين الحدود يمكن تجميعها معًا.
- إذا احتوى على عاملين مُشتركين مُتساويين أو كان أحدهما نظيرًا جمعياً للآخر.

أفكر

لماذا $x^2 + 9 \neq 0$ ؟ أبرر إجابتي.

2 $4x^3 + 8x^2 - 5x - 10 = 0$

$$4x^3 + 8x^2 - 5x - 10 = 0$$

$$(4x^3 + 8x^2) + (-5x - 10) = 0$$

$$4x^2(x + 2) - 5(x + 2) = 0$$

$$(x + 2)(4x^2 - 5) = 0$$

$$x + 2 = 0 \quad \text{or} \quad 4x^2 - 5 = 0$$

$$x = -2 \quad x = \pm \frac{\sqrt{5}}{2}$$

المعادلة المُعطاة

بتجميع الحدود ذات العوامل المُشتركة

بتحليل كل تجميع بإخراج العامل المُشترك الأكبر

بإخراج $(x+2)$ عاملاً مُشترِكاً

خاصية الضرب الصفري

بحل كل المعادلة

$$\text{إذن، جذور المعادلة } -2, -\frac{\sqrt{5}}{2}, \frac{\sqrt{5}}{2}$$

أتحقق من فهمي 

أحلُّ كلاً من المعادلات الآتية:

a) $9x^3 + 18x^2 + 2x + 4 = 0$

b) $2x^3 + x^2 - 14x - 7 = 0$

تحليل مجموع مكعبين أو تحليل الفرق بينهما، وحل معادلتيهما

تعلّمت سابقاً حالة خاصة من تحليل المقادير الجبرية، هي تحليل الفرق بين مربعين، وتوجد أيضاً حالة خاصة أخرى من تحليل المقادير الجبرية، هي تحليل مجموع مكعبين أو تحليل الفرق بينهما.

تحليل مجموع مكعبين أو تحليل الفرق بينهما

مفهوم أساسي

• تحليل مجموع مكعبين

بالرموز	مثال
$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$	$x^3 + 27 = (x + 3)(x^2 - 3x + 9)$

• تحليل الفرق بين مكعبين

بالرموز	مثال
$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$	$x^3 - 64 = (x - 4)(x^2 + 4x + 16)$

أندكّر

تُستعمل الجذور التربيعية لحل المعادلات على الصورة $x^2 = c$ ، حيث $c \geq 0$

يمكنُ حلُّ مُعادلاتٍ تحتوي على مجموعٍ مكعَّبين أو على الفرقِ بينهما باستعمالِ طرائقِ التحليلِ الخاصَّةِ بكلِّ منهما وخاصيَّةِ الضَّربِ الصِّفريِّ.

مثال 3

أحلُّ كلاً من المُعادلاتِ الآتية:

1 $8x^3 + 1 = 0$

$8x^3 + 1 = 0$ المُعادلةُ المُعطاةُ

$(2x)^3 + 1^3 = 0$ بالكتابة على صورة مجموعٍ مكعَّبين

$(2x + 1)(4x^2 - 2x + 1) = 0$ بتحليل مجموعٍ مكعَّبين

$2x + 1 = 0$ or $4x^2 - 2x + 1 = 0$ خاصيَّةُ الضَّربِ الصِّفريِّ

$x = -\frac{1}{2}$ بحلُّ المُعادلةِ

بما أنَّه لا يوجدُ حلٌّ حقيقيٌّ للمُعادلةِ $4x^2 - 2x + 1 = 0$ لأنَّ ممیزها سالبٌ، فإنَّ للمُعادلةِ الأصلية جذراً وحيداً هو $-\frac{1}{2}$

طريقةٌ بديلةٌ

يمكنُ حلُّ المُعادلةِ $8x^3 + 1 = 0$ بطريقةٍ أُخرى كالآتي:

$8x^3 + 1 = 0$ المُعادلةُ المُعطاةُ

$8x^3 = -1$ بطرح 1 من طرفي المُعادلةِ

$x^3 = \frac{-1}{8}$ بقسمة طرفي المُعادلةِ على 8

$x = -\frac{1}{2}$ بأخذ الجذرِ التكعيبيِّ للطرفين

2 $x^3 - 125 = 0$

$x^3 - 125 = 0$ المُعادلةُ المُعطاةُ

$x^3 - 5^3 = 0$ بالكتابة على صورة الفرقِ بين مكعَّبين

$(x - 5)(x^2 + 5x + 25) = 0$ بتحليل الفرقِ بين مكعَّبين

$x - 5 = 0$ or $x^2 + 5x + 25 = 0$ خاصيَّةُ الضَّربِ الصِّفريِّ

$x = 5$ بحلُّ المُعادلةِ

بما أنَّه لا يوجدُ حلٌّ حقيقيٌّ للمُعادلةِ $x^2 + 5x + 25 = 0$ لأنَّ ممیزها سالبٌ، فإنَّ للمُعادلةِ الأصلية جذراً وحيداً هو $x = 5$

3 $128x^5 - 54x^2 = 0$

$$128x^5 - 54x^2 = 0$$

المعادلة المُعطاة

$$2x^2 (64x^3 - 27) = 0$$

بالتحليل بإخراج العامل المشترك

$$2x^2 ((4x)^3 - 3^3) = 0$$

بالكتابة على صورة الفرق بين مُكعَّبين

$$2x^2 (4x-3)(16x^2 + 12x + 9) = 0$$

بتحليل الفرق بين مُكعَّبين

$$2x^2 = 0 \text{ or } 4x-3=0 \text{ or } 16x^2+12x+9=0$$

خاصية الضرب الصفرى

$$x = 0 \quad x = \frac{3}{4}$$

بحل كل معادلة

بما أنه لا يوجد حل حقيقي للمعادلة $16x^2 + 12x + 9 = 0$ لأن مميزها سالب، فإن للمعادلة

الأصلية جذرين هما: $0, \frac{3}{4}$

أتحقق من فهمي 

أحلُّ كلاً من المعادلات الآتية:

a) $27x^3 - 1 = 0$

b) $x^3 + 1000 = 0$

c) $16x^4 - 250x = 0$

حلُّ معادلاتٍ على الصورة التربيعية

يُسمى المقدار الجبري المكتوب على الصورة $ax^2 + bx + c$ ؛ حيث u مقدار جبري، مقداراً على **الصورة التربيعية** (quadratic form)، ويمكن استعمال طرائق التحليل التي تعلمتها سابقاً في حلِّ معادلاتٍ تحوي مقادير على الصورة التربيعية.

مثال 4

أحلُّ المعادلة: $x^6 - 3x^3 - 40 = 0$

الطريقة 1: التحليل

$$x^6 - 3x^3 - 40 = 0$$

المعادلة المُعطاة

$$(x^3)^2 - 3x^3 - 40 = 0$$

بكتابة المعادلة على الصورة التربيعية

$$(x^3 - 8)(x^3 + 5) = 0$$

بالتحليل إلى العوامل

$$x^3 - 8 = 0 \text{ or } x^3 + 5 = 0$$

خاصية الضرب الصفرى

$$x = 2 \quad x = \sqrt[3]{-5}$$

بحل كل المعادلة

إذن، جذرا المعادلة $2, \sqrt[3]{-5}$

أندكّر

أحلُّ أولاً بإخراج العامل المشترك لتسهيل حلِّ المعادلة.

أفكّر

هل يمكن حلُّ المعادلة $x^3 + 5 = 0$ بطريقةٍ أخرى؟ أبرر إجابتي.

الطريقة 2: التعويض

أفترض أن $u = x^3$

$x^6 - 3x^3 - 40 = 0$

المعادلة المُعطاة

$(x^3)^2 - 3x^3 - 40 = 0$

بكتابة المعادلة على الصورة التربيعية

$u^2 - 3u - 40 = 0$

بتعويض $x^3 = u$

$(u - 8)(u + 5) = 0$

بتحليل العبارة التربيعية

$u - 8 = 0$ or $u + 5 = 0$

خاصية الضرب الصفري

$u = 8$

$u = -5$

بحل كل المعادلة

$x^3 = 8$

$x^3 = -5$

بتعويض $u = x^3$

$x = 2$

$x = \sqrt[3]{-5}$

بأخذ الجذر التكعيبي لطرفي كل معادلة

إذن، جذرا المعادلة $2, \sqrt[3]{-5}$

أتحقق من فهمي

أحلُّ كلاً من المعادلات الآتية:

a) $x^4 - 625 = 0$

b) $x^4 - 3x^2 + 2 = 0$

خطأ شائع

يُخطئ بعض الطلبة بالتوقف عند إيجاد u ، والصحيح إكمال الحل وإيجاد قيمة x التي تحل المعادلة.

لحل المعادلات التي أس المتغير فيها عدد صحيح أكبر من 2 كثير من التطبيقات الحياتية.



مثال 5: من الحياة

صناعة: تصنع شركة صناديق لحفظ البضائع على شكل مُتوازي مستطيلات، طول كل صندوق يقل 30 cm عن ارتفاعه، وعرضه يقل 90 cm عن ارتفاعه. إذا كان حجم الصندوق 324000 cm^3 ، فأجد أبعاده.

أفترض أن طول الصندوق l ، وعرضه w ، وارتفاعه h ، وحجمه V .

طول الصندوق: $l = h - 30$

عرض الصندوق: $w = h - 90$

$$V = l \times w \times h$$

$$324000 = (h - 30)(h - 90)h$$

$$324000 = h^3 - 120h^2 + 2700h$$

$$h^3 - 120h^2 + 2700h - 324000 = 0$$

$$(h^3 - 120h^2) + (2700h - 324000) = 0$$

$$h^2(h - 120) + 2700(h - 120) = 0$$

$$(h - 120)(h^2 + 2700) = 0$$

$$h - 120 = 0 \quad \text{or} \quad h^2 + 2700 = 0$$

$$h = 120$$

حجم مُتوازي المستطيلات

بتعويض, $V = 324000$,

$$l = h - 30, w = h - 90$$

باستعمال خاصية التوزيع

ب طرح 324000 من طرفي المعادلة

بتجميع الحدود ذات العوامل المشتركة

بتحليل كل تجميع بإخراج العامل المشترك الأكبر

باخراج $(h - 120)$ عاملاً مشتركاً


خاصية الضرب الصفرى

بحل المعادلة

بما أنه لا يوجد حل حقيقي للمعادلة $h^2 + 2700 = 0$ لأن مميزها سالب، فإن ارتفاع

الصندوق 120 cm، ومنه فإن طوله 90 cm، وعرضه 30 cm

أتحقق من فهمي



صناعة: تصنع شركة صناديق لجهاز

إلكتروني على شكل مُتوازي مستطيلات،

أبعادها كما هو مبين في الشكل المُجاور.

إذا كان حجم الصندوق 60 cm^3 ، فأجد أبعاده.

أدرب وأحل المسائل

أحل كلاً من المعادلات الآتية:

1 $3x^4 - 12x^3 = 0$

2 $35x^3 - 28x^2 - 7x = 0$

3 $6x^6 - 3x^4 - 9x^2 = 0$

4 $2x^3 + 4x^2 + 2x = 0$

5 $3x^3 = 12x$

6 $x^3 + 4x^2 + 4x = 0$

7 $2x^3 - 3x^2 - 4x + 6 = 0$

8 $10x^3 - 15x^2 + 2x - 3 = 0$

9 $x^3 - 3x^2 + x - 3 = 0$

10 $125x^3 - 1 = 0$

11 $3x^3 + 3000 = 0$

12 $x^4 + x^3 - 12x - 12 = 0$

13 $5x^3 - 320 = 0$

14 $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$

15 $2x^4 - 9x^2 + 4 = 0$


16 $4x^4 + 20x^2 = -25$

17 $16x^4 - 81 = 0$

18 $5w^6 - 25w^3 + 30 = 0$



19 **مشاريع صغيرة:** يمثل الاقتران $R(t) = t^3 - 8t^2 + t + 15$ الإيراد السنوي (بالألف دينار) لمشروع غيداء الصغير بعد t عامًا من إنشائه. بعد كم سنة يصل إيراد غيداء إلى 23 ألف دينار؟



20 **هندسة:** يبين الشكل المجاور أسطوانة حجمها $25\pi h \text{ cm}^3$. إذا كان طول نصف قطر قاعدة الأسطوانة يقل عن ارتفاعها بمقدار 3 cm، فأجد أبعادها.

21 أحل المسألة الواردة في بداية الدرس.

مهارات التفكير العليا

22 **أكتشف الخطأ:** حلت نداء المعادلة $2x^4 - 18x^2 = 0$ ، كما هو مبين أدناه. أكتشف الخطأ في حلها وأصححه.

$$\begin{aligned} 2x^4 - 18x^2 &= 0 \\ 2x^2(x^2 - 9) &= 0 \\ x^2 - 9 &= 0 \\ (x + 3)(x - 3) &= 0 \\ x = -3 \text{ or } x = 3 \end{aligned}$$

تحذّر: أحل المعادلتين الآتيتين، وأبرر إجابتي:

23 $x^6 + 4x^3 = 2$

24 $(x^2 - 1)^2 - 2(x^2 - 1) = 3$

25 **تبرير:** أجد قيمة العدد w التي تجعل للمعادلة $5x^3 + wx^2 + 80x = 0$ حلين حقيقيين فقط، وأبرر إجابتي.

اختبار نهاية الوحدة

أحلُّ كلاً من المعادلات الآتية بيانياً:

6 $-x^2 + 7x - 12 = 0$

7 $x^2 - 8x + 16 = 0$

8 $-x^2 - 6x = 9$

9 $3x^2 - 27 = 0$

10 $x^2 + 6x = -8$

أحلُّ كلاً من المعادلات الآتية:

11 $x^2 - 3x - 10 = 0$

12 $x^2 - 8x + 15 = 0$

13 $m^2 + 10m + 25 = 0$

14 $25t^2 - 49 = 0$

15 $12x^2 - 16x - 35 = 0$


16 $10x^2 - x = 2$

17 $25x^2 = 10 - 45x$




18 يمثل الاقتران $h(t) = -16t^2 + 8t$ ارتفاع جُنْدَبٍ بالقدم بعد t ثانية من قفزِهِ. بعد كم ثانية يصل إلى ارتفاع 1 ft عن سطح الأرض؟

19 يبيِّن الشكل الآتي مستطيلاً مساحته 91 m^2 . أجد أبعاده.



أختار رمز الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي:



1 أي مما يأتي يمثل أحد حلول المعادلة التربيعية في الشكل المُجاور؟

a) 1 b) 2
c) 0 d) 3

2 جذرا المعادلة $3x^2 - 48 = 0$ ، هما:

- a) -2, 2 b) -4, 4
c) -16, 16 d) 6, -6

3 جذرا المعادلة $x^2 - 17x + 42 = 0$ ، هما:

- a) 1, 42 b) 2, 21
c) 3, 14 d) 6, 7

4 جذرا المعادلة $2x^2 - x - 3 = 0$ ، هما:

- a) $-\frac{2}{3}, 1$ b) $\frac{2}{3}, -1$
c) $-\frac{3}{2}, 1$ d) $\frac{3}{2}, -1$

5 أي المقادير الجبرية الآتية ليس مربعاً كاملاً؟

- a) $x^2 - 26x + 169$
b) $x^2 + 32x + 256$
c) $x^2 + 30x - 225$
d) $x^2 - 44x + 484$

أحللُ كُلًّا ممَّا يأتي:

أحلُّ كُلًّا مِنَ المَعَادِلَاتِ الآتِيَةِ بالقانونِ العامِّ، مقرَّبًا إجابتي لأقربِ جُزءٍ مِنْ عَشْرَةٍ (إِنْ لَزِمَ):

36 $5x^2 + 2x - 1 = 0$ 37 $7x^2 + 12x = -2$

38 $3x^2 + 11x = -9$

أحلُّ كُلَّ مُعَادَلَةٍ ممَّا يأتي باستعمالِ أيِّ طريقةٍ، وأبرِّرُ سببَ اختيارِ الطريقةِ:

39 $2x^2 + 7x = 0$ 40 $4x^2 + 8x - 5 = 0$

41 $x^2 - 2x = 5$

أحلُّ كُلًّا مِنَ المَعَادِلَاتِ الآتِيَةِ:

42 $3x^4 = 27x^2$ 43 $x^3 + x^2 = 4x + 4$

44 $2x^3 + 3x^2 = 8x + 12$ 45 $x^4 + 3x^2 - 10 = 0$

تدريب على الاختبارات الدولية

46 أيُّ قِيَمِ c الآتِيَةِ تجعلُ المُعَادَلَةَ $5x^2 + c = 10$ دونَ حلِّ؟

- a) 12 b) 5 c) 9 d) 1

47 أيُّ ممَّا يأتي يُعَدُّ عاملاً لثلاثيِّ الحدودِ $13x^2 + 32x - 21$ ؟

- a) $13x + 3$ b) $13x + 7$
c) $13x + 21$ d) $13x - 7$

48 أيُّ ممَّا يأتي يجعلُ المقدارَ $x^2 + 14x$ عندَ إضافتهِ مُرَبَّعًا كاملاً؟

- a) 7 b) 49 c) 14 d) 196

49 عددُ الحُلُولِ الحقيقيَّةِ للمُعَادَلَةِ $x^2 + 7x = -11$ ، هو:

- a) 0 b) 1 c) 2 d) 3

20 $2x^2 + 13x + 20$

21 $7y^2 + 16y - 15$

22 $2t^2 - t - 3$

23 $8y^2 - 10y - 3$

24 $2q^2 - 11q - 21$

25 $10w^2 + 11w - 8$



26 يمثِّلُ الاقترانُ $h(t) = -5t^2 + 30t$

ارتفاعَ صاروخِ ألعابِ ناريةٍ بالأمتارِ بعدَ t ثانيةٍ مِنْ إطلاقِهِ. بعدَ كم ثانيةٍ مِنْ إطلاقِهِ يصلُ الصاروخُ إلى الأرضِ؟


أحلُّ كُلًّا مِنَ المَعَادِلَاتِ الآتِيَةِ بإكمالِ المُربَّعِ، تاركًا الإجابةَ بدلالةِ الجذرِ التربيعيِّ:

27 $x^2 + 6x + 7 = 0$

28 $x^2 - 3x - 1 = 0$

29 $x^2 - 9x + 10 = 0$

30 $x^2 - 2x - 7 = 0$



31 فناءٌ: فناءٌ منزلٍ على شكلِ

مُسْتطِيلٍ يزيدُ طولُهُ على عرضِهِ بمقدارِ 6 m، ومساحتهُ 216 m^2 . أجدُ أبعادهُ، باستعمالِ إكمالِ المُربَّعِ.

أحلُّ كُلًّا مِنَ المَعَادِلَاتِ الآتِيَةِ بإكمالِ المُربَّعِ، مقرَّبًا إجابتي لأقربِ جُزءٍ مِنْ عَشْرَةٍ (إِنْ لَزِمَ):

32 $x^2 - 10x = 24$

33 $x^2 + x - 1 = 0$

34 $2x^2 + 20x - 10 = 0$

35 $3x^2 - 6x - 9 = 0$

ما أهمية هذه
الوحدة؟

الهندسة الإحداثية عماد نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وهي تُستخدم في كثير من التطبيقات العلمية والحياتية المهمة، مثل أجهزة الرادار التي ترصد حركة السفن والطائرات وتنظمها، كما تُستخدم في تخطيط الطرق والحدائق.

سأتعلم في هذه الوحدة:

- إيجاد المسافة بين نقطتين في المستوى الإحداثي.
- إيجاد نقطة منتصف قطعة مستقيمة في المستوى الإحداثي.
- إيجاد البعد بين نقطة ومستقيم.
- استعمال الهندسة الإحداثية لبرهنة بعض النظريات.

تعلمت سابقاً:

- ✓ إيجاد ميل خط مستقيم ومعادلته.
- ✓ حل نظام من معادلتين خطيتين.
- ✓ الشروط التي تؤكد أن شكلاً رباعياً متوازي أضلاع.
- ✓ تحديد ما إذا كان متوازي الأضلاع مستطيلاً أو معيناً أو مربعاً.

إيجاد المسافة بين مدينتين على الخريطة باستخدام برمجة جوجرا.

فكرة المشروع




شبكة الإنترنت، برمجة جوجرا.

المواد والأدوات



خطوات تنفيذ المشروع:



1 أبحث مع أفراد مجموعتي في شبكة الإنترنت عن خريطة المملكة الأردنية الهاشمية، ثم أحفظها في جهاز الحاسوب.

2 أنقر على أيقونة  Image من شريط الأدوات، ثم أختار الصورة التي حفظتها.

3 أعدل موقع الصورة، وأختار مقاساً مناسباً لها بتحرك النقطتين A و B، اللتين تظهران عليها، بحيث تكون العاصمة عمان نقطة الأصل.

4 أظهر الشبكة فوق الصورة بنقر زر الفأرة الأيمن، ثم اختيار  Settings، ومنها أختار  background image

5 أجد مقياس رسم الخريطة، التي أدرجتها، باتباع الخطوات الآتية:

- أختار أيقونة  A من شريط الأدوات، ثم أنقر موقع العاصمة على الخريطة ليظهر الحرف C، وأنقر موقع المحافظة ليظهر الحرف D، ونظهر الإحداثيات في شريط الإدخال.

- أستعمل صيغة المسافة بين نقطتين لأجد بُعد المحافظة عن العاصمة عمان.

- أبحث في شبكة الإنترنت عن المسافة الحقيقية بين المحافظة التي اخترتها والعاصمة عمان، ثم أجد مقياس الرسم.

6 أجد المسافة الحقيقية بين 3 محافظات أخرى، باستعمال الخطوات السابقة ومقياس الرسم الذي أوجدته.

7 أستعمل صيغة نقطة المنتصف في المستوى الإحداثي لأجد نقطة المنتصف بين كل محافظتين من المحافظات الثلاث التي اخترتها في الخطوة السابقة.

8 يمكنني إيجاد معادلة المستقيم الواصل بين أي محافظتين على الخريطة بالنقر على أيقونة  Line من شريط الأدوات، ثم بالنقر على كل من النقطتين اللتين تمثلان المحافظتين، لتظهر معادلة المستقيم في شريط الإدخال.

9 أجد البعد بين النقطة التي تمثل إحدى المحافظات والمستقيم من الخطوة السابقة باستعمال صيغة البعد بين نقطة ومستقيم.

عرض النتائج:

أعدُّ عرضاً تقديمياً أبين فيه خطوات تنفيذ المشروع موضحة بالصور، وبعض الصعوبات التي واجهتها في أثناء العمل.

الدرس 1

المسافة في المُستوى الإحداثيِّ Distance in the Coordinate Plane

- إيجاد المسافة بين نقطتين في المُستوى الإحداثيِّ.
 - إيجاد نقطة مُتتصفِ قطعةٍ مستقيمةٍ في المُستوى الإحداثيِّ.
- المسافة، الإحداثيِّ، نقطة المُتتصفِ.


فكرة الدرس



المصطلحات



مسألة اليوم




تلتقط آلة تصويرٍ صورًا عالية الدقة للطيور التي تبعدُ عنها 50 m أو أقل. هل تلتقط الآلة صورةً عالية الدقة لطائر النورس الموضَّح موقعه في المُستوى الإحداثيِّ المُجاور؟

المسافة بين نقطتين

المسافة (distance) بين نقطتين على خطِّ الأعداد هي طول القطعة المستقيمة الواصلة بين هاتين النقطتين بحيث تمثلان نهايتي القطعة، ويمكن استعمال **إحداثي** (coordinate) كلِّ من النقطتين لإيجاد المسافة بينهما.


أنعلّم



صيغة المسافة على خطِّ الأعداد

مفهوم أساسي

بالكلمات: المسافة بين نقطتين على خطِّ الأعداد هي القيمة المطلقة للفرق بين إحداثييهما.



بالرموز: إذا كان إحداثي النقطة A على خطِّ الأعداد هو x_1 وإحداثي النقطة B هو x_2 ، فإن:


$$AB = |x_2 - x_1| \quad \text{or} \quad AB = |x_1 - x_2|$$

رموز رياضية

يُرمز إلى القطعة المستقيمة التي نقطتها بدايتها A ونهايتها B بالرمز \overline{AB} أما طولها فيرمز إليه بالرمز AB

مثال 1

أستعملُ خطَّ الأعدادِ الآتيَ لأجدَ BE .



بما أن إحداثيَّ النقطة B هو -5 ، وإحداثيَّ النقطة E هو 2 ، فإنَّ:

$$\begin{aligned} BE &= |x_2 - x_1| && \text{صيغةُ المسافةِ على خطِّ الأعدادِ} \\ &= |2 - (-5)| && \text{بتعويضِ } x_2 = 2, x_1 = -5 \\ &= 7 && \text{بالتبسيطِ} \end{aligned}$$

أتحققُ مِن فهمي


أستعملُ خطَّ الأعدادِ المُبيَّنَ أعلاهُ لأجدَ كُلاً ممَّا يأتي:

a) AD

b) CB

أتعلَّم

بما أن \overline{BE} هو نفسه \overline{EB} ، فإنَّ ترتيبَ اسمِ النقطتينِ غيرُ مهمٍّ عندَ إيجادِ المسافةِ بينهما.




يُمكنني إيجادُ المسافةِ بينَ النقطتينِ A و B في المُستوى الإحداثيِّ باستعمالِ نظريَّةِ فيثاغورس، وذلكَ بتشكيلِ مثلثٍ قائمِ الزاويةِ يكونُ \overline{AB} وترًا فيه، كما في الشكلِ المُجاورِ، ثمَّ أستعملُ نظريَّةَ فيثاغورس لأجدَ AB كالآتي:

$$\begin{aligned} (AB)^2 &= (AC)^2 + (CB)^2 && \text{نظريَّةُ فيثاغورس} \\ &= (|x_2 - x_1|)^2 + (|y_2 - y_1|)^2 && \text{بتعويضِ } AC = |x_2 - x_1|, \\ &= (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 && CB = |y_2 - y_1| \\ AB &= \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} && \text{مُرَبَّعاتُ الأعدادِ دائماً موجبةٌ} \\ &&& \text{بأخذِ الجذرِ التربيعيِّ لطرفيِّ المُعادلةِ} \end{aligned}$$

أتذكَّر

نظريَّةُ فيثاغورس




$$a^2 + b^2 = c^2$$

تُسمَّى الصيغةُ التي توصلتُ إليها من نظريَّةِ فيثاغورس صيغةَ المسافةِ بينَ نقطتينِ في المُستوى الإحداثيِّ.

صيغة المسافة في المستوى الإحداثي

مفهوم أساسي



المسافة بين النقطتين $A(x_1, y_1)$ و $B(x_2, y_2)$ هي:

$$AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

أتعلم

من الأسهل إيجاد طول القطعة المستقيمة الأفقية في المستوى الإحداثي باستعمال صيغة المسافة على خط الأعداد، وذلك بإيجاد القيمة المطلقة للفرق بين الإحداثي x لكل من نقطتي نهايتي القطعة، وإيجاد طول القطعة المستقيمة العمودية. أجد القيمة المطلقة للفرق بين الإحداثي y لكل من نقطتي نهايتي القطعة.

مثال 2

أجد المسافة بين النقطتين $P(-7, 5)$ و $Q(4, -3)$ ، مقرباً إجابتي لأقرب جزء من عشرة.

$$PQ = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

صيغة المسافة في المستوى الإحداثي

$$= \sqrt{(4 - (-7))^2 + ((-3) - 5)^2}$$

بتعويض $(x_1, y_1) = (-7, 5)$

$(x_2, y_2) = (4, -3)$

$$= \sqrt{(11)^2 + (-8)^2}$$

بالتبسيط

$$= \sqrt{185}$$

بإيجاد مربع كل عدد، والجمع

$$\approx 13.6$$

باستعمال الآلة الحاسبة

إذن، المسافة بين النقطتين P و Q هي 13.6 وحدة تقريباً.

أتدقق من فهمي

أجد المسافة بين كل نقطتين مما يأتي، مقرباً إجابتي لأقرب جزء من عشرة (إن لزم):

a) $C(5, 0), D(-7, 9)$


b) $G(4, -2), H(8, -8)$

أتعلم

عند إيجاد المسافة بين نقطتين في المستوى الإحداثي لا يكون ترتيب الإحداثيين x و y في كل مجموعة من الأقواس مهماً.

يمكن استعمال صيغة المسافة في تطبيقات حياتية، مثل إيجاد المساحة والمحيط في المخططات الهندسية.

مثال 3: مِنَ الحَيَاةِ



حديقة: يظهر في المستوى الإحداثي المجاور مُخطَّطُ قاعدة بيت بلاستيكيّ مستطيل الشكل بِنْتُهُ غيداءٌ في فناء منزلها الخلفي لزراعة النباتات. إذا كانت كلُّ وَحْدَةٍ في المُستوى الإحداثي تمثّل متراً واحداً، فأجد مساحة البيت البلاستيكيّ.



معلومة

للبيت البلاستيكيّ مُمَيَّزَاتٌ عَدَّةٌ، مثل توفير درجة حرارة مناسبة لنموّ النباتات؛ ما يتيح إمكانية الزراعة في أيّ وقتٍ مِنَ العام.

لإيجاد مساحة البيت البلاستيكيّ، أجد طولهُ وعرضهُ باستعمال صيغة المسافة في المُستوى الإحداثيّ.

الخطوة 1: أجد طول البيت البلاستيكيّ.

أفترض أنّ طول البيت AB ، وبما أنّ $A(1, 2)$ و $B(4, 5)$ ، فإنّ:

$$AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

صيغة المسافة في المُستوى الإحداثيّ

$$= \sqrt{(4 - 1)^2 + (5 - 2)^2}$$

بتعويض $(x_1, y_1) = (1, 2)$, $(x_2, y_2) = (4, 5)$

$$= \sqrt{(3)^2 + (3)^2}$$

بالتبسيط

$$= \sqrt{18}$$

بإيجاد مُرَبَّع كلِّ عددٍ، والجمع

$$= 3\sqrt{2}$$

بالتبسيط

إذن، طول البيت البلاستيكيّ $3\sqrt{2}$ m

الخطوة 2: أجد عرض البيت البلاستيكيّ.

أفترض أنّ عرض البيت البلاستيكيّ BC ، وبما أنّ $B(4, 5)$ و $C(6, 3)$ ، فإنّ:

$$BC = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

صيغة المسافة في المُستوى الإحداثيّ

$$= \sqrt{(6 - 4)^2 + (3 - 5)^2}$$

بتعويض $(x_1, y_1) = (4, 5)$, $(x_2, y_2) = (6, 3)$

$$= \sqrt{(2)^2 + (-2)^2}$$

بالتبسيط

$$= \sqrt{8}$$

بإيجاد مُرَبَّع كلِّ عددٍ، والجمع

$$= 2\sqrt{2}$$

بالتبسيط

إذن، عرض البيت البلاستيكيّ $2\sqrt{2}$ m

أفكر

هل هذا هو الحلّ الوحيد للمثال؟ أبرر إجابتي.

الخطوة 3: أجد مساحة البيت البلاستيكي.

$$A = l \times w$$

$$= 3\sqrt{2} \times 2\sqrt{2}$$

$$= 12$$


صيغة مساحة المستطيل

$$l = 3\sqrt{2}, w = 2\sqrt{2}$$

بالتبسيط

إذن، مساحة البيت البلاستيكي 12 m^2

أتحقق من فهمي




يظهر في المستوى الإحداثي المجاور مخطط حديقة مثلثة الشكل، يرغب خالد في تركيب مرشحات لريها عند رؤوس المثلث. إذا كانت كل وحدة في المستوى الإحداثي تمثل متراً واحداً، فأجد طول الأنايب التي تصل بين المرشحات الثلاثة، مقرباً إيجابياً لأقرب جزء من عشرة.

نقطة منتصف القطعة المستقيمة

نقطة منتصف (midpoint) القطعة المستقيمة هي النقطة التي تقع في منتصف المسافة بين

نقطتي نهايتي القطعة المستقيمة.



فمثلاً، إذا كانت C نقطة منتصف \overline{AB} ، فإن $AC = CB$ ، وهذا يعني أن $\overline{AC} \cong \overline{CB}$.


يمكنني إيجاد نقطة منتصف قطعة مستقيمة على خط الأعداد بإيجاد الوسط الحسابي لإحداثيي نقطتي نهايتيه.

أندكر

يدل الرمز \cong على التطابق، وتدل الإشارة الحمراء في الشكل المجاور على أن $\overline{AC} \cong \overline{CB}$ ، أي أن لهما الطول نفسه.

صيغة نقطة المنتصف على خط الأعداد

مفهوم أساسي



إذا كان إحداثي النقطة A على خط الأعداد هو x_1

وإحداثي النقطة B هو x_2 ، وكانت M نقطة منتصف


\overline{AB} ، فإن إحداثي M هو:

$$\frac{x_1 + x_2}{2}$$

مثال 4


1 إذا كان إحداثيًا نقطتي نهايتي \overline{CD} هما -3 و 5 ، فأجد إحداثي نقطة منتصف \overline{CD} .

أفترض أن $x_1 = -3$ و $x_2 = 5$ ، وأن نقطة منتصف \overline{CD} هي M .



$$\begin{aligned} & \text{صيغة نقطة المنتصف على خط الأعداد} \\ & \frac{x_1 + x_2}{2} \\ & = \frac{-3 + 5}{2} \quad \text{بتعويض } x_1 = -3, x_2 = 5 \\ & = \frac{2}{2} = 1 \quad \text{بالتبسيط} \end{aligned}$$

إذن، إحداثي نقطة المنتصف هو 1



2 في الشكل المجاور، إذا كانت M نقطة

منتصف \overline{AB} ، فأجد طول \overline{MB} .

الخطوة 1: أجد قيمة x .

$$\overline{AM} \cong \overline{MB}$$

$$AM = MB$$

$$2x + 1 = 3x - 4$$

$$2x + 5 = 3x$$

$$5 = x$$

تعريف نقطة منتصف قطعة مستقيمة

تعريف تطابق القطع المستقيمة

بالتعويض

بجمع 4 إلى طرفي المعادلة

ب طرح $2x$ من طرفي المعادلة

الخطوة 2: أجد طول \overline{MB} .

$$MB = 3x - 4$$

$$= 3(5) - 4$$

$$= 11$$

طول \overline{MB}

بتعويض $x = 5$


بالتبسيط

إذن، طول \overline{MB} هو 11 وحدة طول.

أتحقق من فهمي

(a) إذا كان إحداثيًا نقطتي نهايتي \overline{PT} هما -9 و 10 ، فأجد إحداثي نقطة منتصف \overline{PT} .


(b) في الشكل المجاور، إذا كانت M نقطة منتصف \overline{VW} ، فأجد طول \overline{VM} و طول \overline{VW} .



يمكن إيجاد إحداثي نقطة مُتَصفِ قطعةٍ مستقيمةٍ في المُستوى الإحداثي بإيجاد الوسط الحسابي لكل من الإحداثي x والإحداثي y لِتَقْتَي نِهَائِيَه.

صيغةُ نقطةِ المُتَصفِ في المُستوى الإحداثي

مفهومٌ أساسيٌّ



إذا كانت $A(x_1, y_1)$ و $B(x_2, y_2)$ نقطتَين في المُستوى الإحداثي، و M نقطةُ مُتَصفِ \overline{AB} ، فإنَّ إحداثيَّ M هما:

$$M\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right)$$

مثال 5

أجدُ إحداثيَّ النقطةِ M ، التي تمثُلُ مُتَصفَ \overline{PQ} ؛ حيثُ $P(-6, 3)$ و $Q(1, -1)$.

$$M\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right)$$

صيغةُ نقطةِ المُتَصفِ في المُستوى الإحداثي

$$M\left(\frac{-6 + 1}{2}, \frac{3 + (-1)}{2}\right)$$

بتعويض $(x_1, y_1) = (1, -1)$

$(x_2, y_2) = (-6, 3)$

$$M\left(\frac{-5}{2}, 1\right)$$

بالتبسيط

إذن، إحداثيَّا النقطةِ M مُتَصفِ \overline{PQ} ، هما $\left(\frac{-5}{2}, 1\right)$

أتحققُ من فهمي

أجدُ إحداثيَّ النقطةِ M ، التي تمثُلُ مُتَصفَ \overline{HI} ؛ حيثُ $H(5, -3)$ و $I(-1, -7)$

يمكنُ إيجادُ إحداثيَّ نقطةِ نِهَائِيَهٍ قطعةٍ مستقيمةٍ إذا عَلِمَ إحداثيَّا نقطةِ النِهَائِيَه الأخرى للقطعةِ وإحداثيَّا نقطةِ المُتَصفِ.

أُتَعَلَّمُ

ترتيبُ إحداثيَّي نقطتي نِهَائِيَهٍ القطعةِ المستقيمةِ ليس مهمًّا عندَ إيجادِ إحداثيَّي نقطةِ مُتَصفِ قطعةٍ مستقيمةٍ.

مثال 6

إذا كانت $M(2, 1)$ نقطة مُتَصفِـفِـ \overline{JK} ؛ حيثُ $J(1, 4)$ ، فأَجِدْ إحداثيَّي النقطة K .

الخطوة 1: أعوِّض الإحداثيات المعلومة في صيغة نقطة المُتَصفِـفِـ في المُستوى الإحداثي.

أفترض أنَّ $J(x_1, y_1)$ و $K(x_2, y_2)$.

$$M\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right) = M(2, 1) \quad \text{صيغة نقطة المُتَصفِـفِـ في المُستوى الإحداثي}$$

$$M\left(\frac{1 + x_2}{2}, \frac{4 + y_2}{2}\right) = M(2, 1) \quad \text{بتعويض } (x_1, y_1) = (1, 4)$$

الخطوة 2: أكتب مُعادلتين، وأحلَّهُما لإيجاد إحداثيَّي K .

أجد x_2

$$\frac{1 + x_2}{2} = 2$$

$$1 + x_2 = 4$$

$$x_2 = 3$$

أجد y_2

$$\frac{4 + y_2}{2} = 1$$

$$4 + y_2 = 2$$

$$y_2 = -2$$


إذن، إحداثيَّي النقطة K هما $(3, -2)$.

أتحقق من فهمي


إذا كانت $M(-5, 10)$ نقطة مُتَصفِـفِـ \overline{EP} ؛ حيثُ $E(-8, 6)$ ، فأَجِدْ إحداثيَّي النقطة P .

أتعلم

يُمكنني التحقق من معقولية الإجابة بتمثيل النقاط الثلاثة في المُستوى الإحداثي، وملاحظة أنَّ المسافة بين J و M تظهر مساوية للمسافة بين M و K .



أدرب وأحل المسائل



أستعمل خطَّ الأعداد المُجاوِرَ لِأَجِدَ كُلاً مِمَّا يأتي:

1 AB

2 CD

3 CB


4 AC

أجد المسافة بين كل نقطتين مما يأتي، مقربًا إجابتي لأقرب جزءٍ من عشرة (إن لزم):


5 $C(-1, 6), D(4, 8)$

6 $E(6, -1), F(2, 0)$

7 $G(4, -5), H(0, 2)$



8 أجد محيط المثلث المعطاة رؤوسه في المستوى الإحداثي المجاور.




أستعمل خط الأعداد المجاور لأجد إحداثي نقطة المنتصف لكل من القطع المستقيمة الآتية:

9 \overline{RS}


10 \overline{UV}

11 \overline{VS}



12 أجد مساحة المستطيل $FEHG$ المعطاة رؤوسه في المستوى الإحداثي المجاور.

أستعمل الشكل أدناه لأجد PT في كل مما يأتي:



13 $PT = 5x + 3, TQ = 7x - 9$

14 $PT = 7x - 24, TQ = 6x - 2$

أجد إحداثي نقطة منتصف \overline{HK} في كل من الحالات الآتية:

15 $H(7, 3), K(-4, -1)$

16 $H(-4, -5), K(2, 9)$


17 $H(-6, 10), K(8, -2)$

أجد إحداثي نقطة نهاية القطعة المستقيمة \overline{CD} المجهولة في كل مما يأتي. علماً أن M نقطة منتصف \overline{CD} :

18 $C(-5, 4), M(-2, 5)$


19 $D(1, 7), M(-3, 1)$

20 $D(-4, 2), M(6, -1)$



أستعمل الشكل المُجاوِرَ الذي يبيّن $\triangle ABC$ في المُستوى الإحداثي، للإجابة عن السؤالين الآتيين تبعاً:

- 21 أحدد نوع المثلث من حيث الأضلاع.
- 22 أجد محيط المثلث.



23 **مسافة:** تظهر في المُستوى الإحداثي المُجاوِرَ 3 مناطق في العاصمة عمان، هي: صويلح، والجامعة الأردنية، والرابية. إذا كانت كل وحدة في المُستوى الإحداثي تمثل كيلومتراً واحداً، فأجد المسافة بين صويلح والجامعة الأردنية والمسافة بين الرابية والجامعة الأردنية، مقرباً إجابتي لأقرب جزء من عشرة.

24 أحل المسألة الواردة في بداية الدرس.


مهارات التفكير العليا

$$\begin{aligned}
 AB &= \sqrt{(2 - 1)^2 + (6 - (-4))^2} \\
 &= \sqrt{1^2 + 10^2} \\
 &= \sqrt{1 + 100} \\
 &= \sqrt{101} \approx 10
 \end{aligned}$$




25 **أكتشف الخطأ:** وجد عماد المسافة التقريبية بين النقطتين $A(6, 2)$ و $B(1, -4)$ ، كما هو مبين جانباً. أكتشف الخطأ في حل عماد، وأصححه.

26 **تبرير:** تقع النقطة P على القطعة المستقيمة التي نهايتها النقطتان $A(1, 4)$ و $D(7, 13)$. إذا كانت المسافة بين P و A ثلاثة أمثال المسافة بين P و D ، فأجد إحداثيات النقطة P . أبرر إجابتي.



27 **تبرير:** يبين الشكل المُجاوِرَ مُخطّطاً لحديقة عامة على شكل مثلث مُحاطة بممر مشاة. تمارس فيها مرآة رياضة الركض، حيث انطلقت على الممر بسرعة ثابتة مقدارها 130 m لكل دقيقة من P إلى Q ثم من Q إلى R ثم عادت إلى P . كم دقيقة تقريباً استغرقت مرآة للعودة إلى P مرة أخرى؟ أبرر إجابتي.

البُعدُ بينَ نقطةٍ ومستقيمٍ Distance between a Point and a Line



- إيجادُ البعدِ بينَ نقطةٍ ومستقيمٍ.
- إيجادُ البعدِ بينَ مُستقيمينِ مُتوازيينِ.

فكرة الدرس




مسألة اليوم



يحاولُ جمالُ عبورَ جدولٍ مائٍ بالفِز من موقعه عندَ النقطةِ A إلى الجهة الأخرى من الجدول، كما يظهرُ في الشكل المُجاور. إلى أيِّ نقطةٍ يجبُ أن يفزَ جمالُ؟ أبررْ إجابتي.

البعدُ بينَ نقطةٍ ومستقيمٍ




البعدُ بينَ مستقيمٍ ونقطةٍ لا تقعُ عليه هو طولُ القطعةِ المستقيمةِ العموديةِ على المستقيمِ من تلكَ النقطةِ، وتمثلُ أقصرَ مسافةٍ بينَ المستقيمِ والنقطةِ. فمثلاً، أقصرُ مسافةٍ بينَ النقطةِ C و \overleftrightarrow{AB} هي طولُ \overline{CD} .

أندكّر

يشيرُ الرمزُ \overleftrightarrow{AB} إلى المستقيمِ المارِّ بالنقطتين A و B .

تعلّمتُ سابقاً كيفَ أنشئُ عموداً على مستقيمٍ من نقطةٍ لا تقعُ عليه باستعمالِ فرجارٍ ومسطرةٍ، ويتضحُ من هذه الطريقةِ وجودُ مستقيمٍ عموديٍّ واحدٍ على الأقلٍ على مستقيمٍ معلومٍ من نقطةٍ لا تقعُ عليه، لكنَّ المُسلّمةَ الآتيةَ تنصُّ على أن هذا المستقيمَ العموديَّ مستقيمٌ وحيدٌ.

مُسلّمةُ التعاقدِ



لأيِّ مستقيمٍ ونقطةٍ لا تقعُ عليه يوجدُ مستقيمٌ واحدٌ فقط يمرُّ بالنقطةِ، ويكونُ عمودياً على المستقيمِ المعلومِ.

مُسلّمةُ

أندكّر

المُسلّمةُ عبارةٌ رياضيّةٌ تُقبَلُ على أنّها صحيحةٌ من غيرِ برهانٍ.

مثال 1

أجد البعد بين النقطة $(1, 0)$ والمستقيم l المارّ بالنقطتين $(3, 0)$ و $(1, 2)$.

الخطوة 1: أجد مُعادلة المستقيم l .

• أجد ميل المستقيم l .

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \quad \text{صيغة الميل}$$

$$= \frac{2 - 0}{1 - 3} \quad \text{بالتعويض } (x_1, y_1) = (3, 0), (x_2, y_2) = (1, 2)$$

$$= \frac{2}{-2} = -1 \quad \text{بالتبسيط}$$

إذن، ميل المستقيم l هو -1

• أجد مقطع المستقيم l من المحور y باستعمال ميله ونقطة يمرُّ بها:

$$y = mx + b \quad \text{صيغة الميل والمقطع}$$

$$0 = -1(3) + b \quad \text{بتعويض } m = -1, x = 3, y = 0$$

$$3 = b \quad \text{بجمع 3 لطرفي المعادلة}$$

إذن، مُعادلة المستقيم l هي: $y = 3 - x$

الخطوة 2: أجد مُعادلة المستقيم w العمودي على المستقيم l والمارّ بالنقطة $(1, 0)$.

بما أن ميل المستقيم l الذي معادلته $y = 3 - x$ هو -1 ؛ فإن ميل المستقيم w العمودي على المستقيم l هو 1

أجد مقطع المستقيم w من المحور y باستعمال ميله والنقطة التي يمرُّ بها.

$$y = mx + b \quad \text{صيغة الميل والمقطع}$$

$$0 = 1(1) + b \quad \text{بتعويض } m = 1, x = 1, y = 0$$

$$-1 = b \quad \text{ب طرح 1 من طرفي المعادلة}$$

إذن، مُعادلة المستقيم w هي: $y = x - 1$

أذكر

استعمل ميل المستقيم والمقطع y لكتابة مُعادلة مستقيم بصيغة الميل والمقطع على الصورة $y = mx + b$.

أذكر

• ميل المستقيم m هو $y = mx + b$
 • حاصل ضرب ميلي المستقيمين المتعامدين يساوي -1

الخطوة 3: أستخدمُ مُعادلتَي المُستقيمين l و w لكتابة نظام مُعادلاتٍ وَحَلِّهِ لإيجاد نقطة تقاطع المُستقيمين.

$$y = -x + 3$$

مُعادلة المُستقيم l

$$(+)\ y = x - 1$$

مُعادلة المُستقيم w

$$2y = 2$$

بحذف المُتغير x

$$y = 1$$

بقسمة طرفي المُعادلة على 2

أعوّض 1 بدلاً من y في إحدى المُعادلتين؛ لإيجاد قيمة x .

$$y = x - 1$$

مُعادلة المُستقيم w

$$1 = x - 1$$

بتعويض 1 بدلاً من y

$$x = 2$$

بجمع 2 لطرفي المُعادلة

إذن، يتقاطع المُستقيمان l و w في النقطة $(2, 1)$.

الخطوة 4: أستخدمُ صيغة المسافة بين نقطتين لإيجاد المسافة بين $(1, 0)$ و $(2, 1)$.

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

صيغة المسافة في المُستوى الإحداثي

$$= \sqrt{(1 - 2)^2 + (0 - 1)^2}$$

بتعويض $(x_1, y_1) = (1, 0)$

$(x_2, y_2) = (2, 1)$

$$= \sqrt{(-1)^2 + (-1)^2}$$

بالتبسيط

$$= \sqrt{2}$$

بإيجاد مُربّع كلٍّ عددي، والجمع

إذن، البعد بين النقطة $(1, 0)$ والمُستقيم l هي $\sqrt{2}$ وحدة.

أتحقق من فهمي 

أجدُ البعد بين النقطة $(1, 0)$ والمُستقيم l الذي مُعادلتُهُ: $y = 3x + 3$

أندكر

حلُّ نظام المُعادلات الخطية بمُتغيرين هو زوج مرتبٌ يحقّق كلَّ مُعادلة في النظام.

أندكر

يمكنُ حلُّ نظام المُعادلات بالحذف أو بالتعويض.

أنعلم

أجدُ البعد بين النقطة والمحور x بتحديد الإحداثي y للنقطة، وأجدُ البعد بين النقطة والمحور y بتحديد الإحداثي x للنقطة.

صيغة البعد بين نقطة ومستقيم

تعلمت في المثال السابق إيجاد البعد بين نقطة ومستقيم في المستوى الإحداثي باستخدام حل المعادلات وصيغة المسافة بين نقطتين، ويمكن أيضًا إيجاد البعد بين نقطة ومستقيم في المستوى الإحداثي بشكل مباشر باستخدام الصيغة الآتية:

صيغة البعد بين نقطة ومستقيم

مفهوم أساسي

البعد بين المستقيم l ، الذي معادلته: $Ax + By + C = 0$ ، والنقطة $P(x_1, y_1)$ يُعطى بالصيغة:

$$d = \frac{|Ax_1 + By_1 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

شرطية ألا تكون قيمتا A و B معًا صفرًا.

مثال 2

أجد البعد بين النقطة $(3, -5)$ والمستقيم $3x - 4y = 26$

الخطوة 1: أكتب معادلة المستقيم على الصورة $Ax + By + C = 0$

$$3x - 4y = 26$$

معادلة المستقيم المعطاة

$$3x - 4y - 26 = 0$$

بترح 26 من طرفي المعادلة

$$\text{إذن، } A = 3, B = -4, C = -26$$

الخطوة 2: أجد البعد بين النقطة والمستقيم.

$$d = \frac{|Ax_1 + By_1 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

صيغة البعد بين نقطة ومستقيم

$$= \frac{|3(3) + (-4)(-5) + (-26)|}{\sqrt{(3)^2 + (-4)^2}}$$

بتعويض $A = 3, B = -4,$

$$C = -26, x_1 = 3, y_1 = -5$$

$$= \frac{3}{5}$$

بالتبسيط

إذن، البعد بين النقطة والمستقيم $\frac{3}{5}$ وحدة.

أتذكر

أكتب معادلة المستقيم على الصورة $Ax + By + C = 0$ للتطبيق في صيغة البعد بين نقطة ومستقيم.

أتذكر


أتبع أولويات العمليات الحسابية عند التطبيق في قانون البعد بين نقطة ومستقيم.

أتحقق من فهمي

أجد البعد بين النقطة $(-1, 3)$ والمستقيم $3x - 4y = 16$

نحتاج في كثير من المواقف الحياتية إلى تحديد أقصر مسافة لتوفير الوقت والجهد.

مثال 3: من الحياة



كشافة: يظهر في المستوى الإحداثي المجاور موقع تخييم مجموعة كشفية في منطقة وادي رم. إذا أرادت المجموعة العودة إلى مدينة العقبة عبر الطريق

الرئيس، وكانت مُعادلة المستقيم التي تمثل هذا الطريق المؤدي إلى مدينة العقبة هي $y = \frac{1}{3}x - 4$ ، فأجد أقصر مسافة بين موقع التخييم والطريق، مقربًا إجابتي لأقرب جزء من عشرة. علمًا أن كل وحدة في المستوى الإحداثي تمثل كيلومترًا واحدًا.

لإيجاد أقصر مسافة بين موقع التخييم والطريق الرئيس، أجد البعد بين النقطة $(-6, 4)$ والمستقيم $y = \frac{1}{3}x - 4$.

الخطوة 1: أكتب مُعادلة المستقيم على الصورة $Ax + By + C = 0$.

$$y = \frac{1}{3}x - 4$$

مُعادلة المستقيم المُعطاة

$$\frac{1}{3}x - y - 4 = 0$$

بكتابة المُعادلة على الصورة $Ax + By + C = 0$

$$\text{إذن، } A = \frac{1}{3}, B = -1, C = -4$$



معلومة

يُسمى وادي رم أيضًا وادي القمر؛ لأن تضاريسه تشبه تضاريس سطح القمر، كما أنه يُعدُّ منطقةً سياحيةً مهمةً يرتادها الزوار والسياح من مختلف أنحاء العالم للتمتع بالطبيعة الصحراوية الخلابة.

الخطوة 2: أجد البعد بين النقطة والمستقيم.

$$d = \frac{|Ax_1 + By_1 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

$$= \frac{\left| \frac{1}{3}(-6) + (-1)(4) + (-4) \right|}{\sqrt{\left(\frac{1}{3}\right)^2 + (-1)^2}}$$

$$\approx 9.5$$

صيغة البعد بين نقطة ومستقيم

بتعويض $A = \frac{1}{3}, B = -1, C = -4, x_1 = -6, y_1 = 4$

باستعمال الآلة الحاسبة

إذن، البعد بين موقع التخيم والطريق الرئيس 9.5 km تقريباً.

أتعلم

يمكن إيجاد معادلة

مكافئة للمعادلة


$$\frac{1}{3}x - y - 4 = 0$$

بضرب طرفي المعادلة

بالعدد 3، وذلك لتسهيل


الحسابات.

أتحقق من فهمي



يظهر في المستوى الإحداثي المجاور موقع منزل حنين بالنسبة إلى الشارع الرئيس المؤدي إلى مدرستها. إذا كانت معادلة المستقيم الذي يمثل الشارع الرئيس هي $y = x + 20$ ، فأجد أقصر مسافة بين منزل حنين والطريق، مقرباً إجابتي لأقرب جزء من عشرة.

البعد بين مستقيمين متوازيين



تعلمت سابقاً أن المستقيمين المتوازيين هما مستقيمان يقعان في المستوى نفسه، بحيث يكون البعد بينهما ثابتاً، وهذا يعني أن البعد بين أي نقطة على أحدهما والمستقيم الآخر ثابت.

البعد بين مستقيمين متوازيين

مفهوم أساسي

البعد بين مستقيمين متوازيين هو البعد بين أحد المستقيمين وأي نقطة على المستقيم الآخر.

مثال 4

أجد البعد بين المستقيمين المتوازيين m, n إذا كانت معادلتُهُما $3x + 4y + 8 = 0$ ، $3x + 4y + 10 = 0$ على الترتيب.

الخطوة 1: أجد إحداثيي نقطة تقع على أحد المُستقيمين.

عوّض $x = 0$ في مُعادلة المُستقيم m لأجد الإحداثي y المقابل لها.

$$3x + 4y + 8 = 0 \quad \text{مُعادلة المُستقيم } m$$

$$3(0) + 4y + 8 = 0 \quad \text{بتعويض } x = 0$$

$$y = -2 \quad \text{بحلّ المُعادلة}$$

إذن، تقع النقطة $(0, -2)$ على المُستقيم m

الخطوة 2: أجد البعد بين النقطة والمُستقيم الآخر.

أجد البعد بين النقطة $(0, -2)$ والمُستقيم n ؛ حيث $A = 3, B = 4, C = 10$

$$d = \frac{|Ax_1 + By_1 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}} \quad \text{صيغة البعد بين نقطة ومُستقيم}$$

$$= \frac{|3(0) + (4)(-2) + 10|}{\sqrt{(3)^2 + (4)^2}} \quad \text{بتعويض } A = 3, B = 4, C = 10, x_1 = 0, y_1 = -2$$

$$= \frac{2}{5} \quad \text{بالتبسيط}$$

إذن، البعد بين المُستقيمين m و n هو $\frac{2}{5}$ وحدة.

أتحقق من فهمي 

أجد البعد بين المُستقيمين المتوازيين m, n إذا كانت معادلتُهُما $x - 7y + 14 = 0$ ، $x - 7y - 11 = 0$ على الترتيب.

أتعلم

يمكن تحديد ما إذا كان المستقيمان متوازيين أم لا إذا كان لهما الميل نفسه وكان المقطع y مختلفاً.

أَجِدُ البَعْدَ بَيْنَ النِّقْطَةِ P وَالمُسْتَقِيمِ l فِي كُلِّ مِمَّا يَأْتِي مِنْ غَيْرِ اسْتِعْمَالِ صِيغَةِ البَعْدِ بَيْنَ نِقْطَةٍ وَمُسْتَقِيمٍ:

1 النِّقْطَةُ $P(2, 1)$ وَالمُسْتَقِيمُ l المَارُّ بِالنِّقْطَتَيْنِ $(-6, 0)$ وَ $(1, -4)$.

2 النِّقْطَةُ $P(-9, 2)$ وَالمُسْتَقِيمُ l المَارُّ بِالنِّقْطَتَيْنِ $(2, 8)$ وَ $(-2, 3)$.

3 النِّقْطَةُ $P(4, 4)$ وَالمُسْتَقِيمُ l المَارُّ بِالنِّقْطَتَيْنِ $(1, -3)$ وَ $(-7, 4)$.

أَجِدُ البَعْدَ بَيْنَ النِّقْطَةِ P وَالمُسْتَقِيمِ l فِي كُلِّ مِمَّا يَأْتِي بِاسْتِعْمَالِ صِيغَةِ البَعْدِ بَيْنَ نِقْطَةٍ وَمُسْتَقِيمٍ:

4 النِّقْطَةُ $P(5, 7)$ وَالمُسْتَقِيمُ l المَارُّ بِالنِّقْطَتَيْنِ $(-2, 1)$ وَ $(0, 1)$.

5 النِّقْطَةُ $P(1, -9)$ وَالمُسْتَقِيمُ l المَارُّ بِالنِّقْطَتَيْنِ $(4, 9)$ وَ $(4, -1)$.

6 النِّقْطَةُ $P(-3, -10)$ وَالمُسْتَقِيمُ l المَارُّ بِالنِّقْطَتَيْنِ $(3, 1)$ وَ $(-8, -1)$.

أَجِدُ البَعْدَ بَيْنَ النِّقْطَةِ وَالمُسْتَقِيمِ فِي كُلِّ مِمَّا يَأْتِي:

7 $y - \frac{1}{6}x + 6 = 0, P(-6, 5)$

8 $y = x + 2, Q(2, 4)$

9 $y + \frac{1}{4}x = 1, S(4, 3)$

10 $y = -3, T(5, 2)$

11 $x = 4, K(-2, 5)$

12 $y - x = 0, R(5, 3)$

أَجِدُ البَعْدَ بَيْنَ كُلِّ مُسْتَقِيمَيْنِ مُتَوَازِيَيْنِ فِي مَا يَأْتِي:

13 $4x - y + 1 = 0$


14 $12x + 5y - 3 = 0$

15 $2x - 3y + 4 = 0$

$4x - y - 8 = 0$

$12x + 5y + 7 = 0$


$y = \frac{2}{3}x + 5$



16 **نهر:** يظهرُ فِي المُسْتَوَى الإِحْدَائِيّ المُجَاوِرِ جُزْءٌ مِنْ نَهْرٍ يُمَثِّلُ المُسْتَقِيمَيْنِ

l وَ m ضَبْطِيهِ. أَجِدُ عَرْضَ النَهْرِ، مَقْرَّبًا إِجْبَابِي لِأَقْرَبِ جُزْءٍ مِنْ عَشْرَةٍ.

عَلِمًا أَنَّ كُلَّ وَحْدَةٍ فِي المُسْتَوَى الإِحْدَائِيّ تُمَثِّلُ 10 أَمْتَارًا.



يظهرُ في المُستوى الإحداثيِّ المُجاوِرِ منزلُ بسمّة الذي يقعُ عندَ النقطةِ P ،
ومنزُلُ رشا الذي يقعُ عندَ النقطةِ R .

17 أجدُ طولَ الطريقِ بينَ منزلِ بسمّة و منزلِ رشا.

18 أجدُ النقطةَ التي تمثُلُ مُتَصفَ الطريقِ بينَ منزلِ بسمّة و منزلِ رشا.

19 إذا كانَ مركزُ المدينةِ يقعُ عندَ نقطةِ الأَصْلِ، فأجدُ أقصرَ مسافةٍ بينَ هذا
المركزِ والطريقِ الواصلِ بينَ منزلَي بسمّة و رشا.


مهارات التفكير العليا

20 **أكتشفُ الخطأ:** وجدَ عمرانُ البعدَ بينَ المستقيمِ l الذي مُعادَلتهُ: $y + 2x - 8 = 0$ والنقطةِ $P(1, -1)$ ، كما هو مُبينُ أدناه. أكتشفُ الخطأَ في حلِّ عمران، وأصحِّحُه.

$$d = \frac{|Ax_1 + By_1 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

$$= \frac{|1(1) + (2)(-1) + (-8)|}{\sqrt{(1)^2 + (-1)^2}}$$

$$= \frac{9}{\sqrt{2}}$$



21 **تبرير:** أجدُ مساحةَ المثلثِ المرسومِ في المُستوى الإحداثيِّ المُجاوِرِ،
وأبرِّرُ إجابتي.

22 **تحدّ:** أجدُ إحداثيَّي النقطةِ (النقاطِ) على المحورِ x ، التي تَبْعُدُ 4 وحداتٍ عَنِ المستقيمِ $\frac{x}{3} + \frac{y}{4} = 1$

البرهان الإحداثي

Coordinate Proof

استعمال الهندسة الإحداثية لبرهنة نظريات هندسية.

فكرة الدرس



البرهان الإحداثي.

المصطلحات




يبين الشكل المجاور المثلث المتطابق الأضلاع CFD.

مسألة اليوم



أجد الإحداثيات المجهولة للرؤوس.




تمثيل المضلع في المستوى الإحداثي وتسميته

لتمثيل مضلع في المستوى الإحداثي، يُفضل رسم أحد رؤوسه على نقطة الأصل وأحد أضلاعه على محور إحداثي؛ وذلك لتسهيل تحديد إحداثيات بقية رؤوسه اعتماداً على خصائصه.

مثال 1

1 أرسم في المستوى الإحداثي المستطيل ABCD، الذي طوله h وحدة وعرضه k وحدة.

- أجعل زاوية المستطيل القائمة A على نقطة الأصل؛ لأرسمه في الربع الأول.
- أفترض أن AD يمثل طول المستطيل ويساوي h وحدة، وأن AB يمثل عرضه ويساوي k وحدة.
- أرسم D على المحور x . وبما أن طول \overline{AD} يساوي h وحدة، فإن الإحداثي y للنقطة D هو 0 ، والإحداثي x هو h .




- أرسم B على المحور y . وبما أن طول \overline{AB} يساوي k وحدة، فإن الإحداثي x للنقطة B هو 0 ، والإحداثي y هو k .

- أرسم الرأس C ، بحيث يكون إحداثياته (h, k) .

أرسم في المستوى الإحداثي المثلث المتطابق الضلعين JLK ، الذي فيه طول \overline{JK} يساوي a وحدة.

- اجعل رأس المثلث J على نقطة الأصل؛ لأرسمه في الربع الأول.
- أرسم K على المحور x ، وبما أن طول \overline{JK} يساوي a وحدة، فإن الإحداثي y للنقطة K هو 0 ، والإحداثي x هو a .



- بما أن المثلث متطابق الضلعين، فإن الإحداثي x للرأس L يقع في منتصف المسافة بين 0 و a ؛ أي أنه يساوي $\frac{a}{2}$ ، وبما أن الإحداثي y لا يمكن تحديده، فيمكن تسميته b .

أتتحقق من فهمي

- (a) أرسم في المستوى الإحداثي المستطيل $ABCD$ ، الذي طوله a وحدة، وعرضه $2b$ وحدة.
- (b) أرسم في المستوى الإحداثي المثلث قائم الزاوية HMN ، الذي فيه طول \overline{HM} يساوي a وحدة، وطول \overline{NM} يساوي b وحدة.


إيجاد الإحداثيات المجهولة

يمكن تحديد إحداثيات مجهولة لرؤوس مضلع ممثل في المستوى الإحداثي، وذلك باستعمال خصائص المضلع والإحداثيات الأخرى المعروفة.

مثال 2

أجد الإحداثيات المجهولة في كل من الأشكال الآتية:

1




- بما أن الرأس F يقع على نقطة الأصل فإن إحداثيته $(0, 0)$.
- بما أن $\overline{EF} \cong \overline{FG}$ فإن طول \overline{GF} يساوي a وحدة، وهو يمثل الإحداثي x للرأس G .
- بما أن الرأس G على المحور x ، فإن إحداثيته y يساوي 0 . ومنه، فإن إحداثيي G هما $(a, 0)$.

أفكر

هل المثلث في الفرع 1 من المثال 2 قائم الزاوية؟ أبرر إجابتي.

2



• بما أن الرأس M يقع عند نقطة الأصل فإن إحداثييه $(0, 0)$.


• بما أن الرأس Q يقع على المحور x ، ويقع الرأس N على المحور y ، فإن $\angle NMQ$ قائمة، إذن أضلاع الشكل متطابقة. وعليه، فالشكل مُربّع.

• بما أن الشكل مُربّع فإن طول \overline{MN} يساوي a وحدة، وهو يمثل الإحداثي y للرأس N .

• بما أن الرأس N يقع على المحور y ، فإن إحداثيه x يساوي 0 . ومنه، فإن إحداثيي N هما $(0, a)$.

• بما أن الشكل مُربّع، فإن بُعد الرأس P عن المحور x وعن المحور y هو a . ومنه، فإن إحداثيي P هما (a, a) .

3






• بما أن كل ضلعين متقابلين متوازيان فالشكل مُتوازي أضلاع.

• بما أن الرأس S على المحور x فإن إحداثيه y يساوي 0 . ومنه، فإن إحداثيي S هما $(a, 0)$.

• بما أن القطع المستقيمة الأفقية متوازية دائماً، فإن للنقطتين P و R الإحداثي y نفسه، وبما أن طول \overline{PR} يساوي a وحدة والإحداثي x للنقطة P هو b ، فإن الإحداثي x للنقطة R هو $b + a$. ومنه، فإن إحداثيي R هما $(a + b, c)$.

أتحقق من فهمي

أجد الإحداثيات المجهولة في كلٍّ من الأشكال الآتية:



أذكّر

إذا كانت إحدى زوايا مُتوازي الأضلاع قائمة فإن زوايا الأربعة قوائم، وعندها يكون مُستطيلاً، وبما أن أضلاعه متطابقة وزواياه قوائم فالشكل الهندسي مُربّع.

أذكّر

إذا كان الشكل مُتوازي أضلاع فإن الأضلاع المتقابلة متطابقة.

البرهانُ الإحداثيُّ


البرهانُ الإحداثيُّ (coordinate proof) هو أحد أنواع البراهين، تُستعملُ فيه أشكالٌ هندسيَّةٌ مرسومةٌ في المُستوى الإحداثيِّ لإثباتِ صحَّةِ نظرياتٍ هندسيَّةٍ، ويتضمَّنُ أيضًا استعمالَ مُتغيِّراتٍ تمثِّلُ إحداثياتِ رؤوسِ الشكلِ أو قياساتِ زواياه أو أضلاعه؛ لضمانِ أنَّ النتيجةَ التي يجري برهانها صحيحةٌ لجميعِ الأشكالِ مِنَ النوعِ نفسه بِغَضِّ النظرِ عنِ إحداثياتِ رؤوسه.

أندكّر

تعلّمتُ سابقًا نوعينِ مِنَ البراهينِ، هما: البرهانُ السّهْمِيُّ، والبرهانُ ذو العمودينِ.

مثال 3

أكتبُ برهانًا إحدائيًّا لِأُثَبِتَ أَنَّ القطعةَ المُستقيمةَ الواصلةَ بينَ منتصفَي ضلعينِ في مثلثٍ تُساوي نصفَ طولِ الضلعِ الثالثِ وتوازيه.



الخطوة 1: أرسمُ المثلثَ في المُستوى الإحدائيِّ.

أرسمُ المثلثَ ABC في المُستوى الإحدائيِّ، وأحدّدُ إحداثياتِ كلِّ من رؤوسه.

الخطوة 2: أحدّدُ المُعطياتِ والمطلوبَ.

المُعطياتُ: في ΔABC

• D نقطةٌ مُتّصفِ \overline{AB} .

• E نقطةٌ مُتّصفِ \overline{BC} .

المطلوبُ: إثباتُ أن $\overline{DE} \parallel \overline{AC}$ ، وأن $DE = \frac{1}{2} AC$

الخطوة 3: البرهانُ

(1) أُثَبِتُ أن $\overline{DE} \parallel \overline{AC}$

باستعمالِ صيغةِ نقطةِ المتّصفِ، فإنَّ إحداثيَّ كلِّ من D و E هما:

$$D\left(\frac{b+0}{2}, \frac{c+0}{2}\right) = D\left(\frac{b}{2}, \frac{c}{2}\right) \quad E\left(\frac{b+a}{2}, \frac{c+0}{2}\right) = E\left(\frac{b+a}{2}, \frac{c}{2}\right)$$

بما أنَّ الإحدائيَّ y لكلِّ من D و E متساويان، فإنَّ ميلَ \overline{DE} يُساوي صفرًا، وبما أنَّ \overline{AC} مُنطَبِقٌ على المحورِ x ، فإنَّ ميله أيضًا يُساوي صفرًا. إذن، $\overline{DE} \parallel \overline{AC}$ لأنَّ لهما الميلَ نفسه.

أتعلّم

المثلثُ ABC الذي رُسمَ في المُستوى الإحدائيِّ غيرُ محدّدِ القياساتِ؛ لأنَّ اختيارَ الإحداثياتِ اعتمدَ على قيمتينِ مُتغيّرتينِ هما a و b ؛ لذا يمكنُ استعمالُ هذا المثلثِ لإثباتِ صحَّةِ علاقاتٍ في جميعِ المثلثاتِ.

أندكّر

للمُستقيماتِ المتوازيةِ الميلُ نفسه، والمُستقيماتُ الأفقيَّةُ جميعها مُتوازيةٌ وميلها يُساوي 0

$$(2) \text{ أثبت أن } DE = \frac{1}{2} AC$$

أستعمل صيغة المسافة على خط الأعداد لإيجاد DE .

$$DE = |x_2 - x_1| \quad \text{صيغة المسافة على خط الأعداد}$$

$$= \left| \frac{b+a}{2} - \frac{b}{2} \right| \quad \text{بالتعويض } x_1 = \frac{b}{2}, x_2 = \frac{b+a}{2}$$

$$= \left| \frac{a}{2} \right| \quad \text{بالتبسيط}$$

$$= \frac{a}{2} \quad \text{بإيجاد القيمة المطلقة}$$

أستعمل صيغة المسافة على خط الأعداد لإيجاد AC .

$$AC = |x_2 - x_1| \quad \text{صيغة المسافة على خط الأعداد}$$

$$= |a - 0| \quad \text{بالتعويض } x_1 = 0, x_2 = a$$

$$= |a| \quad \text{بالتبسيط}$$

$$= a \quad \text{بإيجاد القيمة المطلقة}$$

$$\text{بما أن } DE = \frac{a}{2} \text{ و } AC = a, \text{ فإن } DE = \frac{1}{2} AC$$

أتحقق من فهمي


اكتب برهاناً إحدائياً لأثبت أن القطعة المستقيمة الواصلة بين رأس المثلث قائم الزاوية ومنتصف الوتر تساوي نصف طول الوتر.

أتذكر

من الأسهل إيجاد طول القطعة المستقيمة الأفقية في المستوى الإحداثي باستعمال صيغة المسافة على خط الأعداد، وذلك بإيجاد القيمة المطلقة للفرق بين الإحداثي x لكل من نقطتي نهائي القطعة، وإيجاد طول القطعة المستقيمة الرأسية. أجد القيمة المطلقة للفرق بين الإحداثي y لكل من نقطتي نهائي القطعة.

مثال 4

اكتب برهاناً إحدائياً لأثبت أنه إذا كان الشكل الرباعي متوازي أضلاع فإن قطريه ينصف كل منهما الآخر.



الخطوة 1: أرسم متوازي الأضلاع في المستوى الإحداثي.

أرسم $ABCD$ في المستوى الإحداثي، وأحدد إحداثيات كل من رؤوسه، كما في الشكل المجاور.

أتعلم

بما أن صيغة نقطة المنتصف تتضمن قسمة مجموع الإحداثيين على 2، فمن الأسهل استعمال إحداثيات من مضاعفات العدد 2.

الخطوة 2: أحدد المُعطيات والمطلوب.

المُعطيات:

- إحداثيات رؤوس $\square ABCD$.
 - نقطة تقاطع \overline{AC} و \overline{BD} هي M .
- المطلوب:** إثبات أن M نقطة مُتَصِفِ \overline{AC} ، ونقطة مُتَصِفِ \overline{BD} أيضًا.

الخطوة 3: البرهان

- أجد مُتَصِفَ \overline{AC} باستعمال صيغة نقطة المُتَصِفِ.
$$\left(\frac{2a + 2b + 0}{2}, \frac{2c + 0}{2} \right) = (a + b, c)$$
- أجد مُتَصِفَ \overline{BD} باستعمال صيغة نقطة المُتَصِفِ.
$$\left(\frac{2a + 2b}{2}, \frac{2c + 0}{2} \right) = (a + b, c)$$
- بما أن لكلٍ من \overline{AC} و \overline{BD} نقطة المُتَصِفِ نفسها، ونقطة تقاطع \overline{AC} و \overline{BD} هي M ، فإن M نقطة مُتَصِفِ \overline{AC} ونقطة مُتَصِفِ \overline{BD} .

أتحقق من فهمي

اكتب برهاناً إحدائياً لأثبت أنه إذا كان في الشكل الرباعي ضلعان متوازيان ومتطابقان فإن الشكل الرباعي متوازي أضلاع.

تصنيف الأشكال الرباعية باستعمال الهندسة الإحداثية

تعلمت سابقاً أن كلاً من المُستطيل والمعين والمربع هو حالة خاصة من متوازي الأضلاع، ولكل شكل منها خصائص تميزه.

حالات خاصة من متوازي الأضلاع

مراجعة المفهوم


- المُستطيل متوازي أضلاع زواياه الأربع قوائم وقطراه متطابقان.
- المعين متوازي أضلاع أضلاعه متطابقة وقطراه متعامدان.
- المربع متوازي أضلاع أضلاعه متطابقة وزواياه الأربع قوائم وأقطاره متعامدة ومتطابقة.

أندكر

جميع خصائص متوازي الأضلاع والمُستطيل والمعين تنطبق على المربع.

أحدّد ما إذا كان $\square ABCD$ ، الذي إحداثيات رؤوسه $B(3, 4)$ ، $C(2, 0)$ ، $D(-2, -1)$ ، $A(-1, 3)$ ، مستطيلاً أو معيناً أو مربعاً.

الخطوة 1: أرسم متوازي الأضلاع في المستوى الإحداثي.



أرسم $\square ABCD$ في المستوى الإحداثي، كما في الشكل المجاور.

الخطوة 2: أحدّد المعطيات والمطلوب.

المعطيات: إحداثيات رؤوس $\square ABCD$.

المطلوب: إثبات أن $\square ABCD$ معين أو مستطيل أو مربع.

الخطوة 3: البرهان

إذا كان قُطرًا متوازي الأضلاع متطابقين فإنه مُستطيل، وإذا كانا متعامدين فإنه معين، وإذا كانا متطابقين ومتعامدين فإنه مُربع.

• أستعمل صيغة المسافة بين نقطتين للمقارنة بين طولي القطرين \overline{AC} و \overline{BD} .

$$AC = \sqrt{(2 - (-1))^2 + (0 - 3)^2} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$$

$$BD = \sqrt{((-2) - 3)^2 + ((-1) - 4)^2} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$$

بما أن $3\sqrt{2} \neq 5\sqrt{2}$ فإن القطرين ليسا متطابقين؛ لذا $\square ABCD$ ليس مُستطيلًا ولا مُربعًا.

• أستعمل صيغة الميل لتحديد ما إذا كان القطران متعامدين.

ميل \overline{BD}

$$m = \frac{(-1) - 4}{(-2) - 3} = \frac{-5}{-5} = 1$$

ميل \overline{AC}

$$m = \frac{0 - 3}{2 - (-1)} = \frac{-3}{3} = -1$$

بما أن حاصل ضرب الميَلين يساوي -1 فإن القطرين متعامدان؛ لذا فإن $\square ABCD$ معين.

أتحقق من فهمي

أحدّد ما إذا كان $\square ABCD$ ، الذي إحداثيات رؤوسه $C(-2, -3)$ ، $D(-3, -1)$ ، $A(3, 2)$ ، $B(4, 0)$ ، مُستطيلاً أو معيناً أو مُربعاً.

أتعلّم


يظهر من التمثيل البياني لـ $\square ABCD$ أن زواياه ليست قوائم؛ لذا فإن التخمين الأولي أن الشكل معين وليس مُربعًا أو مُستطيلًا، ويبقى التحقق من صحة التخمين جبريًا.

أرسمُ كلاً من المَضَلَّعاتِ الآتية في المُستوى الإحداثيِّ، وأحدِّدُ إحداثياتِ رؤوسِ كلِّ منها:


- 1 المثلث قائم الزاوية RMN ، الذي طول MN فيه يساوي 3 وحدات، وطول MR يساوي 4 وحدات.
- 2 المربّع $ABCD$ ، الذي طول ضلعيه $3a$.
- 3 المثلث قائم الزاوية مُتطابق الضلعين JGF ، الذي طول كل من ساقيه p وحدة.
- 4 المثلث مُتطابق الأضلاع QWR ، الذي طول ضلعيه $4b$.

أجدُ الإحداثيات المجهولة في كلِّ من الأشكال الآتية:


7 مَرَبَعٌ




6 مَثَلَّثٌ




5 مَرَبَعٌ




10 مُسْتَطِيلٌ



9 مَعِينٌ




8 مُتَوَازِي أَضْلاعٌ




أكتبُ برهاناً إحداثياً لِأُثَبِتَ كلاً ممَّا يأتي:


- 11 إذا كانَ الشكلُ الرُّباعيُّ مُتَوَازِي أَضْلاعٍ فإنَّ أضْلاعَهُ المُتقَابِلَةَ مُتطابِقةٌ.
- 12 إذا كانَ كلُّ ضلْعينِ مُتقَابِلينِ في الشكلِ الرُّباعيِّ مُتطابِقينِ فإنَّهُ مُتَوَازِي أَضْلاعٍ.
- 13 العمودُ النازلُ من رَأْسِ المَثَلَّثِ المُتطابِقِ الضُّلعينِ إلى القَاعَةِ يُنصِّفُ القَاعَةَ.



14 أَسْتَعْمِلُ المَعْلُومَاتِ المُعْطَاةَ عَلى الشَّكْلِ المُجَاوِرِ، لِأُثَبِتَ بِاسْتِعْمَالِ البَرهَانِ الإِحدَائِيِّ أَنَّ $\Delta DEC \cong \Delta BOC$.



15 أَسْتَعْمِلُ المَعْلُومَاتِ المُعْطَاةَ عَلى الشَّكْلِ المُجَاوِرِ، لِأُثَبِتَ بِاسْتِعْمَالِ البَرهَانِ الإِحدَائِيِّ أَنَّ $\overline{EG} \cong \overline{FH}$.



16 فِي الشَّكْلِ المُجَاوِرِ، إِذَا كَانَ $\overline{PQ} \cong \overline{RQ}$ ، وَكَانَتْ M نَقْطَةً مُتَّصِفِ PQ وَ N نَقْطَةً مُتَّصِفِ RQ ، فَأُثَبِتَ بِاسْتِعْمَالِ البَرهَانِ الإِحدَائِيِّ أَنَّ $\overline{PN} \cong \overline{RM}$.


أَحَدِّدْ مَا إِذَا كَانَ $\square JKLM$ المُعْطَاةَ إِحدَائِيَّاتِ رُؤُوسِهِ فِي كَلِّ مِمَّا يَأْتِي، مَعِينًا أَوْ مُسْتَطِيلًا أَوْ مُرَبَّعًا:

17 $J(-4, 2), K(0, 3), L(1, -1), M(-3, -2)$

18 $J(-2, 7), K(7, 2), L(-2, -3), M(-11, 2)$

19 $J(5, 0), K(8, -11), L(-3, -14), M(-6, -3)$

20 $J(-1, 4), K(-3, 2), L(2, -3), M(4, -1)$



مهارات التفكير العليا

21 تَبْرِيرٌ: أَصْنَفُ ΔABC ، المَرْسُومَ فِي المُسْتَوَى الإِحدَائِيِّ المُجَاوِرِ، بِحَسَبِ أَضْلاعِهِ وَزَوَايَاهُ، وَأَبْرُرُ إِجَابَتِي.

22 أَكْتَشِفُ الخَطَأَ: تَقُولُ شَذَا إِنَّ الشَّكْلَ الرُّبَاعِيَّ $PQRS$ ، الَّذِي إِحدَائِيَّاتِ رُؤُوسِهِ $R(1, -5), S(-2, 1), P(0, 2), Q(3, -4)$ ، مُتَوَازِي أَضْلاعٍ وَليْسَ مُسْتَطِيلًا، وَتَقُولُ ضُحَى إِنَّهُ مُسْتَطِيلٌ. أَيُّ الإِجَابَتَيْنِ صَحِيحَةٌ؟ أَبْرُرُ إِجَابَتِي.

23 تَحَدِّدُ: مُتَوَازِي أَضْلاعٍ أَحَدُ رُؤُوسِهِ النِّقْطَةُ $(2, 4)$ وَالرَّأْسُ الأَخْرُ النِّقْطَةُ $(3, 1)$ وَنَقْطَةُ تَقَاطَعِ قُطْرَيْهِ $(0, 1)$. أَجِدْ بَقِيَّةَ رُؤُوسِهِ.

اختبار نهاية الوحدة

أختار رمز الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي:

1 المسافة بين النقطتين $A(-1, 4)$ و $B(-3, -2)$ هي:

- a) $\sqrt{26}$ b) $\sqrt{40}$
c) $\sqrt{20}$ d) $\sqrt{34}$

2 إحداثيًا نقطة منتصف \overline{CD} ؛ حيث $C(1, -2)$

و $D(-3, 6)$ ، هما:

- a) $(-1, 2)$ b) $(-1, 4)$
c) $(1.5, -0.5)$ d) $(-4.5, 1.5)$

3 إذا كانت $M(-2, -6)$ نقطة منتصف \overline{AB} ؛ حيث

$B(7, 4)$ ، فإن إحداثيي النقطة A هما:

- a) $(-11, 16)$ b) $(11, -16)$
c) $(11, 16)$ d) $(-11, -16)$

4 نقطة تقاطع قطريّ مُربّع طول ضلعيه s ورأساه $(0, 0)$

و (s, s) ، هي:

- a) (s, s) b) $(2s, 2s)$
c) $(\frac{s}{2}, \frac{s}{2})$ d) $(\frac{s}{2}, 0)$

5 إذا كانت $(0, 0)$ ، $(5, 3)$ ، $(3, 5)$ تمثل رؤوس متوازي

أضلاع، فإن النقطة التي تمثل الرأس الرابع لمتوازي الأضلاع هي:

- a) $(5, 0)$ b) $(3, 0)$
c) $(2, -2)$ d) $(2, 2)$


أجد المسافة بين كل نقطتين مما يأتي، مقربًا إجابتي لأقرب جزء من عشرة (إن لزم):

- 6 $A(2, 2)$ ، $B(6, 5)$ 7 $N(-3, 2)$ ، $M(9, 7)$
8 $P(1, 5)$ ، $T(7, -3)$ 9 $F(-6, -4)$ ، $J(9, 4)$

أجد إحداثيي نقطة منتصف \overline{AB} في كل من الحالات الآتية:

- 10 $A(8, 4)$ ، $B(12, 2)$
11 $A(9, 5)$ ، $B(8, -6)$
12 $A(-11, -4)$ ، $B(-9, -2)$


13 في الشكل الآتي، إذا كانت M نقطة منتصف \overline{RS} ، فأجد طول \overline{MR} .



14 أجد محيط شبه المُنحَرَفِ $JKLM$ ، المرسوم في المستوى الإحداثي المُجاور.

15 انطلق بلال من منزله إلى المدرسة مرورًا بمنزل

أشرف. أجد المسافة التي قطعها بلال من منزله إلى المدرسة، وأستعين بالمستوى الإحداثي أدناه.



أجدُ البعدَ بينَ النقطةِ والمستقيمِ في كلِّ ممَّا يأتي:

16 $y = -x + 2, P(8, 4)$

17 $x - 3y + 9 = 0, Q(-13, 6)$


18 $y - 4x = 7, B(-13, 6)$

19 $y - 1 = 5x, S(3, 3)$

20 $y + 2x + 15 = 0, M(-1, -4)$

21 $2x + y + 5 = 0, N(0, 0)$

22 أجدُ مساحةَ المثلثِ المرسومِ في المستوى الإحداثيِّ المُجاورِ، وأبرِّرُ إجابتي.



أجدُ البعدَ بينَ كلِّ مستقيمينِ متوازيينِ في ما يأتي:

23 $x + 2y - 3 = 0$


24 $9x + 12y + 10 = 0$

$x + 2y + 4 = 0$


$9x + 12y - 20 = 0$

أجدُ الإحداثياتِ المجهولةَ في كلِّ من الأشكالِ الآتية:


26 مثلث



25 متوازي أضلاع



27 شبه منحرف




أحددُ ما إذا كان $JKLM$ □، المُعطاة إحداثيات رؤوسه في كلِّ ممَّا يأتي، معيَّنًا أو مُستطيلًا أو مُربَّعًا:


28 $J(5, 2), K(1, 9), L(-3, 2), M(1, -5)$

29 $J(5, 2), K(2, 5), L(-1, 2), M(2, -1)$

30 في الشكلِ الآتي، إذا كان $MNPO$ مُستطيلًا، وكانت T, W, V, U نقاطُ مُتَّصِفِ أضلَاعِهِ، فأثبتُ باستعمالِ البرهانِ الإحداثيِّ أنَّ $TWVU$ معيَّن.




تدريب على الاختبارات الدولية



31 يبيِّنُ الشكلُ المُجاورُ النقطتين M و N . أيُّ ممَّا يأتي يمكنُ أن يكونَ إحداثيَّ النقطةِ P ، بحيثُ يكونُ المثلثُ MPN متطابقَ الضلعينِ؟

- a) (3, 5) b) (3, 2) c) (1, 5) d) (5, 1)



32 أيُّ النقاطِ الآتية تقعُ في مُتَّصِفِ المسافةِ بينَ النقطتين P و Q ، المُمثلتين في المستوى الإحداثيِّ المُجاورِ؟

- a) (7, 8) b) (4, 4)
c) (3, 5) d) (2, 2)