

إجابات تدريبات الدرس

التكامل المحدود - إجابات دليل المعلم

تدريب ١

إذا كان ق اقتراناً متصلًا، ق (١) = ٤ ، ق (٢) = ١٢ ، \int_1^2 أق (س) دس = ١٦
 فجد قيمة الثابت أ .

الحل
 أ = ٢

تدريب ٢

احسب قيمة كل من التكاملين الآتيين:

$$\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \text{قاس دس} (٢)$$

$$\int_1^7 \text{س دس} (١)$$

الحل
 ٩٠ (١)

$$\int_1^2 \frac{1}{3\sqrt{x}} (٢)$$

$$\frac{1}{3\sqrt{x}}$$

تدريب ٣

إذا كان $\int_{b+1}^{b+2} \text{س دس} = ٤٠$ ، فجد قيمة الثابت ب .

الحل
 $\frac{7}{2} = \text{ب}$

تدريب ٤

إذا كان $\int_{\sqrt[3]{2}}^{\sqrt[3]{8}} \frac{\text{س}}{1+\sqrt[3]{\text{س}}} \text{دس} = ٢$ ، فجد $\int_{\sqrt[3]{2}}^{\sqrt[3]{8}} \frac{\text{س}}{1+\sqrt[3]{\text{س}}} \text{دس}$

الحل
 ٢-

تدريب ٥

$$\text{إذا كان } \begin{cases} 3 \cos(s) = 9 \\ 4 \cos(s) + 7 \sin(s) = 19 \end{cases}$$

فاحسب قيمة $\begin{cases} 5 \sin(s) \end{cases}$ منهاجي

الحل

٥ -

تدريب ٦

$$\text{إذا كان } \begin{cases} \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) \\ \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \end{cases} \text{ فما قيمة } (L + E) ?$$

الحل

$\frac{\pi}{2}$ منهاجي

تدريب ٧

$$\text{إذا كان } \begin{cases} 2 \cos(s) + 3 \sin(s) = 17 \\ \frac{\cos(s)}{3} = 2 - \sin(s) \end{cases}$$

فجد $\begin{cases} 4 \cos(s) - 1 \end{cases}$ منهاجي

الحل

١٢

تدريب ٨


منهاجي

$$\text{جد } \begin{cases} \sqrt{\frac{1 - \cos\left(\frac{\pi}{2}\right)}{2}} \end{cases}$$

الحل

٤

تدريب ٩




اعتماداً على الشكل (٤-٤) الذي يمثل منحنى الاقتران ق المتصل على الفترة [٠، ٦] أجب عن كل مما يأتي :

- ما إشارة $\left. \begin{array}{l} \text{ق (س) و س} \\ \text{س و ق (س)} \end{array} \right\}$ ، لماذا؟
- ما إشارة $\left. \begin{array}{l} \text{ق (س) و س} \\ \text{س و ق (س)} \end{array} \right\}$ ، لماذا؟

الحل

(١) موجبة (٢) سالبة

تدريب ١٠



اعتماداً على الشكل (٤-٦) الذي يمثل منحنىي الاقترانين ق، هـ قارن بين قيمتي التكامل في كل مما يأتي؛ مبرراً إجابتك :

منهاجي

(١) $\int_0^1 \text{ق (س) و س} \int_0^1 \text{هـ (س) و س}$

(٢) $\int_{-1}^0 \text{ق (س) و س} \int_{-1}^0 \text{هـ (س) و س}$

الحل

منهاجي

(١) $\int_0^1 \text{ق (س) و س} \leq \int_0^1 \text{هـ (س) و س}$

(٢) $\int_{-1}^0 \text{ق (س) و س} \geq \int_{-1}^0 \text{هـ (س) و س}$

تدريب ١١

إذا علمت أن $m \geq \left| \frac{s}{s+1} \right|$ ، فجد أكبر قيمة ممكنة للثابت m ، وأصغر قيمة ممكنة للثابت k تحقق المتباينة دون حساب قيمة $\left| \frac{s}{s+1} \right|$ و s .

الحل

منهاجي 

$$1 \geq s \geq 0$$

$$1 \geq s^2 \geq 0$$

$$2 \geq 1 + s^2 \geq 1$$

منهاجي 

$$\frac{1}{2} \leq \frac{1}{1 + s^2} \leq 1$$

$$\frac{2}{2} \leq \frac{2}{1 + s^2} \leq 2$$

منهاجي 

$$2 \geq \frac{2}{1 + s^2} \geq 1$$

$$\left| \frac{s}{s+1} \right| \geq 1 \text{ و } \left| \frac{s}{s+1} \right| \geq \frac{2}{1 + s^2}$$

$m = 1, k = 2$