

## أتحقق من فهمي

### الضرب القياسي

#### الضرب القياسي للمتجهات في الفضاء

أتحقق من فهمي صفحة (144):

أجد ناتج الضرب القياسي للمتجهين في كل مما يأتي:

$$(a) \quad \vec{v} = \langle 4, 8, -3 \rangle, \vec{w} = \langle -3, 7, 2 \rangle$$

$$\vec{v} \cdot \vec{w} = 4(-3) + 8(7) - 3(2) = -12 + 56 - 6 = 38$$

$$(b) \quad \vec{m} = -3\hat{i} + 5\hat{j} - \hat{k}, \vec{n} = -12\hat{i} + 6\hat{j} - 8\hat{k}$$

$$\vec{m} \cdot \vec{n} = -3(-12) + 5(6) - 1(-8) = 36 + 30 + 8 = 74$$

#### الزاوية بين متجهين في الفضاء

أتحقق من فهمي صفحة (146):

أجد قياس الزاوية  $\theta$  بين المتجه  $\vec{u}$  والمتجه  $\vec{w}$  في كل مما يأتي، مقرباً الناتج إلى أقرب عشر درجة:

$$(a) \quad \vec{u} = -3\hat{i} + 5\hat{j} - 4\hat{k}, \vec{w} = 4\hat{i} + 2\hat{j} - 3\hat{k}$$

$$\vec{u} \cdot \vec{w} = -3(4) + 5(2) - 4(-3) = -12 + 10 + 12 = 10$$

$$|\vec{u}| = \sqrt{9 + 25 + 16} = 50 \quad |\vec{w}| = \sqrt{16 + 4 + 9} = 29$$

$$\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{w}}{|\vec{u}| |\vec{w}|} = \frac{10}{50 \times 29} = \frac{1}{145} \approx 0.0069$$

$$\theta = \cos^{-1}(0.0069) \approx 89.8^\circ$$

$$(b) \quad \vec{u} = \langle 2, -10, 6 \rangle, \vec{w} = \langle -3, 15, -9 \rangle$$

$$\vec{u} \cdot \vec{w} = 2(-3) - 10(15) + 6(9) = -6 - 150 + 54 = -102$$

$$|\vec{u}| = \sqrt{4 + 100 + 36} = 110 \quad |\vec{w}| = \sqrt{9 + 225 + 81} = 150$$

$$\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{w}}{|\vec{u}| |\vec{w}|} = \frac{-102}{110 \times 150} = \frac{-17}{275} \approx -0.0618$$

$$\theta = \cos^{-1}(-0.0618) \approx 93.5^\circ$$

#### الزاوية بين مستقيمين في الفضاء

أتحقق من فهمي صفحة (147):

إذا كانت:  $r \rightarrow = (3-21) + t(2-5-1)$  معادلة متجهة للمستقيم  $l_1$ ، وكانت:  $r \rightarrow = (530) + u(10-3)$  معادلة متجهة للمستقيم  $l_2$ ، فأجد قياس الزاوية الحادة بين المستقيم  $l_1$  والمستقيم  $l_2$  إلى أقرب درجة.

اتجاه المستقيم  $l_1$  هو  $v \rightarrow = (2, -5, -1)$  واتجاه المستقيم  $l_2$  هو  $u \rightarrow = (1, 0, -3)$

$$|v \rightarrow| = \sqrt{4+25+1} = 30 \quad |u \rightarrow| = \sqrt{1+0+9} = 10 \quad v \rightarrow \cdot u \rightarrow = 1(2) + 0(-5) - 3(-1) = 2 + 3 = 5$$

$$\cos \theta = \frac{v \rightarrow \cdot u \rightarrow}{|v \rightarrow| |u \rightarrow|} = \frac{5}{30 \times 10} = \frac{1}{60} \approx 0.0167 \Rightarrow \theta = \cos^{-1}(0.0167) \approx 89.03^\circ$$

إذن، قياس الزاوية الحادة بين المستقيمين  $l_1, l_2$  هو  $89.03^\circ$  تقريباً.

إيجاد مساحة المثلث باستعمال المتجهات

أتحقق من فهمي صفحة (149):

أجد مساحة المثلث EFG الذي إحداثيات رؤوسه هي:

$$E(2, 1, -1), F(5, 1, 7), G(6, -3, 1)$$

$$GF \rightarrow = (-1, 4, 6) \quad |GF \rightarrow| = \sqrt{1+16+36} = 53 \quad GE \rightarrow = (-4, 4, -2) \quad |GE \rightarrow| = \sqrt{16+16+4} = 6$$

$$GF \rightarrow \cdot GE \rightarrow = -1(-4) + 4(4) + 6(-2) = 4 + 16 - 12 = 8$$

ليكن قياس الزاوية EGF هو  $\theta$ ، إذن:

$$\cos \theta = \frac{GF \rightarrow \cdot GE \rightarrow}{|GF \rightarrow| |GE \rightarrow|} = \frac{8}{53 \times 6} = \frac{4}{159} \approx 0.0252 \Rightarrow \theta = \cos^{-1}(0.0252) \approx 89.4^\circ$$

$$\sin \theta = \sqrt{1 - \cos^2 \theta} = \sqrt{1 - (0.0252)^2} \approx 0.9997 \Rightarrow \theta \approx 89.4^\circ$$

ويمكن إيجاد  $\theta \sin$  من معرفتنا بقيمة  $\theta \cos$  من دون إيجاد زاوية  $\theta$  كما يأتي:

$$\theta = 1 - (4353)^2 = 477 - 16477 = 461353 \Rightarrow A = 12 \times 653 \times 4\theta = 4353 \Rightarrow \sin \theta = \frac{461353}{61353} = 461 \approx 21.5$$

مسقط العمود على مستقيم من نقطة خارجه

أتحقق من فهمي صفحة (151):

إذا كانت:  $\vec{r} = 16\hat{i} + 11\hat{j} - 3\hat{k} + t(5\hat{i} + 7\hat{j} - 3\hat{k})$  معادلة متجهة للمستقيم  
، والنقطة  $P(2, 0, 103)$  غير واقعة على المستقيم ، فأجيب عن السؤالين الآتيين:  
(a) أحدد مسقط العمود من النقطة  $P$  على المستقيم .

اتجاه المستقيم  $\vec{v} = (5, 7, -3)$  المعطى هو:

افرض أن مسقط النقطة  $P$  على النقطة  $F$ ، فيكون متجه موقعها هو:

$$\vec{OF} = (16 + 5t)\hat{i} + (11 + 7t)\hat{j} - (3 + 3t)\hat{k}$$

ويكون العمود من  $P$  على  $F$  هو  $\vec{PF}$  حيث:

$$\vec{PF} = \vec{OF} - \vec{OP} = (16 + 5t)\hat{i} + (11 + 7t)\hat{j} - (3 + 3t)\hat{k} - (2\hat{i} + 103\hat{k}) = \\ \vec{PF} = (14 + 5t)\hat{i} + (11 + 7t)\hat{j} - (193 + 3t)\hat{k}$$

ولأن المتجهين  $\vec{PF}$ ،  $\vec{v}$  متعامدان فإن  $\vec{PF} \cdot \vec{v} = 0$

$$14 + 5t + 7(11 + 7t) - 3(-193 - 3t) = 0 \Rightarrow t = -2 \Rightarrow \vec{OF} = (16 + 5(-2))\hat{i} + 5\hat{j} - \\ (3 + 3(-2))\hat{k} = 6\hat{i} - 3\hat{j} + 3\hat{k}$$

إذن مسقط العمود من النقطة  $P$  على المستقيم  $F$  هو النقطة  $F(6, -3, 3)$

(b) أجد البعد بين النقطة  $P$  والمستقيم .

$$PF = (6 - 2)^2 + (-3 - 0)^2 + (3 - 103)^2 = 2263$$

استعمال المتجهات لتحديد قياسات في أشكال ثلاثية الأبعاد

أتحقق من فهمي صفحة (154):

(a) أجد قياس  $\angle EDB$  في الهرم المبين في المثال السابق.

$$\vec{DE} = (7, 8, 2) \quad |\vec{DE}| = \sqrt{49 + 64 + 4} = 117 \quad \vec{DB} = (8, 4, -8) \quad |\vec{DB}| = \sqrt{64 + 16 + 64} = 12 \\ \vec{DE} \cdot \vec{DB} = 7(8) + 8(4) + 2(-8) = 68 \\ \cos^{-1} \left( \frac{68}{117 \cdot 12} \right) = \cos^{-1} \left( \frac{68}{1404} \right) = \cos^{-1} \left( \frac{17}{351} \right) \approx 89.3^\circ$$

(b) أجد حجم الهرم.

$$AB = 8^2 + (-2)^2 + (-2)^2 = 72$$

ارتفاع الهرم هو طول العمود المرسوم من الرأس E إلى قاعدته وهو EM،  
حيث M هي نقطة منتصف أحد قطري القاعدة  
المربعة:  $(M=(1+9,1-7,1+3))=(5,-3,1)$

$$EM=(-3)^2+(-6)^2+(-6)^2=9$$

حجم الهرم يساوي ثلث مساحة قاعدته في ارتفاعه.

$$V=\frac{1}{3}(7^2)(9)=7^2(3)=216$$

إذن، حجم الهرم يساوي 216 وحدة مربعة.