



المركز الوطني
لتطوير المناهج
National Center
for Curriculum
Development

الرياضيات

الصف الثاني عشر - المسار الأكاديمي

الفصل الدراسي الأول

12

إجابات كتاب الطالب

الناشر: المركز الوطني لتطوير المناهج

يسر المركز الوطني لتطوير المناهج استقبال آرائكم وملحوظاتكم على هذا الكتاب عن طريق العنوانين الآتية:

📞 06-5376262 / 237 📎 06-5376266 📩 P.O.Box: 2088 Amman 11941

🌐 @nccdjor 📧 feedback@nccd.gov.jo 🌐 www.nccd.gov.jo



إجابات كتاب الطالب الصف الثاني عشر - المسار الأكاديمي - فـ ١
الوحدة الأولى: الاقترانات والمقادير الجبرية

الدرس الأول: نظرتنا الباقى والعوامل

أتحقق من فهمي صفحة 10

a	x	x^2	$+5x$	-14	
	x	x^3	$+5x^2$	$-14x$	0
	+1	$+x^2$	$+5x$	-14	

ناتج القسمة هو $x^2 + 5x - 14$ ، والباقي 0

b	x	$2x^2$	$+5x$	$+15$	
	x	$2x^3$	$+5x^2$	$+15x$	+48
	-3	$-6x^2$	$-15x$	-45	

ناتج القسمة هو $15 + 2x^2 + 5x$ ، والباقي 48

أتحقق من فهمي صفحة 13

a	$P(x) = 4x^4 - 7x^3 + 5x^2 + 2$, $h(x) = x - 1$
	$P(1) = 4(1)^4 - 7(1)^3 + 5(1)^2 + 2 = 4$	إذن، باقي قسمة $P(x)$ على $(x - 1)$ يساوي 4
b	$P(x) = 3x^3 + 8x^2 - 3x - 6$, $h(x) = x + 3$
	$P(1) = 3(-3)^3 + 8(-3)^2 - 3(-3) - 6 = -6$	إذن، باقي قسمة $P(x)$ على $(x + 3)$ يساوي -6
c	$P(x) = -2x^3 - 5x^2 + 10x + 9$, $h(x) = 2x + 8$
	$P(1) = -2(-4)^3 - 5(-4)^2 + 10(-4) + 9 = 17$	إذن، باقي قسمة $P(x)$ على $(2x + 8)$ يساوي 17

أتحقق من فهمي صفحة 14

a	$P(x) = x^3 - 2x^2 - 13x - 10$	
	$P(5) = (5)^3 - 2(5)^2 - 13(5) - 10 = 0$	إذن، $(x - 5)$ عامل من عوامل $(P(x))$





تحليل $P(x)$ على $(x - 5)$

b

\times	x^2	$+3x$	$+2$	
x	x^3	$+3x^2$	$+2x$	0
-5	$-5x^2$	$-15x$	-10	

$$\begin{aligned} P(x) &= (x - 5)(x^2 + 3x + 2) \\ &= (x - 5)(x + 2)(x + 1) \end{aligned}$$

أتحقق من فهمي صفحة 17

$$P(x) = 5x^3 - x^2 - 5x + 1$$

عوامل الحد الثابت هي ± 1 ، وعوامل المعامل الرئيس هي $\pm 1, \pm 5$

الأصفار النسبية المحتملة للاقتران $P(x)$ هي: $\pm 1, \pm \frac{1}{5}$

$$P(1) = 5 - 1 - 5 + 1 = 0$$

إذن، $(x-1)$ هو أحد عوامل $P(x)$

أجد العوامل الأخرى بالقسمة وتحليل الناتج إن أمكن.

\times	$5x^2$	$+4x$	-1	
x	$5x^3$	$+4x^2$	$-x$	0
-1	$-5x^2$	$-4x$	+1	

$$\begin{aligned} P(x) &= (x - 1)(5x^2 + 4x - 1) \\ &= (x - 1)(5x - 1)(x + 1) \end{aligned}$$

إذن، أصفار $P(x)$ هي: $1, -\frac{1}{5}, 1$



$$Q(x) = x^4 + 6x^3 + 7x^2 - 6x - 8$$

معامل الحد الرئيس يساوي 1، فالأصفار المحتملة هي عوامل الحد الثابت، وهي: $\pm 1, \pm 2, \pm 4, \pm 8$

$$Q(1) = 1 + 6 + 7 - 6 - 8 = 0$$

بالتعميّص نجد أن $(x - 1)$ هو أحد عوامل $Q(x)$.
أجد العوامل الأخرى بالقسمة وتحليل الناتج إن أمكن.

\times	x^3	$+7x^2$	$+14x$	$+8$	
x	x^4	$+7x^3$	$+14x^2$	$+8x$	0
-1	$-x^3$	$-7x^2$	$-14x$	-8	

b

$$Q(x) = (x - 1)(x^3 + 7x^2 + 14x + 8)$$

وبالتعميّص $(x + 1)$ في العامل التكعبي نجد أن الناتج 0 ، نقسم $x^3 + 7x^2 + 14x + 8$ على $x + 1$

\times	x^2	$+6x$	8	
x	x^3	$+6x^2$	$+8x$	0
+1	$+x^2$	$+6x$	+8	

$$\begin{aligned} Q(x) &= (x - 1)(x + 1)(x^2 + 6x + 8) \\ &= (x - 1)(x + 1)(x + 2)(x + 4) \end{aligned}$$

نجد أن:

إذن، أصفار $Q(x)$ هي: $-1, 1, -2, -4$

أتحقق من فهمي صفحة 19

$$x^3 - x^2 - 9x + 9 = 0$$

$$x^2(x - 1) - 9(x - 1) = 0$$

$$(x - 1)(x^2 - 9) = 0$$

$$(x - 1)(x - 3)(x + 3) = 0$$

$$x = 1, x = 3, x = -3$$

a

إذن، حلول هذه المعادلة هي: $1, 3, -3$



$$x^3 + 3x^2 - 4 = 0$$

الأصفار النسبية المحتملة هي: $\pm 1, \pm 2, \pm 4$

بتعمير $x = 1$ نجد: $1 + 3 - 4 = 0$

إذن، $x - 1$ عامل من عوامل كثير الحدود $x^3 + 3x^2 - 4$

b

\times	x^2	$+4x$	$+4$	
x	$+x^3$	$+4x^2$	$+4x$	0
-1	$-x^2$	$-4x$	-4	

$$x^3 + 3x^2 - 4 = 0 \Rightarrow (x - 1)(x^2 + 4x + 4) = 0$$

$$\Rightarrow (x - 1)(x + 2)^2 = 0$$

$$\Rightarrow x = 1, x = -2$$

حلول هذه المعادلة هي $x = 1, x = -2$

أتحقق من فهمي صفحة 20

ليكن طول نصف قطر قاعدة هذه الاسطوانة هو r وارتفاعها h وحجمها V .

$$h = r + 5$$

$$V = \pi r^2 h = \pi r^2 (r + 5)$$

$$\Rightarrow \pi r^2 (r + 5) = 72\pi$$

$$\Rightarrow r^3 + 5r^2 - 72 = 0$$

الأصفار النسبية المحتملة هي: $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 6, \pm 8, \pm 9, \pm 12, \pm 18, \pm 24, \pm 36, \pm 72$

بتعمير $r = 3$ نجد: $27 + 45 - 72 = 0$

إذن، $x - 3$ عامل من عوامل كثير الحدود $r^3 + 5r^2 - 72$

\times	r^2	$+8r$	$+24$	
r	r^3	$+8r^2$	$+24r$	0
-3	$-3r^2$	$-24r$	-72	

$$r^3 + 5r^2 - 72 = 0 \Rightarrow (r - 3)(r^2 + 8r + 24) = 0$$

$$\Rightarrow r = 3$$

مميز $r^2 + 8r + 24$ سالب، إذن:

نصف قطر قاعدة الاسطوانة 3 cm ، وارتفاعها 8 cm

أتدرب وأحل المسائل صفحة 21



1

\times	$2x^3$	$+x^2$	$+4x$	$+3$	
$3x$	$6x^4$	$+3x^3$	$+12x^2$	$+9x$	0
-4	$-8x^3$	$-4x^2$	$-16x$	-12	

الناتج: $2x^3 + x^2 + 4x + 3$

الباقي: 0

2

\times	$-x^4$	$+2x^3$	$+x^2$	$-4x$	$+3$	
$-2x$	$2x^5$	$-4x^4$	$-2x^3$	$+8x^2$	$-6x$	12
+1	$-x^4$	$+2x^3$	$+x^2$	$-4x$	$+3$	

الناتج: $-x^4 + 2x^3 + x^2 - 4x + 3$

الباقي: 12

3

$$f(-1) = 8 - 2 - 53 - 37 - 6 = -90$$

4

$$f\left(-\frac{4}{3}\right) = 4\left(-\frac{4}{3}\right)^3 + 2\left(-\frac{4}{3}\right)^2 - 6\left(-\frac{4}{3}\right) - 8 = -\frac{160}{27}$$

5

$$f(-7) = (-7)^3 - 37(-7) + 84 = 0$$

إذن، $(x + 7)$ عامل من عوامل $f(x)$.

6

$$f\left(\frac{3}{2}\right) = 2\left(\frac{3}{2}\right)^3 - 5\left(\frac{3}{2}\right)^2 - \left(\frac{3}{2}\right) + 6 = 0$$

إذن، $(2x - 3)$ عامل من عوامل $f(x)$.



$$f(x) = x^3 + 3x^2 - 13x - 15$$

عوامل الحد الثابت هي: $\pm 1, \pm 3, \pm 5, \pm 15$

$$f(-1) = -1 + 3 + 13 - 15 = 0 \Rightarrow \text{عامل } (x + 1)$$

7

\times	x^2	$2x$	-15	
x	x^3	$2x^2$	-15x	0
1	x^2	2x	-15	

$$f(x) = (x + 1)(x^2 + 2x - 15)$$

$$f(x) = (x + 1)(x - 3)(x + 5)$$

$$g(x) = x^4 - 7x^3 + 13x^2 + 3x - 18$$

عوامل الحد الثابت هي: $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6, \pm 9, \pm 18$

$$g(2) = 16 - 56 + 52 + 6 - 18 = 0 \Rightarrow \text{عامل } (x - 2)$$

8

\times	x^3	$-5x^2$	$3x$	9
x	x^4	$-5x^3$	$3x^2$	+9x
-2	$-2x^3$	$10x^2$	-6x	-18

$$g(x) = (x - 2)(x^3 - 5x^2 + 3x + 9)$$

عوامل الحد الثابت هي: $\pm 1, \pm 3, \pm 9$

$$(-1)^3 - 5(-1)^2 + 3(-1) + 9 = 0 \Rightarrow \text{عامل } (x + 1)$$

\times	x^2	-6x	9	
x	x^3	$-6x^2$	9x	0
1	x^2	-6x	9	

$$g(x) = (x - 2)(x + 1)(x^2 - 6x + 9)$$

$$g(x) = (x - 2)(x + 1)(x - 3)^2$$



$$h(x) = 2x^3 - 13x^2 + 17x + 12$$

عوامل الحد الثابت هي: $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 6, \pm 12$

$$h(3) = 54 - 117 + 51 + 12 = 0 \Rightarrow \text{عامل } (x - 3)$$

9

\times	$2x^2$	$-7x$	-4	
x	$2x^3$	$-7x^2$	$-4x$	0
-3	$-6x^2$	$21x$	12	

$$h(x) = (x - 3)(2x^2 - 7x - 4)$$

$$h(x) = (x - 3)(x - 4)(2x + 1)$$

10

$$q(x) = 3x^3 - 18x^2 + 2x - 12$$

$$= 3x^2(x - 6) + 2(x - 6)$$

$$= (3x^2 + 2)(x - 6)$$

$$x^3 - 4x^2 - 7x + 10 = 0$$

عوامل الحد الثابت هي: $\pm 1, \pm 2, \pm 5, \pm 10$

$$1 - 4 - 7 + 10 = 0 \Rightarrow \text{عامل } (x - 1)$$

11

\times	x^2	$-3x$	-10	
x	x^3	$-3x^2$	$-10x$	0
-1	$-x^2$	$3x$	10	

$$(x - 1)(x^2 - 3x - 10) = 0$$

$$(x - 1)(x - 5)(x + 2) = 0$$

$$x = 1, x = 5, x = -2$$



$$5x^3 - 15x^2 - 47x - 15 = 2x^3 - 10x^2$$

$$3x^3 - 5x^2 - 47x - 15 = 0$$

عوامل الحد الثابت هي: $\pm 1, \pm 3, \pm 5, \pm 15$

$$-81 - 45 + 141 - 15 = 0 \Rightarrow \text{عامل } (x + 3)$$

12

x	$3x^2$	$-14x$	-5	
x	$3x^3$	$-14x^2$	$-5x$	0
3	$9x^2$	$-42x$	-15	

$$(x + 3)(3x^2 - 14x - 5) = 0$$

$$(x + 3)(3x + 1)(x - 5) = 0$$

$$x = -3, x = -\frac{1}{3}, x = 5$$

$$3x^3 + 3x^2 - 14x - 8 = 0$$

عوامل الحد الثابت هي: $\pm 1, \pm 2, \pm 4, \pm 8$

$$24 + 12 - 28 - 8 = 0 \Rightarrow \text{عامل } (x - 2)$$

13

x	$3x^2$	$9x$	4	
x	$3x^3$	$9x^2$	$4x$	0
-2	$-6x^2$	$-18x$	-8	

$$(x - 2)(3x^2 + 9x + 4) = 0$$

$$x = 2, \quad x = \frac{-9 \pm \sqrt{81 - 48}}{2(3)}$$

$$x = 2, x = \frac{-9 + \sqrt{33}}{6}, x = \frac{-9 - \sqrt{33}}{6}$$



$$6x^3 - 13x^2 + x + 2 = 0$$

عوامل الحد الثابت هي: $\pm 1, \pm 2$

$$48 - 52 + 2 + 2 = 0 \Rightarrow \text{عامل } (x - 2)$$

14

x	$6x^2$	$-x$	-1	
x	$6x^3$	$-x^2$	$-x$	0
-2	$-12x^2$	$2x$	2	

$$(x - 2)(6x^2 - x - 1) = 0$$

$$(x - 2)(3x + 1)(2x - 1) = 0$$

$$x = 2, x = -\frac{1}{3}, x = \frac{1}{2}$$

$$f(x) = 4x^3 - 20x + 16$$

أحد أصفار الاقتران هو $x = 1$, إذن, $(x - 1)$ عامل من عوامل $f(x)$

x	$4x^2$	$4x$	-16	
x	$4x^3$	$4x^2$	$-16x$	0
-1	$-4x^2$	$-4x$	16	

15

$$f(x) = (x - 1)(4x^2 + 4x - 16)$$

$$4x^2 + 4x - 16 = 0$$

صفراء الآخرين هما جذرا المعادلة

$$x^2 + x - 4 = 0$$

$$x = \frac{-1 \pm \sqrt{1+16}}{2}$$

$$x \approx 1.56, x \approx -2.56$$



$$f(x) = 4x^3 - 12x^2 - x + 15$$

أحد أصفار الاقتران هو $-1 = x$ ، إذن، $(x + 1)$ عامل من عوامل $f(x)$

\times	$4x^2$	$-16x$	15
x	$4x^3$	$-16x^2$	$15x$
1	$4x^2$	$-16x$	15

16

$$f(x) = (x + 1)(4x^2 - 16x + 15)$$

$$4x^2 - 16x + 15 = 0$$

صفراء الآخرين هما جذرا المعادلة

$$(2x - 3)(2x - 5) = 0$$

$$x = 1.5, x = 2.5$$

$$x^3 - 3x^2 + ax + b = 0$$

نفرض أن الحل الثالث هو $c = x$

ف تكون $(x - c), (x - 4), (x - 1)$ عوامل للمقدار

$$x^3 - 3x^2 + ax + b = (x - 1)(x - 4)(x - c)$$

$$x^3 - 3x^2 + ax + b = (x^2 - 5x + 4)(x - c)$$

17

$$x^3 - 3x^2 + ax + b = x^3 - cx^2 - 5x^2 + 5cx + 4x - 4c$$

$$x^3 - 3x^2 + ax + b = x^3 - (c + 5)x^2 + (4 + 5c)x - 4c$$

بمقارنة معاملات الحدود المتشابهة في الطرفين نجد أن:

$$\text{معامل } x^2 : -3 = -(c + 5) \Rightarrow c = -2$$

$$c + 5 = 3 \Rightarrow c = -2$$

إذن، الحل الثالث هو $x = -2$

هذا يعني أن $f(1) = 2f(-1)$

18

$$1 + a + 1 + 5 = 2(-1 + a - 1 + 5)$$

$$a + 7 = 2a + 6$$

$$a = 1$$



حجم الهرم = ثلث مساحة قاعدته مضروبة في ارتفاعه،

افرض أن طول ضلع القاعدة هو x ، فيكون الارتفاع $1 + x$

$$V = \frac{1}{3}x^2(x + 1)$$

$$4 = \frac{1}{3}x^2(x + 1)$$

$$12 = x^3 + x^2$$

$$x^3 + x^2 - 12 = 0$$

$$(2)^3 + (2)^2 - 12 = 0 \Rightarrow (x - 2)$$

عامل $(x - 2)$

x	x^2	$3x$	6	
x	x^3	$3x^2$	$6x$	0
-2	$-2x^2$	$-6x$	-12	

$$(x - 2)(x^2 + 3x + 6) = 0$$

$$x - 2 = 0, x^2 + 3x + 6 = 0$$

المعادلة $x^2 + 3x + 6 = 0$ ليس لها حل لأن مميزها سالب (-15)،

فالحل الوحيد للمعادلة $x^3 + x^2 - 12 = 0$ هو $x = 2$

إذن، طول ضلع قاعدة المنشوطة هو 2 m، وارتفاعها 3 m

$$f(x) = ax^3 + bx^2 - 9x - 9 = 0$$

إذن، $f(3) = 0$

20

$$27a + 9b - 27 - 9 = 0$$

$$27a + 9b = 36$$

بقسمة الطرفين على 9 ينتج أن: $3a + b = 4$



باقي قسمة $f(x)$ على $(x - 2)$ يساوي 15، يعني أن -15

$$8a + 4b - 18 - 9 = -15$$

$$8a + 4b = 12$$

بقسمة الطرفين على 4 ينتج أن: $2a + b = 3$

21

طرح المعادلة الناتجة في السؤال 21 من المعادلة الناتجة في السؤال 20 نجد أن $a = 1$

ويعوض قيمة a في إحدى المعادلتين نجد أن $b = 1$

22

حجم الصندوق يساوي $48 m^3$ ، وهذا يساوي $2(x)(x^2 + 6x - 19)$

$$2(x)(x^2 + 6x - 19) = 48$$

بقسمة الطرفين على 2، والتوزيع ينتج أن:

$$x^3 + 6x^2 - 19x = 24$$

$$x^3 + 6x^2 - 19x - 24 = 0$$

$$(-3)^3 + 6(-3)^2 - 19(-3) - 24 = 0 \Rightarrow (x - 3)$$

23

x	x^2	$9x$	8	
x	x^3	$9x^2$	$8x$	0
-3	$-3x^2$	$-27x$	-24	

$$(x - 3)(x^2 + 9x + 8) = 0$$

$$(x - 3)(x + 1)(x + 8) = 0$$

$$x = 3, x = -1, x = -8$$

الحلان السالبان مرفوضان لأن x أحد أبعاد الصندوق ولا يمكن أن يكون سالباً.

إذن، قيمة x التي تجعل حجم الصندوق $48 m^3$ هي $3 m$



الدرس الثاني: الكسور الجزئية

اتحقق من فهمي صفحة 26

	$\frac{x}{x^2 - 5x + 6} = \frac{x}{(x-3)(x-2)}$ $= \frac{A}{(x-3)} + \frac{B}{(x-2)}$ $x = A(x-2) + B(x-3)$ <p>a</p> $x = 3 \Rightarrow 3 = A(3-2) + B(3-3) \Rightarrow A = 3$ $x = 2 \Rightarrow 2 = A(2-2) + B(2-3) \Rightarrow B = -2$ $\frac{x}{x^2 - 5x + 6} = \frac{3}{(x-3)} + \frac{-2}{(x-2)}$	
	$\frac{x^2 + x - 6}{x^3 + 5x^2 + 2x - 8} = \frac{x^2 + x - 6}{(x-1)(x+4)(x+2)}$ $= \frac{A}{(x-1)} + \frac{B}{(x+4)} + \frac{C}{(x+2)}$ $x^2 + x - 6 = A(x+2)(x+4) + B(x-1)(x+2) + C(x-1)(x+4)$ <p>b</p> $x = 1 \Rightarrow -4 = 15A \Rightarrow A = -\frac{4}{15}$ $x = -4 \Rightarrow 6 = 10B \Rightarrow B = \frac{3}{5}$ $x = -2 \Rightarrow -4 = -6C \Rightarrow C = \frac{2}{3}$ $\frac{x^2 + x - 6}{x^3 + 5x^2 + 2x - 8} = \frac{-4}{15(x-1)} + \frac{3}{5(x+4)} + \frac{2}{3(x+2)}$	



أتحقق من فهمي صفة 28

$$\frac{x^2 + 8x + 4}{x^3 - 2x^2} = \frac{x^2 + 8x + 4}{x^2(x-2)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{(x-2)}$$

$$x^2 + 8x + 4 = Ax(x-2) + B(x-2) + Cx^2$$

$$x = 2 \Rightarrow 24 = 4C \Rightarrow C = 6$$

$$x = 0 \Rightarrow 4 = -2B \Rightarrow B = -2$$

$$x = 1 \Rightarrow 13 = -A + 2 + 6 \Rightarrow A = -5$$

$$\frac{x^2 + 8x + 4}{x^3 - 2x^2} = \frac{-5}{x} + \frac{-2}{x^2} + \frac{6}{(x-2)}$$

أتحقق من فهمي صفة 30

$$\frac{21 - 7x}{(x+5)(x^2 + 3)} = \frac{A}{x+5} + \frac{Bx + C}{x^2 + 3}$$

$$21 - 7x = A(x^2 + 3) + (Bx + C)(x + 5)$$

$$x = -5 \Rightarrow 56 = 28A \Rightarrow A = 2$$

$$x = 0 \Rightarrow 21 = 6 + 5C \Rightarrow C = 3$$

$$x = 1 \Rightarrow 14 = 8 + (B + 3)(6) \Rightarrow B = -2$$

$$\frac{21 - 7x}{(x+5)(x^2 + 3)} = \frac{2}{x+5} + \frac{-2x + 3}{x^2 + 3}$$

أتحقق من فهمي صفة 32

$$\frac{3x^2 + 12x + 4}{x^2 + x} = 3 + \frac{9x + 4}{x^2 + x} = 3 + \frac{9x + 4}{x(x+1)}$$

$$\frac{9x + 4}{x(x+1)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{(x+1)}$$

$$9x + 4 = A(x+1) + Bx$$

$$x = 0 \Rightarrow 4 = A \Rightarrow A = 4$$

$$x = -1 \Rightarrow -5 = -B \Rightarrow B = 5$$

$$\frac{3x^2 + 12x + 4}{x^2 + x} = 3 + \frac{4}{x} + \frac{5}{(x+1)}$$



أتدرب وأحل المسائل صفحه 32

$$\frac{2x - 5}{(x + 2)(x + 3)} = \frac{A}{(x + 2)} + \frac{B}{(x + 3)}$$

$$2x - 5 = A(x + 3) + B(x + 2)$$

$$1 \quad x = -2 \Rightarrow -9 = A \Rightarrow A = -9$$

$$x = -3 \Rightarrow -11 = -B \Rightarrow B = 11$$

$$\frac{2x - 5}{(x + 2)(x + 3)} = \frac{-9}{(x + 2)} + \frac{11}{(x + 3)}$$

$$\frac{2x + 22}{x^2 + 2x} = \frac{2x + 22}{x(x + 2)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{(x + 2)}$$

$$2x + 22 = A(x + 2) + Bx$$

$$2 \quad x = 0 \Rightarrow 22 = 2A \Rightarrow A = 11$$

$$x = -2 \Rightarrow 18 = -2B \Rightarrow B = -9$$

$$\frac{2x + 22}{x^2 + 2x} = \frac{11}{x} + \frac{-9}{(x + 2)}$$

$$\frac{4x - 30}{x^2 - 8x + 15} = \frac{4x - 30}{(x - 5)(x - 3)} = \frac{A}{(x - 5)} + \frac{B}{(x - 3)}$$

$$4x - 30 = A(x - 3) + B(x - 5)$$

$$3 \quad x = 5 \Rightarrow -10 = 2A \Rightarrow A = -5$$

$$x = 3 \Rightarrow -18 = -2B \Rightarrow B = 9$$

$$\frac{4x - 30}{x^2 - 8x + 15} = \frac{-5}{(x - 5)} + \frac{9}{(x - 3)}$$



	$\frac{6x^2 - 7x + 10}{(x-2)(x^2+1)} = \frac{A}{x-2} + \frac{Bx+C}{x^2+1}$ $6x^2 - 7x + 10 = A(x^2 + 1) + (Bx + C)(x - 2)$ $x = 2 \Rightarrow 20 = 5A \Rightarrow A = 4$ $x = 0 \Rightarrow 10 = 4 - 2C \Rightarrow C = -3$ $x = 1 \Rightarrow 9 = 8 + (B - 3)(-1) \Rightarrow B = 2$ $\frac{6x^2 - 7x + 10}{(x-2)(x^2+1)} = \frac{4}{x-2} + \frac{2x-3}{x^2+1}$	
4	$\frac{2 - 3x - 4x^2}{x(x-1)(1-2x)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x-1} + \frac{C}{1-2x}$ $2 - 3x - 4x^2 = A(x-1)(1-2x) + Bx(1-2x) + Cx(x-1)$ $x = 0 \Rightarrow 2 = -A \Rightarrow A = -2$ $x = 1 \Rightarrow -5 = -B \Rightarrow B = 5$ $x = \frac{1}{2} \Rightarrow 2 - \frac{3}{2} - 1 = -\frac{1}{4}C \Rightarrow C = 2$ $\frac{2 - 3x - 4x^2}{x(x-1)(1-2x)} = \frac{-2}{x} + \frac{5}{x-1} + \frac{2}{1-2x}$	
5	$\frac{x}{8x^2 - 10x + 3} = \frac{x}{(4x-3)(2x-1)} = \frac{A}{(4x-3)} + \frac{B}{(2x-1)}$ $x = A(2x-1) + B(4x-3)$ $x = \frac{3}{4} \Rightarrow \frac{3}{4} = \frac{1}{2}A \Rightarrow A = \frac{3}{2}$ $x = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{1}{2} = -B \Rightarrow B = -\frac{1}{2}$ $\frac{x}{8x^2 - 10x + 3} = \frac{3}{2(4x-3)} + \frac{-1}{2(2x-1)}$	
6		



	$\frac{1}{2x^3 - 3x^2 - 32x - 15} = \frac{1}{(x+3)(x-5)(2x+1)}$ $= \frac{A}{(x+3)} + \frac{B}{(x-5)} + \frac{C}{(2x+1)}$ $1 = A(x-5)(2x+1) + B(x+3)(2x+1) + C(x+3)(x-5)$	
7	$x = -3 \Rightarrow 1 = 40A \Rightarrow A = \frac{1}{40}$ $x = 5 \Rightarrow 1 = 88B \Rightarrow B = \frac{1}{88}$ $x = -\frac{1}{2} \Rightarrow 1 = -\frac{55}{4}C \Rightarrow C = -\frac{4}{55}$ $\frac{1}{2x^3 - 3x^2 - 32x - 15} = \frac{1}{40(x+3)} + \frac{1}{88(x-5)} - \frac{4}{55(2x+1)}$	
8	$\frac{9x^2 - 9x + 6}{2x^3 - x^2 - 8x + 4} = \frac{9x^2 - 9x + 6}{(x-2)(x+2)(2x-1)}$ $= \frac{A}{(x-2)} + \frac{B}{(x+2)} + \frac{C}{(2x-1)}$ $9x^2 - 9x + 6 = A(x+2)(2x-1) + B(x-2)(2x-1) + C(x-2)(x+2)$ $x = 2 \Rightarrow 24 = 12A \Rightarrow A = 2$ $x = -2 \Rightarrow 60 = 20B \Rightarrow B = 3$ $x = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{15}{4} = -\frac{15}{4}C \Rightarrow C = -1$ $\frac{9x^2 - 9x + 6}{2x^3 - x^2 - 8x + 4} = \frac{2}{(x-2)} + \frac{3}{(x+2)} + \frac{-1}{(2x-1)}$	



	$\frac{5 + 3x - x^2}{-x^3 + 3x^2 + 4x - 12} = \frac{x^2 - 3x - 5}{x^3 - 3x^2 - 4x + 12} = \frac{x^2 - 3x - 5}{(x-2)(x+2)(x-3)}$ $= \frac{A}{(x-2)} + \frac{B}{(x+2)} + \frac{C}{(x-3)}$ $x^2 - 3x - 5 = A(x+2)(x-3) + B(x-2)(x-3) + C(x-2)(x+2)$
9	$x = 2 \Rightarrow -7 = -4A \Rightarrow A = \frac{7}{4}$ $x = -2 \Rightarrow 5 = 20B \Rightarrow B = \frac{1}{4}$ $x = 3 \Rightarrow -5 = 5C \Rightarrow C = -1$ $\frac{5 + 3x - x^2}{-x^3 + 3x^2 + 4x - 12} = \frac{7}{4(x-2)} + \frac{1}{4(x+2)} + \frac{-1}{(x-3)}$
10	$\frac{(x-3)^2}{x^3 - 16x} = \frac{(x-3)^2}{x(x+4)(x-4)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{(x+4)} + \frac{C}{(x-4)}$ $(x-3)^2 = A(x+4)(x-4) + Bx(x-4) + Cx(x+4)$ $x = 0 \Rightarrow 9 = -16A \Rightarrow A = -\frac{9}{16}$ $x = -4 \Rightarrow 49 = 32B \Rightarrow B = \frac{49}{32}$ $x = 4 \Rightarrow 1 = 32C \Rightarrow C = \frac{1}{32}$ $\frac{(x-3)^2}{x^3 - 16x} = \frac{-9}{16x} + \frac{49}{32(x+4)} + \frac{1}{32(x-4)}$
11	$\frac{7x - 3}{x^2 - 8x + 16} = \frac{7x - 3}{(x-4)^2} = \frac{A}{x-4} + \frac{B}{(x-4)^2}$ $7x - 3 = A(x-4) + B$ $x = 4 \Rightarrow 25 = B \Rightarrow B = 25$ $x = 0 \Rightarrow -3 = -4A + 25 \Rightarrow A = 7$ $\frac{7x - 3}{x^2 - 8x + 16} = \frac{7}{x-4} + \frac{25}{(x-4)^2}$





$$\frac{x^2 + 2x + 40}{x^3 - 125} = \frac{x^2 + 2x + 40}{(x-5)(x^2 + 5x + 25)} = \frac{A}{x-5} + \frac{Bx + C}{x^2 + 5x + 25}$$

$$x^2 + 2x + 40 = A(x^2 + 5x + 25) + (Bx + C)(x - 5)$$

$$x = 5 \Rightarrow 75 = 75A \Rightarrow A = 1$$

$$x = 0 \Rightarrow 40 = 25 - 5C \Rightarrow C = -3$$

$$x = 1 \Rightarrow 43 = 31 - 4B + 12 \Rightarrow B = 0$$

$$\frac{x^2 + 2x + 40}{x^3 - 125} = \frac{1}{x-5} + \frac{-3}{x^2 + 5x + 25}$$

$$\begin{aligned} \frac{-2x^3 - 30x^2 + 36x + 216}{x^3 + 216} &= -2 + \frac{-30x^2 + 36x + 648}{x^3 + 216} \\ &= -2 + \frac{-30x^2 + 36x + 648}{(x+6)(x^2 - 6x + 36)} \end{aligned}$$

$$\frac{-30x^2 + 36x + 648}{(x+6)(x^2 - 6x + 36)} = \frac{A}{x+6} + \frac{Bx + C}{x^2 - 6x + 36}$$

$$-30x^2 + 36x + 648 = A(x^2 - 6x + 36) + (Bx + C)(x + 6)$$

$$x = -6 \Rightarrow -1080 - 216 + 648 = 108A \Rightarrow A = -6$$

$$x = 0 \Rightarrow 648 = -216 + 6C \Rightarrow C = 144$$

$$x = 1 \Rightarrow 654 = -186 + 7B + 1008 \Rightarrow B = -24$$

$$\frac{-2x^3 - 30x^2 + 36x + 216}{x^3 + 216} = -2 + \frac{-6}{x+6} + \frac{-24x + 144}{x^2 - 6x + 36}$$

15
National
for Curriculum
Development

16
National
for Curriculum
Development



$$\frac{x^3 + 12x^2 + 33x + 2}{x^2 + 8x + 15} = x + 4 + \frac{-14x - 58}{x^2 + 8x + 15} = x + 4 + \frac{-14x - 58}{(x+3)(x+5)}$$

$$\frac{-14x - 58}{(x+3)(x+5)} = \frac{A}{(x+3)} + \frac{B}{(x+5)}$$

$$17 \quad -14x - 58 = A(x+5) + B(x+3)$$

$$x = -3 \Rightarrow 42 - 58 = 2A \Rightarrow A = -8$$

$$x = -5 \Rightarrow 70 - 58 = -2B \Rightarrow B = -6$$

$$\frac{x^3 + 12x^2 + 33x + 2}{x^2 + 8x + 15} = x + 4 + \frac{-8}{(x+3)} + \frac{-6}{(x+5)}$$

$$\frac{x^5 - 2x^4 + x^3 + x + 5}{x^3 - 2x^2 + x - 2} = x^2 + \frac{2x^2 + x + 5}{x^3 - 2x^2 + x - 2}$$

$$= x^2 + \frac{2x^2 + x + 5}{(x-2)(x^2 + 1)}$$

$$\frac{2x^2 + x + 5}{(x-2)(x^2 + 1)} = \frac{A}{x-2} + \frac{Bx + C}{x^2 + 1}$$

$$18 \quad 2x^2 + x + 5 = A(x^2 + 1) + (Bx + C)(x - 2)$$

$$x = 2 \Rightarrow 15 = 5A \Rightarrow A = 3$$

$$x = 0 \Rightarrow 5 = 3 - 2C \Rightarrow C = -1$$

$$x = 1 \Rightarrow 8 = 6 - B + 1 \Rightarrow B = -1$$

$$\frac{x^5 - 2x^4 + x^3 + x + 5}{x^3 - 2x^2 + x - 2} = x^2 + \frac{3}{x-2} + \frac{-x-1}{x^2+1}$$



$$\frac{1}{x^2 - a^2} = \frac{1}{(x-a)(x+a)} = \frac{A}{(x-a)} + \frac{B}{(x+a)}$$

$$1 = A(x+a) + B(x-a)$$

$$x = a \Rightarrow 1 = 2aA \Rightarrow A = \frac{1}{2a}$$

$$x = -a \Rightarrow 1 = -2aB \Rightarrow B = -\frac{1}{2a}$$

$$\frac{1}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a(x-a)} + \frac{-1}{2a(x+a)}$$

$$\frac{5x}{(x+3)^2} = \frac{p}{x+3} - \frac{3p}{(x+3)^2} = \frac{p(x+3) - 3p}{(x+3)^2}$$

$$20 \Rightarrow p(x+3) - 3p = 5x$$

$$x = -2 \Rightarrow p - 3p = -10$$

$$\Rightarrow p = 5$$

$$\frac{x^2 + 8x + 7}{(x-1)^2(x^2 + 2)} = \frac{px - 37}{9(x^2 + 2)} - \frac{p}{9(x-1)} + \frac{8p}{3(x-1)^2}$$

$$= \frac{(px - 37)(x-1)^2 - p(x-1)(x^2 + 2) + 24p(x^2 + 2)}{9(x-1)^2(x^2 + 2)}$$

$$21 \Rightarrow 9(x^2 + 8x + 7) = (px - 37)(x-1)^2 - p(x-1)(x^2 + 2) + 24p(x^2 + 2)$$

$$x = 1 \Rightarrow 144 = 72p$$

$$\Rightarrow p = 2$$



<p>22</p> $\frac{2000(4 - 3x)}{(11 - 7x)(7 - 4x)} = \frac{A}{(11 - 7x)} + \frac{B}{(7 - 4x)}$ $2000(4 - 3x) = A(7 - 4x) + B(11 - 7x)$ $x = \frac{11}{7} \Rightarrow -\frac{10000}{7} = \frac{5}{7}A \Rightarrow A = -2000$ $x = \frac{7}{4} \Rightarrow \frac{32000}{7} = -\frac{5}{4}B \Rightarrow B = 2000$ $\frac{2000(4 - 3x)}{(11 - 7x)(7 - 4x)} = \frac{-2000}{(11 - 7x)} + \frac{2000}{(7 - 4x)}$	<p>اقتران أعلى درجة حرارة هو $\frac{2000}{7-4x}$, اقتران أدنى درجة حرارة هو $\frac{2000}{11-7x}$</p>
<p>23</p> $\frac{t^2 - 5t + 6}{(t + 2)(t^2 - 1)} = \frac{t^2 - 5t + 6}{(t + 2)(t - 1)(t + 1)} = \frac{A}{(t + 2)} + \frac{B}{(t - 1)} + \frac{C}{(t + 1)}$ $t^2 - 5t + 6 = A(t - 1)(t + 1) + B(t + 2)(t + 1) + C(t + 2)(t - 1)$ $t = -2 \Rightarrow 20 = 3A \Rightarrow A = \frac{20}{3}$ $t = 1 \Rightarrow 2 = 6B \Rightarrow B = \frac{1}{3}$ $t = -1 \Rightarrow 12 = -2C \Rightarrow C = -6$	$\frac{t^2 - 5t + 6}{(t + 2)(t^2 - 1)} = \frac{\frac{20}{3}}{(t + 2)} + \frac{\frac{1}{3}}{(t - 1)} + \frac{-6}{(t + 1)}$ $= \frac{\frac{20}{3}}{(t + 2)} + \frac{\frac{1}{3}(t + 1) - 6(t - 1)}{(t^2 - 1)}$ $= \frac{\frac{20}{3}}{(t + 2)} + \frac{-\frac{17}{3}t + \frac{19}{3}}{(t^2 - 1)}$

نعم يمكن.



25

$$\frac{x^3 - 2x^2 - 4x + 3}{x^4} = \frac{x^3}{x^4} - \frac{2x^2}{x^4} - \frac{4x}{x^4} + \frac{3}{x^4}$$

$$= \frac{1}{x} - \frac{2}{x^2} - \frac{4}{x^3} + \frac{3}{x^4}$$

$$\frac{2x^2 + 6x - 5}{(x-2)^3} = \frac{A}{(x-2)} + \frac{B}{(x-2)^2} + \frac{C}{(x-2)^3}$$

$$2x^2 + 6x - 5 = A(x-2)^2 + B(x-2) + C$$

$$x = 2 \Rightarrow 15 = C \Rightarrow C = 15$$

26

$$x = 3 \Rightarrow 31 = A + B + 15 \Rightarrow A + B = 16 \dots \dots \dots (1)$$

$$x = 1 \Rightarrow 3 = A - B + 15 \Rightarrow A - B = -12 \dots \dots \dots (2)$$

$$(1) + (2) \Rightarrow 2A = 4 \Rightarrow A = 2, B = 14$$

$$\frac{2x^2 + 6x - 5}{(x-2)^3} = \frac{2}{(x-2)} + \frac{14}{(x-2)^2} + \frac{15}{(x-2)^3}$$

$$\frac{3x^3 + 12x - 20}{x^4 - 8x^2 + 16} = \frac{3x^3 + 12x - 20}{(x^2 - 4)^2} = \frac{3x^3 + 12x - 20}{(x-2)^2(x+2)^2}$$

$$= \frac{A}{(x-2)} + \frac{B}{(x-2)^2} + \frac{C}{(x+2)} + \frac{D}{(x+2)^2}$$

$$3x^3 + 12x - 20 = A(x-2)(x+2)^2 + B(x+2)^2 + C(x+2)(x-2)^2 + D(x-2)^2$$

$$x = 2 \Rightarrow 28 = 16B \Rightarrow B = \frac{7}{4}$$

27

$$x = -2 \Rightarrow -68 = 16D \Rightarrow D = -\frac{17}{4}$$

$$x = 0 \Rightarrow -20 = -8A + 7 + 8C - 17 \Rightarrow -4A + 4C = -5 \dots \dots \dots (1)$$

$$x = 4 \Rightarrow 220 = 72A + 63 + 24C - 17 \Rightarrow 36A + 12C = 87 \dots \dots \dots (2)$$

$$9 \times (1) + (2) \Rightarrow 48C = 42 \Rightarrow C = \frac{7}{8}, A = \frac{17}{8}$$

$$\frac{3x^3 + 12x - 20}{x^4 - 8x^2 + 16} = \frac{17}{8(x-2)} + \frac{7}{4(x-2)^2} + \frac{7}{8(x+2)} - \frac{17}{4(x+2)^2}$$



الخطأ الذي وقعت فيه رئيم هو أنها جعلت مقام الكسرين متساوين في حين أنه يجب أن يجعل مقام الكسر الثاني $(x+3)^2$. تكون الخطوة الأولى الصحيحة على النحو الآتي:

28

$$\frac{5x + 2}{(x + 3)^2} = \frac{A}{x + 3} + \frac{B}{(x + 3)^2}$$

$$\frac{ax + b}{x^2 - 1} = \frac{A}{x - 1} + \frac{B}{x + 1}$$

$$ax + b = A(x + 1) + B(x - 1)$$

29

$$x = 1 \Rightarrow a + b = 2A \Rightarrow A = \frac{a + b}{2}$$

$$x = -1 \Rightarrow -a + b = -2B \Rightarrow B = \frac{-a + b}{-2} = \frac{a - b}{2}$$

تنوع الإجابات. هذا مثال لإجابة محتملة:

30

$$\begin{aligned} \frac{f(x)}{g(x)} &= \frac{x^2 - 2x + 7}{2x^3 - 7x^2 + 9} \\ &= \frac{x^2 - 2x + 7}{(x-3)(2x^2 - x - 3)} \\ &= \frac{x^2 - 2x + 7}{(x-3)(2x-3)(x+1)} \\ &= \frac{A}{x-3} + \frac{B}{2x-3} + \frac{C}{x+1} \\ &= \frac{5}{6(x-3)} - \frac{5}{3(2x-3)} + \frac{1}{2(x+1)} \end{aligned}$$



اختبار نهاية الوحدة الثانية

1	a		
2	d		
3	a		
4	d		
5	d		
6	$3x^3 - 10x^2 - 9x + 4 = (x + 1)(x - 4)(3x - 1)$		
7	$8x^4 + 2x^3 - 53x^2 + 37x - 6 = (x - 2)(x + 3)(2x - 1)(4x - 1)$		
8	$x^4 - 7x^3 + 13x^2 + 3x - 18 = 0$ $x = -1, x = 2, x = 3$		
9	$x^3 + 16x^2 - 3x = 5x^2 - 18x + 27$ $x = 1, x = -3, x = -9$		
10	$8m + 4 - 20 - 6 = 16 - 8 + 2m + 8 \Rightarrow m = 5$		
11	$\frac{6}{(x+3)(x+1)} = \frac{3}{x+1} - \frac{3}{x+3}$		
12	$\frac{5x^2 - 6}{x^3 - 2x^2 + x} = \frac{-6}{x} + \frac{11}{x-1} - \frac{1}{(x-1)^2}$		
13	$\frac{3x^2 + x - 4}{x^2 - 2x} = 3 + \frac{2}{x} + \frac{5}{x-2}$		
14	$\frac{4x^2 - x - 2}{x^4 + 2x^2} = \frac{-1}{2x} - \frac{1}{x^2} + \frac{x+10}{2(x^2+2)}$		



<p>15</p> $\frac{7x - 5}{(x - a)(x - 3)} = \frac{-9}{x - a} + \frac{b}{x - 3}$ $b = 16, a = 2$	$x^3 + 5x^2 + 5x - 2 = 0 \Rightarrow (x + 2)(x^2 + 3x - 1) = 0$ <p>مجموع الحللين الآخرين لهذه المعادلة هو -3</p>
<p>17</p> $f(x) = -x^3 + 32x^2 - 224x + 768 = (x - 24)(-x^2 + 8x - 32)$	<p>ليكن طول الخزان y وعرضه x وارتفاعه h ومحمه V ومساحة سطحه الكلية A</p> $y = 2x + 1, h = x + 1$ $V = xyh = x(x + 1)(2x + 1)$ $\Rightarrow x(x + 1)(2x + 1) = 30$ $\Rightarrow 2x^3 + 3x^2 + x - 30 = 0$ $\Rightarrow (x - 2)(2x^2 + 7x + 15) = 0$
<p>18</p> $A = 2(xh + yh + xy) = 2(6 + 15 + 10) = 62$	<p>عرض الخزان $2 m$، وطوله $5 m$، وارتفاعه $3 m$، ومحمه $62 m^3$</p> <p>مساحة الحديد اللازم لصنعيه $62 m^2$</p>



الوحدة الثانية: المتطابقات والمعادلات المثلثية

الدرس الأول: المتطابقات المثلثية 1

مسألة اليوم صفحة 38

$$s = \frac{h \sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)}{\sin \theta} = \frac{h \cos \theta}{\sin \theta} = h \cot \theta$$

أتحقق من فهمي صفحة 40

$$\sec \theta = -\frac{3}{2}, \quad \pi < \theta < \frac{3\pi}{2} \Rightarrow \tan \theta > 0$$

$$1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta \Rightarrow \tan \theta = \sqrt{\sec^2 \theta - 1} = \sqrt{\left(-\frac{3}{2}\right)^2 - 1} = \frac{\sqrt{5}}{2}$$

أتحقق من فهمي صفحة 40

$$\sin x (\csc x - \sin x) = \sin x \csc x - \sin^2 x$$

$$= \sin x \left(\frac{1}{\sin x}\right) - \sin^2 x$$

$$= 1 - \sin^2 x$$

$$= \cos^2 x$$

$$1 + \frac{\sin x}{\cos x} + \frac{\cos x}{1 + \sin x} = \frac{\cos x (1 + \sin x) + \sin x (1 + \sin x) + \cos^2 x}{\cos x (1 + \sin x)}$$

$$= \frac{\cos x (1 + \sin x) + \sin x + \sin^2 x + \cos^2 x}{\cos x (1 + \sin x)}$$

$$= \frac{\cos x (1 + \sin x) + \sin x + 1}{\cos x (1 + \sin x)}$$

$$= \frac{(\cos x + 1)(1 + \sin x)}{\cos x (1 + \sin x)}$$

$$= 1 + \sec x$$



c	$\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) \sec x = \cos x \left(\frac{1}{\cos x}\right) = 1$
---	--

أتحقق من فهمي صفحة 41

$$\begin{aligned}\frac{1}{1 + \cos x} &= \frac{1}{1 + \cos x} \times \frac{1 - \cos x}{1 - \cos x} = \frac{1 - \cos x}{1 - \cos^2 x} \\&= \frac{1 - \cos x}{\sin^2 x} \\&= \frac{1}{\sin^2 x} - \frac{\cos x}{\sin x} \times \frac{1}{\sin x} \\&= \csc^2 x - \cot x \csc x\end{aligned}$$

أتحقق من فهمي صفحة 44

$$\begin{aligned}\cot x \cos x &= \frac{\cos x}{\sin x} \times \cos x \\&= \frac{\cos^2 x}{\sin x} \\&= \frac{1 - \sin^2 x}{\sin x} \\&= \frac{1}{\sin x} - \sin x \\&= \csc x - \sin x\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{1 - \cos x}{\sin x} &= \frac{1 - \cos x}{\sin x} \times \frac{1 + \cos x}{1 + \cos x} \\&= \frac{1 - \cos^2 x}{\sin x (1 + \cos x)} \\&= \frac{\sin^2 x}{\sin x (1 + \cos x)} \\&= \frac{\sin x}{1 + \cos x}\end{aligned}$$



$$\begin{aligned} \frac{1}{1-\cos x} + \frac{1}{1+\cos x} &= \frac{1+\cos x + 1-\cos x}{1-\cos^2 x} \\ &= \frac{2}{1-\cos^2 x} \\ &= \frac{2}{\sin^2 x} \\ &= 2\csc^2 x \end{aligned}$$

أتحقق من فهمي صفحة 44

$$\begin{aligned} (\tan x + \cot x)^2 &= \left(\frac{\sin x}{\cos x} + \frac{\cos x}{\sin x} \right)^2 = \left(\frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\cos x \sin x} \right)^2 \\ &= \left(\frac{1}{\cos x \sin x} \right)^2 = \frac{1}{\cos^2 x \sin^2 x} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sec^2 x + \csc^2 x &= \frac{1}{\cos^2 x} + \frac{1}{\sin^2 x} = \frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\cos^2 x \sin^2 x} \\ &= \frac{1}{\cos^2 x \sin^2 x} \end{aligned}$$

بما أن الطرفين يساويان المقدار المثلثي نفسه، إذن المتطابقة صحيحة.

أتحقق من فهمي صفحة 46

$$\begin{aligned} \cos 75^\circ &= \cos(45^\circ + 30^\circ) \\ &= \cos 45^\circ \cos 30^\circ - \sin 45^\circ \sin 30^\circ \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{2}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \tan \frac{\pi}{12} &= \tan \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} \right) \\ &= \frac{\tan \frac{\pi}{3} - \tan \frac{\pi}{4}}{1 + \tan \frac{\pi}{3} \tan \frac{\pi}{4}} \\ &= \frac{\sqrt{3}-1}{1+\sqrt{3}} \end{aligned}$$



c	$\sin 80^\circ \cos 20^\circ - \cos 80^\circ \sin 20^\circ = \sin(80^\circ - 20^\circ) = \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$
---	--

أتحقق من فهمي صفحة 47

a	$\tan\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \frac{\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)}{\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right)} = \frac{\cos x}{\sin x} = \cot x$
---	---

b	$\tan\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\tan x - \tan \frac{\pi}{4}}{1 + \tan x \tan \frac{\pi}{4}} = \frac{\tan x - 1}{1 + \tan x}$
---	--

أتدرب وأحل المسائل صفحة 47

	$\sin \theta = \frac{1}{3}, \quad 0 < \theta < \frac{\pi}{2} \Rightarrow \cos \theta > 0, \quad \cot \theta > 0$
--	--

1	$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1 \Rightarrow \cos \theta = \sqrt{1 - \sin^2 \theta} = \sqrt{1 - \frac{1}{9}} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$
---	---

	$\cot \theta = \frac{\cos \theta}{\sin \theta} = \frac{\frac{2\sqrt{2}}{3}}{\frac{1}{3}} = 2\sqrt{2}$
--	---

2	$\tan \theta = -\frac{3}{7}, \quad \frac{\pi}{2} < \theta < \pi \Rightarrow \sec \theta < 0$
---	--

	$\sec^2 \theta = 1 + \tan^2 \theta \Rightarrow \sec \theta = -\sqrt{1 + \tan^2 \theta} = -\sqrt{1 + \frac{9}{49}} = -\frac{\sqrt{58}}{7}$
--	---



	$\csc \theta = -\frac{5}{3}$, $\pi < \theta < \frac{3\pi}{2} \Rightarrow \tan \theta > 0$, $\cos \theta < 0$	
3	$\sin \theta = \frac{1}{\csc \theta} = -\frac{3}{5}$ $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1 \Rightarrow \cos \theta = -\sqrt{1 - \sin^2 \theta} = -\sqrt{1 - \frac{9}{25}} = -\frac{4}{5}$ $\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{-\frac{3}{5}}{-\frac{4}{5}} = \frac{3}{4}$	
4	$\sec \theta = \frac{9}{4}$, $\frac{3\pi}{2} < \theta < 2\pi \Rightarrow \sin \theta < 0$, $\cos \theta < 0$ $\cos \theta = \frac{1}{\sec \theta} = \frac{4}{9}$ $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1 \Rightarrow \sin \theta = -\sqrt{1 - \cos^2 \theta} = -\sqrt{1 - \frac{16}{81}} = -\frac{\sqrt{65}}{9}$	
5	$\cos x \tan x = \cos x \frac{\sin x}{\cos x}$ $= \sin x$	
6	$\frac{\sec x - \cos x}{\sin x} = \frac{\frac{1}{\cos x} - \cos x}{\sin x}$ $= \frac{1 - \cos^2 x}{\sin x \cos x}$ $= \frac{\sin^2 x}{\sin x \cos x}$ $= \frac{\sin x}{\cos x}$ $= \tan x$	



	$\frac{\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right)}{\csc x} + \cos^2 x = \frac{\sin x}{\frac{1}{\sin x}} + \cos^2 x$ $= \sin^2 x + \cos^2 x$ $= 1$	
7		
8	$\frac{\sin x - \cos x}{\cos x} + \frac{\cos x - \sin x}{\sin x} = \frac{\sin x}{\cos x} - \frac{\cos x}{\cos x} + \frac{\cos x}{\sin x} - \frac{\sin x}{\sin x}$ $= \tan x + 1 + \cot x - 1$ $= \tan x + \cot x$	
9	$\frac{(\sin x + \cos x)^2 - 1}{\sin x \cos x} = \frac{\sin^2 x + 2 \sin x \cos x + \cos^2 x - 1}{\sin x \cos x}$ $= \frac{2 \sin x \cos x}{\sin x \cos x}$ $= 2$	
10	$\frac{\sec x - \cos x}{\tan x} = \frac{\frac{1}{\cos x} - \cos x}{\frac{\sin x}{\cos x}}$ $= \frac{1 - \cos^2 x}{\sin x}$ $= \frac{\sin^2 x}{\sin x}$ $= \sin x$	
11	$\cot(-x) \cos(-x) + \sin(-x) = -\cot x \cos x - \sin x$ $= -\frac{\cos x}{\sin x} \times \cos x - \sin x$ $= \frac{-\cos^2 x - \sin^2 x}{\sin x}$ $= \frac{-1}{\sin x} = -\csc x$	



12	$\begin{aligned}(\sin x + \cos x)^2 &= \sin^2 x + 2 \sin x \cos x + \cos^2 x \\&= 1 + 2 \sin x \cos x\end{aligned}$
13	$\begin{aligned}\frac{(\sin x + \cos x)^2}{\sin^2 x - \cos^2 x} &= \frac{(\sin x + \cos x)^2}{(\sin x + \cos x)(\sin x - \cos x)} \\&= \frac{(\sin x + \cos x)}{(\sin x - \cos x)} \\&= \frac{(\sin x + \cos x)}{(\sin x - \cos x)} \times \frac{(\sin x - \cos x)}{(\sin x - \cos x)} = \frac{\sin^2 x - \cos^2 x}{(\sin x - \cos x)^2}\end{aligned}$
14	$\begin{aligned}\frac{1 - \sin x}{1 + \sin x} \times \frac{1 - \sin x}{1 - \sin x} &= \frac{(1 - \sin x)^2}{1 - \sin^2 x} \\&= \frac{(1 - \sin x)^2}{\cos^2 x} = \left(\frac{1 - \sin x}{\cos x}\right)^2 = (\sec x - \tan x)^2\end{aligned}$
15	$\sin^4 x - \cos^4 x = (\sin^2 x - \cos^2 x)(\sin^2 x + \cos^2 x) = \sin^2 x - \cos^2 x$
16	$\frac{1}{1 - \sin x} - \frac{1}{1 + \sin x} = \frac{1 + \sin x - 1 + \sin x}{1 - \sin^2 x} = \frac{2 \sin x}{\cos^2 x} = 2 \tan x \sec x$
17	$\ln \tan x = \ln \left \frac{\sin x}{\cos x} \right = \ln \frac{ \sin x }{ \cos x } = \ln \sin x - \ln \cos x $
18	$\begin{aligned}\ln \sec x + \tan x + \ln \sec x - \tan x &= \ln \sec x + \tan x \sec x - \tan x \\&= \ln (\sec x + \tan x)(\sec x - \tan x) \\&= \ln \sec^2 x - \tan^2 x = \ln 1 = 0\end{aligned}$
19	$\begin{aligned}\sin 165^\circ &= \sin(180^\circ - 165^\circ) \\&= \sin 15^\circ \\&= \sin(45^\circ - 30^\circ) \\&= \sin 45^\circ \cos 30^\circ - \cos 45^\circ \sin 30^\circ \\&= \frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{3} - 1}{2\sqrt{2}}\end{aligned}$



	$\begin{aligned} \tan 195^\circ &= \tan(195^\circ - 180^\circ) \\ &= \tan 15^\circ \\ &= \tan(60^\circ - 45^\circ) \\ &= \frac{\tan 60^\circ - \tan 45^\circ}{1 + \tan 60^\circ \tan 45^\circ} = \frac{\sqrt{3} - 1}{1 + \sqrt{3}} \end{aligned}$
20	$\begin{aligned} \sec\left(-\frac{\pi}{12}\right) &= \sec\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{1}{\cos\frac{\pi}{12}} = \frac{1}{\cos\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6}\right)} \\ &= \frac{1}{\cos\frac{\pi}{4}\cos\frac{\pi}{6} + \sin\frac{\pi}{4}\sin\frac{\pi}{6}} \\ &= \frac{1}{\frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{1}{2}} = \frac{1}{\frac{\sqrt{3} + 1}{2\sqrt{2}}} = \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3} + 1} \end{aligned}$
21	$\begin{aligned} \sin\frac{17\pi}{12} &= \sin\left(\pi + \frac{5\pi}{12}\right) = -\sin\frac{5\pi}{12} = -\sin\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{6}\right) \\ &= -\left(\sin\frac{\pi}{4}\cos\frac{\pi}{6} + \cos\frac{\pi}{4}\sin\frac{\pi}{6}\right) \\ &= -\left(\frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{1}{2}\right) = -\frac{\sqrt{3} + 1}{2\sqrt{2}} \end{aligned}$
22	$\begin{aligned} \sin\frac{\pi}{18}\cos\frac{5\pi}{18} + \cos\frac{\pi}{18}\sin\frac{5\pi}{18} &= \sin\left(\frac{\pi}{18} + \frac{5\pi}{18}\right) = \sin\frac{6\pi}{18} = \sin\frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$
23	$\frac{\tan 40^\circ - \tan 10^\circ}{1 + \tan 40^\circ \tan 10^\circ} = \tan(40^\circ - 10^\circ) = \tan 30^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}}$



$$a^2 + 4 = 5 \Rightarrow a = -1 \quad \text{لأن النقطة في الربع الثاني}$$

$$\left(-\frac{1}{4}\right)^2 + b^2 = 1 \Rightarrow b = -\frac{\sqrt{15}}{4} \quad \text{لأن النقطة في الربع الثالث}$$

25 $\sin \alpha = -\frac{\sqrt{15}}{4}, \cos \alpha = -\frac{1}{4}, \tan \alpha = \sqrt{15}$

$$\sin \beta = \frac{2}{5}, \cos \beta = \frac{-1}{5}, \tan \beta = -2$$

$$f(\alpha + \beta) = \sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta = \frac{\sqrt{15}}{20} - \frac{2}{20} = \frac{\sqrt{15} - 2}{20}$$

26 $g(\alpha - \beta) = \cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta = \frac{1 - 2\sqrt{15}}{20}$

27 $h(\alpha + \beta) = \tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta} = \frac{\sqrt{15} - 2}{1 + 2\sqrt{15}}$

28 $n = \frac{\sin\left(\frac{\theta}{2} + \frac{60^\circ}{2}\right)}{\sin\frac{\theta}{2}} = \frac{\sin\left(\frac{\theta}{2} + 30^\circ\right)}{\sin\frac{\theta}{2}} = \frac{\sin\frac{\theta}{2} \cos 30^\circ + \cos\frac{\theta}{2} \sin 30^\circ}{\sin\frac{\theta}{2}}$

$$= \frac{\frac{\sqrt{3}}{2} \sin\frac{\theta}{2} + \frac{1}{2} \cos\frac{\theta}{2}}{\sin\frac{\theta}{2}} = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} \cot\frac{\theta}{2}$$

29 $\frac{g(x+h) - g(x)}{h} = \frac{\cos(x+h) - \cos(x)}{h}$


$$= \frac{\cos x \cos h - \sin x \sin h - \cos x}{h}$$

$$= \frac{\cos x \cos h - \cos x}{h} - \frac{\sin x \sin h}{h}$$

$$= -\cos x \left(\frac{1 - \cos h}{h} \right) - \sin x \left(\frac{\sin h}{h} \right)$$



	$\sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right) = \sin x \cos \frac{\pi}{6} + \cos x \sin \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2} \sin x + \frac{1}{2} \cos x$ 30 $a = \frac{\sqrt{3}}{2}, b = \frac{1}{2}$	
	$\sin(A+B) + \sin(A-B)$ 31 $= \sin A \cos B + \cos A \sin B + \sin A \cos B - \cos A \sin B$ $= 2 \sin A \cos B$	
	$\sqrt{2} \sin\left(A + \frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2} \left(\sin A \cos \frac{\pi}{4} + \cos A \sin \frac{\pi}{4} \right)$ 32 $= \sqrt{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \sin A + \frac{1}{\sqrt{2}} \cos A \right)$ $= \sin A + \cos A$	
	$\frac{\sin(A-B)}{\cos A \cos B} + \frac{\sin(B-C)}{\cos B \cos C} + \frac{\sin(C-A)}{\cos C \cos A}$ 33 $= \frac{\sin A \cos B - \cos A \sin B}{\cos A \cos B} + \frac{\sin B \cos C - \cos B \sin C}{\cos B \cos C} + \frac{\sin C \cos A - \cos C \sin A}{\cos C \cos A}$ $= \frac{\sin A \cos B}{\cos A \cos B} - \frac{\cos A \sin B}{\cos A \cos B} + \frac{\sin B \cos C}{\cos B \cos C} - \frac{\cos B \sin C}{\cos B \cos C} + \frac{\sin C \cos A}{\cos C \cos A} - \frac{\cos C \sin A}{\cos C \cos A}$ $= \tan A - \tan B + \tan C - \tan A = 0$	
	$\cos(x+y) \cos(x-y)$ 34 $= (\cos x \cos y - \sin x \sin y)(\cos x \cos y + \sin x \sin y)$ $= \cos^2 x \cos^2 y - \sin^2 x \sin^2 y$ $= \cos^2 x (1 - \sin^2 y) - (1 - \cos^2 x) \sin^2 y$ $= \cos^2 x - \cos^2 x \sin^2 y - \sin^2 y + \cos^2 x \sin^2 y$ $= \cos^2 x - \sin^2 y$	



35

نفرض نقطتين على المستقيم L إحداثياهما $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ كما هو موضح بالشكل،


$$\text{ميل المستقيم } L \text{ يساوي: } m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

$$\text{وظل الزاوية } \theta \text{ يساوي: } \tan \theta = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

إذن، ميل المستقيم يساوي ظل زاوية ميله، أي: $m = \tan \theta$

$$\psi = \theta_2 - \theta_1$$

$$36 \quad \tan \psi = \tan(\theta_2 - \theta_1) = \frac{\tan \theta_2 - \tan \theta_1}{1 + \tan \theta_2 \tan \theta_1} = \frac{m_2 - m_1}{1 + m_2 m_1}$$



37

الزاوية ACB والزاوية DCG متقابلتان بالرأس، فهما متساويتان في القياس، وكذلك الزوايا EDF و CDG ،

إذن:

$$\text{قياس الزاوية } DCG \text{ يساوي } \beta - 90^\circ \text{ وقياس الزاوية } CDG \text{ يساوي } 90^\circ - \alpha$$

$$\gamma + 90^\circ - \beta + 90^\circ - \alpha = 180^\circ \Rightarrow \gamma = \alpha + \beta$$

$$\tan \gamma = \tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta} = \frac{\frac{4}{6} + \frac{3}{4}}{1 - \frac{4}{6} \times \frac{3}{4}} = \frac{17}{6}$$



38

$$\begin{aligned}2 \cot(\alpha - \beta) &= \frac{2}{\tan(\alpha - \beta)} = \frac{2(1 + \tan \alpha \tan \beta)}{\tan \alpha - \tan \beta} \\&= \frac{2(1 + (x+1)(x-1))}{(x+1) - (x-1)} \\&= \frac{2(1 + x^2 - 1)}{2} \\&= x^2\end{aligned}$$

39

$$\begin{aligned}\sin\left(\cos^{-1}\frac{1}{2} + \sin^{-1}\frac{1}{\sqrt{2}}\right) &= \sin\left(\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{4}\right) \\&= \sin\frac{\pi}{3} \cos\frac{\pi}{4} + \cos\frac{\pi}{3} \sin\frac{\pi}{4} \\&= \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{\sqrt{2}} \\&= \frac{\sqrt{3} + 1}{2\sqrt{2}}\end{aligned}$$

الخطأ من بدأ الحل، وذلك في تطبيق القانون.

الحل الصحيح هو:

40

$$\begin{aligned}\sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) &= \sin x \cos\frac{\pi}{4} + \cos x \sin\frac{\pi}{4} \\&= \frac{1}{\sqrt{2}} \sin x + \frac{1}{\sqrt{2}} \cos x \\&= \frac{1}{\sqrt{2}} (\sin x + \cos x)\end{aligned}$$



الدرس الثاني: المتطابقات المثلثية 2

أتحقق من فهمي صفحة 52

a	$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1 \Rightarrow \sin \theta = \sqrt{1 - \cos^2 \theta} = \sqrt{1 - \frac{4}{9}} = \frac{\sqrt{5}}{3}$
b	$\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta = 2 \left(\frac{\sqrt{5}}{3}\right) \left(-\frac{2}{3}\right) = -\frac{4\sqrt{5}}{9}$
c	$\tan 2\theta = \frac{\sin 2\theta}{\cos 2\theta} = \frac{-\frac{4\sqrt{5}}{9}}{-\frac{1}{9}} = 4\sqrt{5}$ $\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{\frac{\sqrt{5}}{3}}{-\frac{2}{3}} = -\frac{\sqrt{5}}{2}$ $\tan 2\theta = \frac{2 \tan \theta}{1 - \tan^2 \theta} = \frac{2 \left(-\frac{\sqrt{5}}{2}\right)}{1 - \left(-\frac{\sqrt{5}}{2}\right)^2} = \frac{-\sqrt{5}}{1 - \frac{5}{4}} = \frac{-\sqrt{5}}{-\frac{1}{4}} = 4\sqrt{5}$

طريقة ثانية للحل:

$\sin 3\theta = \sin(2\theta + \theta)$
$= \sin 2\theta \cos \theta + \cos 2\theta \sin \theta$
$= (2 \sin \theta \cos \theta) \cos \theta + (2 \cos^2 \theta - 1) \sin \theta$
$= 2 \sin \theta \cos^2 \theta + 2 \cos^2 \theta \sin \theta - \sin \theta$
$= 4 \sin \theta \cos^2 \theta - \sin \theta$



أتحقق من فهمي صفحة 53

$$\begin{aligned} \sin^4 x \cos^2 x &= (\sin^2 x)^2 \cos^2 x \\ &= \left(\frac{1 - \cos 2x}{2}\right)^2 \left(\frac{1 + \cos 2x}{2}\right) \\ &= \left(\frac{1 - \cos 2x}{2}\right) \left(\frac{1 - \cos 2x}{2}\right) \left(\frac{1 + \cos 2x}{2}\right) \\ &= \left(\frac{1 - \cos 2x}{2}\right) \left(\frac{1 - \cos^2 2x}{4}\right) \\ &= \left(\frac{1 - \cos 2x}{2}\right) \left(\frac{1}{4} - \frac{\cos^2 2x}{4}\right) \\ &= \left(\frac{1 - \cos 2x}{2}\right) \left(\frac{1}{4} - \frac{1 + \cos 4x}{8}\right) \\ &= \left(\frac{1 - \cos 2x}{2}\right) \left(\frac{1 - \cos 4x}{8}\right) \\ &= \frac{1 - \cos 2x - \cos 4x + \cos 2x \cos 4x}{16} \\ &= \frac{1}{16} (1 - \cos 2x - \cos 4x + \cos 2x \cos 4x) \\ &= \frac{1}{16} \left(1 - \cos 2x - \cos 4x + \frac{1}{2} (\cos 2x + \cos 6x)\right) \\ &= \frac{1}{16} - \frac{1}{32} \cos 2x - \frac{1}{16} \cos 4x + \frac{1}{32} \cos 6x \end{aligned}$$

أتحقق من فهمي صفحة 54

$$\begin{aligned} \cos 112.5^\circ &= \cos \frac{225^\circ}{2} = -\sqrt{\frac{1 + \cos 225^\circ}{2}} \\ &= -\sqrt{\frac{1 - \frac{\sqrt{2}}{2}}{2}} = -\sqrt{\frac{2 - \sqrt{2}}{4}} = -\frac{\sqrt{2 - \sqrt{2}}}{2} \end{aligned}$$



أتحقق من فهمي صفحة 55

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1 \Rightarrow \cos x = -\sqrt{1 - \sin^2 x} = -\sqrt{1 - \frac{4}{25}} = -\frac{\sqrt{21}}{5}$$

a

$$\sin \frac{x}{2} = \sqrt{\frac{1 - \cos x}{2}} = \sqrt{\frac{1 - \frac{-\sqrt{21}}{5}}{2}} = \sqrt{\frac{5 + \sqrt{21}}{10}}$$

b

$$\cos \frac{x}{2} = \sqrt{\frac{1 + \cos x}{2}} = \sqrt{\frac{1 - \frac{\sqrt{21}}{5}}{2}} = \sqrt{\frac{5 - \sqrt{21}}{10}}$$

c

$$\tan \frac{x}{2} = \sqrt{\frac{1 - \cos x}{1 + \cos x}} = \sqrt{\frac{1 + \frac{\sqrt{21}}{5}}{1 - \frac{\sqrt{21}}{5}}} = \sqrt{\frac{5 + \sqrt{21}}{5 - \sqrt{21}}}$$

أتحقق من فهمي صفحة 56

$$\sin 7x \cos x = \frac{1}{2}(\sin(7x - x) + \sin(7x + x)) = \frac{1}{2}(\sin 6x + \sin 8x)$$

أتحقق من فهمي صفحة 57

$$\cos 3x + \cos 2x = 2 \cos \frac{3x + 2x}{2} \cos \frac{3x - 2x}{2} = 2 \cos \frac{5x}{2} \cos \frac{x}{2}$$

أتحقق من فهمي صفحة 58

$$a \quad \frac{2 \tan x}{1 + \tan^2 x} = \frac{\frac{2 \sin x}{\cos x}}{1 + \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x}} = \frac{2 \sin x \cos x}{\cos^2 x + \sin^2 x} = \sin 2x$$

b

$$\frac{\sin x + \sin y}{\cos x + \cos y} = \frac{2 \sin \left(\frac{x+y}{2} \right) \cos \left(\frac{x-y}{2} \right)}{2 \cos \left(\frac{x+y}{2} \right) \cos \left(\frac{x-y}{2} \right)} = \frac{\sin \left(\frac{x+y}{2} \right)}{\cos \left(\frac{x+y}{2} \right)} = \tan \left(\frac{x+y}{2} \right)$$



أدرب وأحل المسائل صفة 58

$$\sin \theta = \frac{5}{13}, \quad 0 < \theta < \frac{\pi}{2}$$

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1 \Rightarrow \cos \theta = \sqrt{1 - \sin^2 \theta} = \sqrt{1 - \frac{25}{169}} = \frac{12}{13}$$

$$\cos 2\theta = 1 - 2 \sin^2 \theta = 1 - 2 \left(\frac{25}{169}\right) = \frac{119}{169}$$

$$1 \quad \sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta = 2 \left(\frac{5}{13}\right) \left(\frac{12}{13}\right) = \frac{120}{169}$$

$$\sin \frac{\theta}{2} = \sqrt{\frac{1 - \cos \theta}{2}} = \sqrt{\frac{1 - \frac{12}{13}}{2}} = \frac{1}{\sqrt{26}}$$

$$\cos \frac{\theta}{2} = \sqrt{\frac{1 + \cos \theta}{2}} = \sqrt{\frac{1 + \frac{12}{13}}{2}} = \frac{5}{\sqrt{26}}$$

$$\cos \theta = -\frac{\sqrt{6}}{3}, \quad \frac{\pi}{2} < \theta < \pi$$

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1 \Rightarrow \sin \theta = \sqrt{1 - \cos^2 \theta} = \sqrt{1 - \frac{6}{9}} = \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\cos 2\theta = 2 \cos^2 \theta - 1 = 2 \left(\frac{6}{9}\right) - 1 = \frac{1}{3}$$

$$2 \quad \sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta = 2 \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) \left(-\frac{\sqrt{6}}{3}\right) = -\frac{2\sqrt{2}}{3}$$

$$\sin \frac{\theta}{2} = \sqrt{\frac{1 - \cos \theta}{2}} = \sqrt{\frac{1 + \frac{\sqrt{6}}{3}}{2}} = \sqrt{\frac{3 + \sqrt{6}}{6}}$$

$$\cos \frac{\theta}{2} = \sqrt{\frac{1 + \cos \theta}{2}} = \sqrt{\frac{1 - \frac{\sqrt{6}}{3}}{2}} = \sqrt{\frac{3 - \sqrt{6}}{6}}$$



$$\tan \theta = \frac{1}{2}, \pi < \theta < \frac{3\pi}{2}$$

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} \Rightarrow \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{1}{2} \Rightarrow \cos \theta = 2 \sin \theta$$

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1 \Rightarrow \sin^2 \theta + 4 \sin^2 \theta = 1$$

$$\Rightarrow 5 \sin^2 \theta = 1 \Rightarrow \sin \theta = -\frac{1}{\sqrt{5}}, \cos \theta = -\frac{2}{\sqrt{5}}$$

$$\cos 2\theta = 2 \cos^2 \theta - 1 = 2\left(\frac{4}{5}\right) - 1 = \frac{3}{5}$$

$$3 \quad \sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta = 2\left(-\frac{1}{\sqrt{5}}\right)\left(-\frac{2}{\sqrt{5}}\right) = \frac{4}{5}$$

$$\sin \frac{\theta}{2} = \sqrt{\frac{1 - \cos \theta}{2}} = \sqrt{\frac{1 + \frac{2}{\sqrt{5}}}{2}} = \sqrt{\frac{2 + \sqrt{5}}{2\sqrt{5}}}$$

$$\cos \frac{\theta}{2} = -\sqrt{\frac{1 + \cos \theta}{2}} = -\sqrt{\frac{1 - \frac{2}{\sqrt{5}}}{2}} = -\sqrt{\frac{\sqrt{5} - 2}{2\sqrt{5}}}$$

$$csc \theta = -\sqrt{5} \Rightarrow \sin \theta = -\frac{1}{\sqrt{5}}, \cos \theta < 0$$

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1 \Rightarrow \cos \theta = -\sqrt{1 - \sin^2 \theta} = -\sqrt{1 - \frac{1}{5}} = -\frac{2}{\sqrt{5}}$$

$$\cos 2\theta = 1 - 2 \sin^2 \theta = 1 - 2\left(\frac{1}{5}\right) = \frac{3}{5}$$

$$4 \quad \sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta = 2\left(-\frac{1}{\sqrt{5}}\right)\left(-\frac{2}{\sqrt{5}}\right) = \frac{4}{5}$$

$$\sin \frac{\theta}{2} = \sqrt{\frac{1 - \cos \theta}{2}} = \sqrt{\frac{1 + \frac{2}{\sqrt{5}}}{2}} = \sqrt{\frac{2 + \sqrt{5}}{2\sqrt{5}}}$$

$$\cos \frac{\theta}{2} = -\sqrt{\frac{1 + \cos \theta}{2}} = -\sqrt{\frac{1 - \frac{2}{\sqrt{5}}}{2}} = -\sqrt{\frac{\sqrt{5} - 2}{2\sqrt{5}}}$$



$$\cot \theta = \frac{2}{3}, \sin \theta > 0$$

$$\cot \theta = \frac{\cos \theta}{\sin \theta} \Rightarrow \frac{\cos \theta}{\sin \theta} = \frac{2}{3} \Rightarrow \cos \theta = \frac{2}{3} \sin \theta$$

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1 \Rightarrow \sin^2 \theta + \frac{4}{9} \sin^2 \theta = 1$$

$$\Rightarrow \frac{13}{9} \sin^2 \theta = 1 \Rightarrow \sin \theta = \frac{3}{\sqrt{13}}, \cos \theta = \frac{2}{\sqrt{13}}$$

$$\cos 2\theta = 2 \cos^2 \theta - 1 = 2 \left(\frac{4}{13} \right) - 1 = -\frac{5}{13}$$

$$\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta = 2 \left(\frac{3}{\sqrt{13}} \right) \left(\frac{2}{\sqrt{13}} \right) = \frac{12}{13}$$

$$\sin \frac{\theta}{2} = \sqrt{\frac{1 - \cos \theta}{2}} = \sqrt{\frac{1 - \frac{2}{\sqrt{13}}}{2}} = \sqrt{\frac{\sqrt{13} - 2}{2\sqrt{13}}}$$

$$\cos \frac{\theta}{2} = \sqrt{\frac{1 + \cos \theta}{2}} = \sqrt{\frac{1 + \frac{2}{\sqrt{13}}}{2}} = \sqrt{\frac{\sqrt{13} + 2}{2\sqrt{13}}}$$

5



$$\sec \theta = 3 \Rightarrow \cos \theta = \frac{1}{3}, \quad \sin \theta > 0$$

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1 \Rightarrow \sin \theta = \sqrt{1 - \cos^2 \theta} = \sqrt{1 - \frac{1}{9}} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

$$\cos 2\theta = 2 \cos^2 \theta - 1 = 2\left(\frac{1}{9}\right) - 1 = -\frac{7}{9}$$

$$6 \quad \sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta = 2\left(\frac{2\sqrt{2}}{3}\right)\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{4\sqrt{2}}{9}$$

$$\sin \frac{\theta}{2} = \sqrt{\frac{1 - \cos \theta}{2}} = \sqrt{\frac{1 - \frac{1}{3}}{2}} = \frac{1}{\sqrt{6}}$$

$$\cos \frac{\theta}{2} = \sqrt{\frac{1 + \cos \theta}{2}} = \sqrt{\frac{1 + \frac{1}{3}}{2}} = \frac{2}{\sqrt{6}}$$

$$7 \quad \sin^4 x = (\sin^2 x)^2$$

$$= \left(\frac{1}{2}(1 - \cos 2x)\right)^2$$

$$= \frac{1}{4}(1 - 2 \cos 2x + \cos^2 2x)$$

$$= \frac{1}{4}\left(1 - 2 \cos 2x + \frac{1}{2}(1 + \cos 4x)\right)$$

$$= \frac{3}{8} - \frac{1}{2} \cos 2x + \frac{1}{8} \cos 4x$$



$$\begin{aligned} \cos^4 x &= (\cos^2 x)^2 \\ &= \left(\frac{1}{2}(1 + \cos 2x)\right)^2 \\ &= \frac{1}{4}(1 + 2\cos 2x + \cos^2 2x) \\ &= \frac{1}{4}\left(1 + 2\cos 2x + \frac{1}{2}(1 + \cos 4x)\right) \\ &= \frac{3}{8} + \frac{1}{2}\cos 2x + \frac{1}{8}\cos 4x \end{aligned}$$

$$\cos^4 x \sin^2 x = (\cos^2 x)^2 \sin^2 x$$

$$\begin{aligned} &= \left(\frac{1 + \cos 2x}{2}\right)^2 \left(\frac{1 - \cos 2x}{2}\right) \\ &= \left(\frac{1 + \cos 2x}{2}\right) \left(\frac{1 + \cos 2x}{2}\right) \left(\frac{1 - \cos 2x}{2}\right) \\ &= \left(\frac{1 + \cos 2x}{2}\right) \left(\frac{1 - \cos^2 2x}{4}\right) \\ &= \left(\frac{1 + \cos 2x}{2}\right) \left(\frac{1 - \cos^2 2x}{4}\right) \\ &= \left(\frac{1 + \cos 2x}{2}\right) \left(\frac{1 - \cos 4x}{8}\right) \\ &= \left(\frac{1 + \cos 2x}{2}\right) \left(\frac{1 - \cos 4x}{8}\right) \\ &= \frac{1}{16}(1 + \cos 2x - \cos 4x - \cos 2x \cos 4x) \\ &= \frac{1}{16}\left(1 + \cos 2x - \cos 4x - \frac{1}{2}(\cos 2x + \cos 6x)\right) \\ &= \frac{1}{16} - \frac{1}{32}\cos 2x - \frac{1}{16}\cos 4x - \frac{1}{32}\cos 6x \end{aligned}$$

$$10 \quad \cos 22.5^\circ = \cos \frac{45^\circ}{2} = \sqrt{\frac{1 + \cos 45^\circ}{2}} = \sqrt{\frac{1 + \frac{1}{\sqrt{2}}}{2}} \sqrt{\frac{1 + \sqrt{2}}{2\sqrt{2}}}$$



11

$$\begin{aligned}\sin 195^\circ &= -\sin(195^\circ - 180^\circ) \\&= -\sin 15^\circ = -\sin \frac{30^\circ}{2} = -\sqrt{\frac{1 - \cos 30^\circ}{2}} \\&= -\sqrt{\frac{1 - \frac{\sqrt{3}}{2}}{2}} = -\frac{\sqrt{2 - \sqrt{3}}}{2}\end{aligned}$$

12

$$\begin{aligned}\tan \frac{7\pi}{8} &= -\tan \left(\frac{\pi}{8}\right) = -\sqrt{\frac{1 - \cos \frac{\pi}{4}}{1 + \cos \frac{\pi}{4}}} \\&= -\sqrt{\frac{1 - \frac{1}{\sqrt{2}}}{1 + \frac{1}{\sqrt{2}}}} = -\sqrt{\frac{\sqrt{2} - 1}{\sqrt{2} + 1}} = 1 - \sqrt{2}\end{aligned}$$

13

$$a^2 + 4 = 5 \Rightarrow a = -1$$

لأن النقطة في الربع الثاني

$$\left(-\frac{1}{4}\right)^2 + b^2 = 1 \Rightarrow b = -\frac{\sqrt{15}}{4}$$

لأن النقطة في الربع الثالث

13

$$\sin \alpha = -\frac{\sqrt{15}}{4}, \cos \alpha = -\frac{1}{4}, \tan \alpha = \sqrt{15}$$

$$\sin \theta = \frac{2}{5}, \cos \theta = \frac{-1}{5}, \tan \theta = -2$$

$$g(2\theta) = \cos 2\theta = 2 \cos^2 \theta - 1 = 2 \left(\frac{1}{25}\right) - 1 = -\frac{23}{25}$$

14

$$g\left(\frac{\theta}{2}\right) = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) = \sqrt{\frac{1 + \cos \theta}{2}} = \sqrt{\frac{1 - \frac{1}{5}}{2}} = \frac{2}{\sqrt{10}}$$

15

$$f(2\alpha) = \sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha = 2 \left(-\frac{\sqrt{15}}{4}\right) \left(-\frac{1}{4}\right) = \frac{\sqrt{15}}{8}$$



16	$h\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \tan\left(\frac{\alpha}{2}\right) = -\sqrt{\frac{1 - \cos \theta}{1 + \cos \theta}} = -\sqrt{\frac{1 + \frac{1}{4}}{1 - \frac{1}{4}}} = -\sqrt{\frac{5}{3}}$
17	$\begin{aligned} \sin 2x \cos 3x &= \frac{1}{2}(\sin(2x - 3x) + \sin(2x + 3x)) \\ &= \frac{1}{2}(\sin(-x) + \sin(5x)) \\ &= \frac{1}{2}(-\sin x + \sin(5x)) \\ &= \frac{1}{2}(\sin 5x - \sin x) \end{aligned}$
18	$\begin{aligned} \sin x \sin 5x &= \frac{1}{2}(\cos(x - 5x) - \cos(x + 5x)) \\ &= \frac{1}{2}(\cos(-4x) - \cos(6x)) \\ &= \frac{1}{2}(\cos 4x - \cos 6x) \end{aligned}$
19	$\begin{aligned} 3\cos 4x \cos 7x &= \frac{3}{2}(\cos(4x - 7x) + \cos(4x + 7x)) \\ &= \frac{3}{2}(\cos(-3x) + \cos(11x)) \\ &= \frac{3}{2}(\cos 3x + \cos 11x) \end{aligned}$
20	$\begin{aligned} \sin x - \sin 4x &= 2 \cos \frac{x + 4x}{2} \sin \frac{x - 4x}{2} \\ &= 2 \cos \frac{5x}{2} \sin \frac{-3x}{2} \\ &= -2 \cos \frac{5x}{2} \sin \frac{3x}{2} \end{aligned}$
21	$\cos 9x - \cos 2x = -2 \sin \frac{9x + 2x}{2} \sin \frac{9x - 2x}{2} = -2 \sin \frac{11x}{2} \sin \frac{7x}{2}$



	$\sin 3x + \sin 4x = 2 \sin \frac{3x+4x}{2} \cos \frac{3x-4x}{2}$ 22 $= 2 \sin \frac{7x}{2} \cos \frac{-x}{2}$ $= 2 \sin \frac{7x}{2} \cos \frac{x}{2}$	
23	$L = \frac{10.8}{\sin \theta \cos^2 \theta} = \frac{2}{2} \times \frac{10.8}{\sin \theta \cos \theta} \times \frac{1}{\cos x} = \frac{21.6}{\sin 2x} \times \sec x = \frac{21.6 \sec x}{\sin 2x}$	
24	$L = \frac{10.8}{\sin 30^\circ \cos^2 30^\circ} = 28.8 \text{ cm}$	
25	$\cos 10x = \cos 2(5x) = \cos^2 5x - \sin^2 5x$	
26	$\frac{1}{2}(\sin x \sin 2x + 2 \cos^3 x) = \frac{1}{2}(2\sin^2 x \cos x + 2 \cos^3 x)$ $= \frac{1}{2} \times 2 \cos x (\sin^2 x + \cos^2 x) = \cos x$	
27	$\cos 2x + 2 \cos x + 1 = 2 \cos^2 x - 1 + 2 \cos x + 1$ $= 2 \cos^2 x + 2 \cos x$ $= 2 \cos x (\cos x + 1)$	
28	$\sin 3x = \sin(2x + x) = \sin 2x \cos x + \cos 2x \sin x$ $= 2 \sin x \cos^2 x + (1 - 2\sin^2 x) \sin x$ $= 2 \sin x \cos^2 x + \sin x - 2\sin^3 x$ $= 2 \sin x (1 - \sin^2 x) + \sin x - 2\sin^3 x$ $= 2 \sin x - 2\sin^3 x + \sin x - 2\sin^3 x$ $= 3 \sin x - 4\sin^3 x$	



	$\tan 3x = \tan(2x + x) = \frac{\tan 2x + \tan x}{1 - \tan 2x \tan x}$ $= \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x} + \tan x$ $= \frac{2 \tan x}{1 - \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x} \tan x}$ $= \frac{2 \tan x + \tan x - \tan^3 x}{1 - \tan^2 x - 2 \tan^2 x}$ $= \frac{3 \tan x - \tan^3 x}{1 - 3 \tan^2 x}$
29	
30	$\sin x = 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} = 2 \left(2 \sin \frac{x}{4} \cos \frac{x}{4} \right) \cos \frac{x}{2} = 4 \sin \frac{x}{4} \cos \frac{x}{4} \cos \frac{x}{2}$
31	$\frac{\cos 2x}{\cos^2 x} + \tan^2 x = \frac{2 \cos^2 x - 1}{\cos^2 x} + \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{\cos^2 x + \cos^2 x - 1 + \sin^2 x}{\cos^2 x} = 1$
32	$\cos^2 2x = (\cos 2x)^2 = (2 \cos^2 x - 1)^2 = 4 \cos^4 x - 4 \cos^2 x + 1$
	$\frac{2(\tan x - \cot x)}{\tan^2 x - \cot^2 x} = \frac{2(\tan x - \cot x)}{(\tan x - \cot x)(\tan x + \cot x)}$ $= \frac{2}{(\tan x + \cot x)}$ $= \frac{2}{\frac{\sin x}{\cos x} + \frac{\cos x}{\sin x}}$ $= \frac{2 \sin x \cos x}{\sin^2 x + \cos^2 x}$ $= \sin 2x$
33	
34	$\tan^2 \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right) = \tan^2 \frac{1}{2} \left(x + \frac{\pi}{2} \right)$ $= \frac{1 - \cos \left(x + \frac{\pi}{2} \right)}{1 + \cos \left(x + \frac{\pi}{2} \right)}$ $= \frac{1 - \left(\cos x \cos \frac{\pi}{2} - \sin x \sin \frac{\pi}{2} \right)}{1 + \left(\cos x \cos \frac{\pi}{2} - \sin x \sin \frac{\pi}{2} \right)} = \frac{1 + \sin x}{1 - \sin x}$



35	$\cot^2 \frac{x}{2} = \frac{1 + \cos x}{1 - \cos x} = \frac{\frac{1}{\cos x} + \frac{\cos x}{\cos x}}{\frac{1}{\cos x} - \frac{\cos x}{\cos x}} = \frac{\sec x + 1}{\sec x - 1}$
36	$\begin{aligned}\frac{1}{2}(\ln 1 - \cos 2x - \ln 2) &= \frac{1}{2} \ln \frac{ 1 - \cos 2x }{2} \\ &= \frac{1}{2} \ln \left \frac{1 - \cos 2x}{2} \right = \frac{1}{2} \ln \sin^2 x = \ln \sin x \end{aligned}$
37	$\sin \theta = \frac{y}{1} = y, \cos \theta = \frac{x}{1} = x$ $A = 2xy = 2 \sin \theta \cos \theta$
38	$A = 2 \sin \theta \cos \theta = \sin 2\theta$
39	$\cos 4x = 1 - 2 \sin^2 2x = 1 - 2(2 \sin x \cos x)^2 = 1 - 8 \sin^2 x \cos^2 x$
40	$\begin{aligned}\cos^4 x &= (\cos^2 x)^2 = \left(\frac{1 + \cos 2x}{2} \right)^2 = \frac{1}{4}(1 + \cos 2x)^2 \\ &= \frac{1}{4}(1 + 2\cos 2x + \cos^2 x) \\ &= \frac{1}{4} \left(1 + 2\cos 2x + \frac{1 + \cos 4x}{2} \right) \\ &= \frac{1}{4} \left(1 + 2\cos 2x + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos 4x \right) \\ &= \frac{1}{4} \left(\frac{3}{2} + 2\cos 2x + \frac{1}{2} \cos 4x \right) \\ &= \frac{1}{8}(3 + 4\cos 2x + \cos 4x)\end{aligned}$



الدرس الثالث: حل المعادلات المثلثية

مسألة اليوم صفحة 61

$$M(\theta) = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{64} \Rightarrow \frac{160000 \sin^2 \theta}{64} = 625$$

$$\Rightarrow \sin^2 \theta = \frac{1}{4} \Rightarrow \sin \theta = \frac{1}{2} \Rightarrow \theta = 30^\circ$$

أتحقق من فهمي صفحة 63

a $\sin x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

$$x = \frac{4\pi}{3} + 2k\pi, x = \frac{7\pi}{3} + 2k\pi, \quad \text{عدد صحيح } k$$

b $\cos x = \frac{1}{2}$

$$x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi, x = \frac{7\pi}{3} + 2k\pi, \quad \text{عدد صحيح } k$$

أتحقق من فهمي صفحة 64

a $\sin x = 0.23$

$$x \approx 0.23 + 2k\pi, x \approx 2.91 + 2k\pi, \quad \text{عدد صحيح } k$$

b $\tan x = -10$

$$x \approx 1.67 + k\pi, x \approx -1.47 + k\pi, \quad \text{عدد صحيح } k$$

أتحقق من فهمي صفحة 66

a $5 \sin x = 3 \sin x + \sqrt{3} \Rightarrow \sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$$x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi, x = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi, \quad \text{عدد صحيح } k$$



b	$2 \cos^2 x - 1 = 0 \Rightarrow \cos x = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$	$x = \frac{\pi}{4} + 2k\pi, x = \frac{3\pi}{4} + 2k\pi, x = \frac{5\pi}{4} + 2k\pi, x = \frac{7\pi}{4} + 2k\pi$	عدد صحيح k
---	--	---	--------------

أتحقق من فهمي صفحة 67

a	$2 \sin^2 x - \sin x - 1 = 0 \Rightarrow (2 \sin x + 1)(\sin x - 1) = 0 \Rightarrow \sin x = -\frac{1}{2}, 1$	$x = \frac{7\pi}{6} + 2k\pi, x = \frac{11\pi}{6} + 2k\pi, x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$	عدد صحيح k
b	$\sin x \cos x = 2 \sin x \Rightarrow \sin x \cos x - 2 \sin x = 0$ $\Rightarrow \sin x (\cos x - 2) = 0 \Rightarrow \sin x = 0$ $x = 2k\pi, x = \pi + 2k\pi$	عدد صحيح k	

أتحقق من فهمي صفحة 69

a	$2 \sin^2 x - 3 \cos x = 0 \Rightarrow 2(1 - \cos^2 x) - 3 \cos x = 0$ $\Rightarrow -2 \cos^2 x - 3 \cos x + 2 = 0$ $\Rightarrow 2 \cos^2 x + 3 \cos x - 2 = 0$ $\Rightarrow (2 \cos x - 1)(\cos x + 2) = 0$ $\Rightarrow \cos x = \frac{1}{2}$ $x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi, x = \frac{11\pi}{6} + 2k\pi$	عدد صحيح k
---	---	--------------

b	$2 \sin 2x - 3 \sin x = 0 \Rightarrow 2 \sin x \cos x - 3 \sin x = 0$ $\Rightarrow \sin x (2 \cos x - 3) = 0$ $\Rightarrow \sin x = 0$ $x = 2k\pi, x = \pi + 2k\pi$	عدد صحيح k
---	--	--------------

أتحقق من فهمي صفحة 70



$$\begin{aligned}\cos x - \sin x &= 1 \Rightarrow (\cos x - \sin x)^2 = 1 \\ &\Rightarrow \cos^2 x - 2 \sin x \cos x + \sin^2 x = 1 \\ &\Rightarrow 1 - 2 \sin x \cos x = 1 \\ &\Rightarrow -2 \sin x \cos x = 0 \\ &\Rightarrow \sin x = 0, \cos x = 0 \\ x &= 0, x = \frac{3\pi}{2} \quad (\text{بقية الحلول لا تتحقق المعادلة الأصلية})\end{aligned}$$

أتحقق من فهمي صفة 71

$$\begin{aligned}2 \cos 2x &= 1 \Rightarrow \cos 2x = \frac{1}{2} \\ &\Rightarrow 2x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi, \quad 2x = \frac{5\pi}{3} + 2k\pi \\ &\Rightarrow x = \frac{\pi}{6} + k\pi, \quad x = \frac{5\pi}{6} + k\pi \\ x &= \frac{\pi}{6} + (0)\pi = \frac{\pi}{6}, \quad x = \frac{\pi}{6} + (1)\pi = \frac{7\pi}{6} \\ x &= \frac{5\pi}{6} + (0)\pi = \frac{5\pi}{6}, \quad x = \frac{5\pi}{6} + (1)\pi = \frac{11\pi}{6}\end{aligned}$$

حلول المعادلة هي:

$$x = \frac{\pi}{6}, \quad x = \frac{5\pi}{6}, \quad x = \frac{7\pi}{6}, \quad x = \frac{11\pi}{6}$$

أتحقق من فهمي صفة 72



$$2 \cos \frac{x}{2} - 1 = 0 \Rightarrow \cos \frac{x}{2} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{x}{2} = \frac{\pi}{3} + 2k\pi , \quad \frac{x}{2} = \frac{5\pi}{3} + 2k\pi$$

$$\Rightarrow x = \frac{2\pi}{3} + 4k\pi , \quad x = \frac{10\pi}{3} + 4k\pi$$

$$x = \frac{2\pi}{3} + 4(0)\pi = \frac{2\pi}{3}$$

$$x = \frac{10\pi}{3} + 4(0)\pi = \frac{5\pi}{6}$$

$$x = \frac{2\pi}{3} , \quad x = \frac{10\pi}{3}$$

حلول المعادلة هي:

أتدرب وأحل المسائل صفحه 72

$$2 \sin x + 3 = 2 \Rightarrow \sin x = -\frac{1}{2}$$

$$x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi , \quad x = \frac{11\pi}{6} + 2k\pi \quad \text{عدد صحيح } k$$

$$1 - \cos x = \frac{1}{2} \Rightarrow \cos x = \frac{1}{2}$$

$$x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi , \quad x = \frac{5\pi}{3} + 2k\pi \quad \text{عدد صحيح } k$$

$$\sin x = -0.3$$

$$x = 3.45 + 2k\pi , \quad x = 5.98 + 2k\pi , \quad \text{عدد صحيح } k$$

$$\cos x = 0.32$$

$$x = 1.25 + 2k\pi , \quad x = 5.04 + 2k\pi , \quad \text{عدد صحيح } k$$

$$\tan x = 5$$

$$x = 1.37 + k\pi , \quad x = -1.37 + k\pi , \quad \text{عدد صحيح } k$$



	$\sec^2 x - 2 = 0 \Rightarrow \sec^2 x = 2 \Rightarrow \sec x = \pm\sqrt{2} \Rightarrow \cos x = \pm\frac{1}{2}$
6	$x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi , x = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi$ $x = \frac{4\pi}{3} + 2k\pi , x = \frac{5\pi}{3} + 2k\pi$ عدد صحيح k
7	$\cot x + 1 = 0 \Rightarrow \cot x = -1 \Rightarrow \tan x = -1$ $x = -\frac{\pi}{4} + k\pi$ عدد صحيح k
8	$\csc^2 x - 4 = 0 \Rightarrow \csc^2 x = 4 \Rightarrow \csc x = \pm 2 \Rightarrow \sin x = \pm\frac{1}{2}$ $x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi , x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$ $x = \frac{7\pi}{6} + 2k\pi , x = \frac{11\pi}{6} + 2k\pi$ عدد صحيح k
9	$3\sqrt{2} \cos x + 2 = -1 = 0 \Rightarrow \cos x = -\frac{1}{\sqrt{2}}$ $x = \frac{3\pi}{4} + 2k\pi , x = \frac{5\pi}{4} + 2k\pi$ عدد صحيح k
10	$\cos^2 x - \sin^2 x + \sin x = 0 \Rightarrow 1 - \sin^2 x - \sin^2 x + \sin x = 0$ $\Rightarrow -2 \sin^2 x + \sin x + 1 = 0$ $\Rightarrow 2 \sin^2 x - \sin x - 1 = 0$ $\Rightarrow (2 \sin x + 1)(\sin x - 1) = 0$ $\Rightarrow \sin x = -\frac{1}{2}, 1$ $x = \frac{7\pi}{6} , x = \frac{11\pi}{6} , x = \frac{\pi}{2}$



	$3 \sin^2 x - 7 \sin x + 2 = 0 \Rightarrow (3 \sin x - 1)(\sin x - 2) = 0$
11	$\Rightarrow \sin x = \frac{1}{3}$ $x = 0.34, x = 2.8$
	$2 \cos^2 x + \cos x = 0 \Rightarrow \cos x (2 \cos x + 1) = 0$
12	$\Rightarrow \cos x = -\frac{1}{2}, 0$ $x = \frac{\pi}{2}, x = \frac{3\pi}{2}, x = \frac{2\pi}{3}, x = \frac{4\pi}{3}$
	$\tan^4 x - 13 \tan^2 x + 36 = 0 \Rightarrow (\tan^2 x - 9)(\tan^2 x - 4) = 0$
13	$\Rightarrow \tan^2 x = 4, 9$ $\Rightarrow \tan x = \pm 2, \pm 3$ $x = 1.11, x = 2.03, x = 4.25, x = 5.18$ $x = 1.25, x = 1.89, x = 4.39, x = 5.03$
	$\sin x + 2 \sin x \cos x = 0 \Rightarrow \sin x (1 + 2 \cos x) = 0$
14	$\Rightarrow \sin x = 0, \cos x = -\frac{1}{2}$ $x = 0, x = \pi, x = \frac{2\pi}{3}, x = \frac{4\pi}{3}$
	$\tan^2 x \cos x = \tan^2 x \Rightarrow \tan^2 x \cos x - \tan^2 x = 0$
15	$\Rightarrow \tan^2 x (\cos x - 1) = 0$ $\Rightarrow \tan x = 0, \cos x = 1$ $x = 0, x = \pi$



	$\begin{aligned} 2 \cos^2 x + \sin x = 1 &\Rightarrow 2(1 - \sin^2 x) + \sin x = 1 \\ &\Rightarrow -2 \sin^2 x + \sin x + 1 = 0 \\ &\Rightarrow 2 \sin^2 x - \sin x - 1 = 0 \\ &\Rightarrow (2 \sin x + 1)(\sin x - 1) = 0 \\ &\Rightarrow \sin x = -\frac{1}{2}, \sin x = 1 \end{aligned}$ $x = \frac{7\pi}{6}, \quad x = \frac{11\pi}{6}, \quad x = \frac{\pi}{2}$
16	$\begin{aligned} \tan^2 x - 2 \sec x = 2 &\Rightarrow \tan^2 x - 2 \sec x - 2 = 0 \\ &\Rightarrow \sec^2 x - 1 - 2 \sec x - 2 = 0 \\ &\Rightarrow \sec^2 x - 2 \sec x - 3 = 0 \\ &\Rightarrow (\sec x - 3)(\sec x + 1) = 0 \\ &\Rightarrow \sec x = 3, \sec x = -1 \\ &\Rightarrow \cos x = \frac{1}{3}, \cos x = -1 \end{aligned}$ $x = \pi, \quad x = 1.23, \quad x = 5.05$
17	$\begin{aligned} \csc^2 x = \cot x + 3 &\Rightarrow \csc^2 x - \cot x - 3 = 0 \\ &\Rightarrow \cot^2 x + 1 - \cot x - 3 = 0 \\ &\Rightarrow \cot^2 x - \cot x - 2 = 0 \\ &\Rightarrow (\cot x - 2)(\cot x + 1) = 0 \end{aligned}$ $\begin{aligned} &\Rightarrow \cot x = 2, \cot x = -1 \\ &\Rightarrow \tan x = \frac{1}{2}, \tan x = -1 \end{aligned}$ $x = 0.46, \quad x = 3.61, \quad x = \frac{3\pi}{4}, \quad x = \frac{7\pi}{4}$
18	$\begin{aligned} \sin 2x = 3 \cos 2x &\Rightarrow \tan 2x = 3 \\ &\Rightarrow 2x = 1.25, 2x = 4.39, \quad 2x = 7.53, \quad 2x = 10.67 \end{aligned}$ $x = 0.62, \quad x = 2.2, \quad x = 3.77, \quad x = 5.34$
19	



$$4 \sin x \cos x + 2 \sin x - 2 \cos x - 1 = 0$$

$$\Rightarrow 2 \sin x (2 \cos x + 1) - (2 \cos x + 1) = 0$$

$$\Rightarrow (2 \sin x - 1)(2 \cos x + 1) = 0$$

20

$$\Rightarrow \sin x = \frac{1}{2}, \cos x = -\frac{1}{2}$$

$$x = \frac{\pi}{6}, \quad x = \frac{5\pi}{6}, \quad x = \frac{2\pi}{3}, \quad x = \frac{4\pi}{3}$$

$$F = \frac{1}{2}(1 - \cos \theta), \quad 0^\circ \leq \theta \leq 360^\circ$$

21

$$F = 0 \Rightarrow \frac{1}{2}(1 - \cos \theta) = 0 \Rightarrow \cos \theta = 1 \Rightarrow \theta = 0^\circ$$

22

$$F = 0.25 \Rightarrow \frac{1}{2}(1 - \cos \theta) = 0.25 \Rightarrow \cos \theta = \frac{1}{2} \Rightarrow \theta = 60^\circ, \quad \theta = 300^\circ$$

23

$$F = 1 \Rightarrow \frac{1}{2}(1 - \cos \theta) = 1 \Rightarrow \cos \theta = -1 \Rightarrow \theta = 180^\circ$$

$$y = 4e^{-3t} \sin 2\pi t$$

$$y = 0 \Rightarrow 4e^{-3t} \sin 2\pi t = 0 \Rightarrow \sin 2\pi t = 0$$

24

$$\Rightarrow 2\pi t = 0 + 2k\pi, 2\pi t = \pi + 2k\pi$$

$$t = k, \quad t = \frac{1}{2} + k, \quad \text{عدد صحيح } k$$

$$\sin 2x + \cos x = 0 \Rightarrow 2 \sin x \cos x + \cos x = 0$$

$$\Rightarrow \cos x (2 \sin x + 1) = 0$$

25

$$\Rightarrow \cos x = 0, \sin x = -\frac{1}{2}$$

$$x = \frac{\pi}{2}, \quad x = \frac{3\pi}{2}, \quad x = \frac{7\pi}{6}, \quad x = \frac{11\pi}{6}$$



$$\tan \frac{x}{2} - \sin x = 0 \Rightarrow \frac{\sin \frac{x}{2}}{\cos \frac{x}{2}} - 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} = 0$$
$$\Rightarrow \sin \frac{x}{2} - 2 \sin \frac{x}{2} \cos^2 \frac{x}{2} = 0$$
$$\Rightarrow \sin \frac{x}{2} \left(1 - 2 \cos^2 \frac{x}{2}\right) = 0$$

26

$$\Rightarrow \sin \frac{x}{2} = 0, \cos^2 \frac{x}{2} = \frac{1}{2}$$
$$\Rightarrow \sin \frac{x}{2} = 0, \cos \frac{x}{2} = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\frac{x}{2} = 0, \quad \frac{x}{2} = \frac{\pi}{4}, \quad \frac{x}{2} = \frac{3\pi}{4}$$
$$x = 0, \quad x = \frac{\pi}{2}, \quad x = \frac{3\pi}{2}$$

$$2 \sin^2 x = 2 + \cos 2x \Rightarrow 2 \sin^2 x = 2 + 1 - 2 \sin^2 x$$

$$\Rightarrow 4 \sin^2 x - 3 = 0$$

27

$$\Rightarrow \sin^2 x = \frac{3}{4}$$

$$\Rightarrow \sin x = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$x = \frac{\pi}{6}, \quad x = \frac{5\pi}{6}, \quad x = \frac{7\pi}{6}, \quad x = \frac{11\pi}{6}$$



$$2 \sin^2 \frac{x}{2} - 3 \cos \frac{x}{2} = 0 \Rightarrow 2 \left(1 - \cos^2 \frac{x}{2}\right) - 3 \cos \frac{x}{2} = 0$$

$$\Rightarrow -2 \cos^2 \frac{x}{2} - 3 \cos \frac{x}{2} + 2 = 0$$

$$\Rightarrow 2 \cos^2 \frac{x}{2} + 3 \cos \frac{x}{2} - 2 = 0$$

$$\Rightarrow \left(2 \cos \frac{x}{2} - 1\right) \left(\cos \frac{x}{2} + 2\right) = 0$$

$$\Rightarrow \cos \frac{x}{2} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{x}{2} = \frac{\pi}{3},$$

$$\frac{x}{2} = \frac{5\pi}{3}$$

$$x = \frac{2\pi}{3},$$

$$x = \frac{10\pi}{3}$$

28

$$\sin x - \sqrt{3} \cos x = 0 \Rightarrow \sin x = \sqrt{3} \cos x$$

$$\Rightarrow \tan x = \sqrt{3}$$

29

$$x = \frac{\pi}{3},$$

$$x = \frac{4\pi}{3}$$

$$\cos 2x = \cos x \Rightarrow 2 \cos^2 x - 1 = \cos x$$

$$\Rightarrow 2 \cos^2 x - \cos x - 1 =$$

$$\Rightarrow (2 \cos x + 1)(\cos x - 1) =$$

$$\Rightarrow \cos x = -\frac{1}{2}, \cos x = 1$$

30

$$x = 0,$$

$$x = \frac{2\pi}{3}, \quad x = \frac{4\pi}{3}$$



	$\tan x + \frac{k}{\tan x} = 2$ $\tan^2 x + k = 2 \tan x$ $\tan^2 x - 2 \tan x + k = 0$ $\Delta = b^2 - 4ac = 4 - 4k$ $\Delta < 0 \Rightarrow 4 - 4k < 0 \Rightarrow k > 1$ <p>إذا كان $k > 1$ فإن المميز يكون سالباً، والمعادلة لا حل لها.</p>	
31	$\tan^2 x - 2 \tan x - 8 = 0$ $(\tan x - 4)(\tan x + 2) = 0$ $\tan x = 4 \quad \text{أو} \quad \tan x = -2$ $x = 1.33, \quad x = -1.82, \quad x = -1.11, \quad x = 2.03$	
32	$\sin(\cos x) = 0$ $\cos x = 0 \quad \text{أو} \quad \cos x = \pi$ $\cos x = 0 \Rightarrow x = \frac{\pi}{2}, \quad x = \frac{3\pi}{2}$ <p>لا يوجد حل للمعادلة $\cos x = \pi$ لأن القيمة العظمى لـ $\cos x$ هي 1</p>	
33	$\tan x + \cot x = 5$ $\tan x + \frac{1}{\tan x} - 5 = 0$ $\tan^2 x - 5 \tan x + 1 = 0$ $\tan x = \frac{5 \pm \sqrt{21}}{2}$ $x = 1.37, \quad x = 4.51, \quad x = 0.21, \quad x = 3.35$	
34		



اختبار نهاية الوحدة الثانية

1	b		
2	b		
3	d		
4	c		
5	d		
6	b		
7	d		
8	b		
9	b		
10	d		
11	$3 \cos 37.5^\circ \sin 37.5^\circ = \frac{3}{2} \sin 75^\circ$ $= \frac{3}{2} \sin \frac{1}{2} 150^\circ = \frac{3}{2} \sqrt{\frac{1 - \cos 150^\circ}{2}}$ $= \frac{3}{2} \sqrt{\frac{1 + \frac{\sqrt{3}}{2}}{2}} = \frac{3}{2} \frac{\sqrt{2 + \sqrt{3}}}{2} = \frac{3\sqrt{2 + \sqrt{3}}}{4}$		
12	$\cos \frac{\pi}{12} + \cos \frac{5\pi}{12} = 2 \cos \left(\frac{\frac{\pi}{12} + \frac{5\pi}{12}}{2} \right) \cos \left(\frac{\frac{\pi}{12} - \frac{5\pi}{12}}{2} \right) = 2 \cos \frac{\pi}{4} \cos \frac{\pi}{6} = \sqrt{\frac{3}{2}}$		



13	$\begin{aligned}\cos 255^\circ - \cos 195^\circ &= -2 \sin\left(\frac{255^\circ + 195^\circ}{2}\right) \sin\left(\frac{255^\circ - 195^\circ}{2}\right) \\ &= -2 \sin 225^\circ \sin 30^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}}\end{aligned}$
14	$A = (20 \cos x)(20 \sin x) = 200(2 \cos x \sin x) = 200 \sin 2x$
15	$\begin{aligned}\frac{\sin(x+y) - \sin(x-y)}{\cos(x+y) + \cos(x-y)} &= \frac{2 \cos\left(\frac{x+y+x-y}{2}\right) \sin\left(\frac{x+y-x+y}{2}\right)}{2 \cos\left(\frac{x+y+x-y}{2}\right) \cos\left(\frac{x+y-x+y}{2}\right)} \\ &= \frac{2 \cos x \sin y}{2 \cos x \cos y} = \tan y\end{aligned}$
16	$\begin{aligned}4(\sin^6 x + \cos^6 x) &= 4(\sin^2 x + \cos^2 x)(\sin^4 x - \sin^2 x \cos^2 x + \cos^4 x) \\ &= 4(\sin^4 x - \sin^2 x \cos^2 x + \cos^4 x) \\ &= 4((\sin^2 x)^2 - \sin^2 x \cos^2 x + (\cos^2 x)^2) \\ &= 4\left(\left(\frac{1 - \cos 2x}{2}\right)^2 - (\sin x \cos x)^2 + \left(\frac{1 + \cos 2x}{2}\right)^2\right) \\ &= 4\left(\frac{1}{4}(1 - 2 \cos 2x + \cos^2 2x) - \left(\frac{1}{2} \sin 2x\right)^2 + \frac{1}{4}(1 + 2 \cos 2x + \cos^2 2x)\right) \\ &= 4\left(\frac{1}{4} - \frac{1}{2} \cos 2x + \frac{1}{4} \cos^2 2x - \frac{1}{4} \sin^2 2x + \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \cos 2x + \frac{1}{4} \cos^2 2x\right) \\ &= 4\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos^2 2x - \frac{1}{4} \sin^2 2x\right) \\ &= 4\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}(1 - \sin^2 2x) - \frac{1}{4} \sin^2 2x\right) \\ &= 4 - 3 \sin^2 2x\end{aligned}$
17	$\begin{aligned}\frac{1}{2}(\ln 1 + \cos 2x - \ln 2) &= \frac{1}{2} \ln \frac{ 1 + \cos 2x }{2} \\ &= \frac{1}{2} \ln \left \frac{1 + \cos 2x}{2} \right = \frac{1}{2} \ln \cos^2 x = \ln \cos x \end{aligned}$



18	$\sec 2x = \frac{1}{\cos 2x} = \frac{1}{2\cos^2 x - 1} = \frac{\frac{1}{\cos^2 x}}{2\cos^2 x - 1} = \frac{\sec^2 x}{2 - \sec^2 x}$
19	$\csc x - \cot x = \frac{1}{\sin x} - \frac{\cos x}{\sin x} = \frac{1 - \cos x}{\sin x} = \frac{1 - (1 - 2\sin^2 \frac{x}{2})}{2\sin \frac{x}{2}\cos \frac{x}{2}} = \frac{\sin \frac{x}{2}}{\cos \frac{x}{2}} = \tan \frac{x}{2}$
20	$\cos x = \frac{4}{5} \Rightarrow \sin x = \frac{3}{5}$ $\cos(\theta + \frac{\pi}{4}) = \cos \theta \cos \frac{\pi}{4} - \sin \theta \sin \frac{\pi}{4} = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{4}{5}\right) - \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{3}{5}\right) = \frac{1}{5\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{10}$
21	$\frac{\sec x - \cos x}{\sec x} = \frac{\frac{1}{\cos x} - \cos x}{\frac{1}{\cos x}} = 1 - \cos^2 x = \sin^2 x$
22	$(\sin x + \cos x)^4 = ((\sin x + \cos x)^2)^2$ $= (\sin^2 x + 2\sin x \cos x + \cos^2 x)^2$ $= (1 + 2\sin x \cos x)^2$
23	$\frac{\cot x \cot y - 1}{\cot x + \cot y} = \frac{\frac{1}{\tan x} \times \frac{1}{\tan y} - 1}{\frac{1}{\tan x} + \frac{1}{\tan y}} \times \frac{\tan x \tan y}{\tan x \tan y}$ $= \frac{1 - \tan x \tan y}{\tan x + \tan y} = \cot(x + y)$
24	$\frac{\sin x \sec x}{\tan x} = \frac{\sin x \times \frac{1}{\cos x}}{\frac{\sin x}{\cos x}} = \frac{\sin x}{\sin x} = 1$
25	$\ln \sec \theta = \ln \left \frac{1}{\cos \theta} \right = \ln \frac{1}{ \cos \theta } = \ln 1 - \ln \cos \theta = -\ln \cos \theta $



	$\tan(-15^\circ) = -\tan 15^\circ = -\tan \frac{1}{2}(30^\circ)$
26	$= -\sqrt{\frac{1 - \cos 30^\circ}{1 + \cos 30^\circ}} = -\sqrt{\frac{1 - \frac{\sqrt{3}}{2}}{1 + \frac{\sqrt{3}}{2}}} = -\sqrt{\frac{2 - \sqrt{3}}{2 + \sqrt{3}}} = -2 + \sqrt{3}$
27	$\sin \frac{7\pi}{12} = \sin \frac{1}{2}\left(\frac{7\pi}{6}\right) = \sqrt{\frac{1 - \cos \frac{7\pi}{6}}{2}} = \sqrt{\frac{1 + \frac{\sqrt{3}}{2}}{2}} = \frac{\sqrt{2 + \sqrt{3}}}{2}$
28	$\frac{\tan 20^\circ + \tan 25^\circ}{1 - \tan 20^\circ \tan 25^\circ} = \tan(20^\circ + 25^\circ) = \tan 45^\circ = 1$
29	$\cos \frac{5\pi}{12} \cos \frac{7\pi}{12} - \sin \frac{5\pi}{12} \sin \frac{7\pi}{12} = \cos\left(\frac{5\pi}{12} + \frac{7\pi}{12}\right) = \cos \pi = -1$
30	$\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) - \sin\left(\frac{\pi}{4} - x\right) = 0 \Rightarrow \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{4} - x\right)$ حلول هذه المعادلة هي الإحداثيات ل نقاط تقاطع منحنبي الاقترانين في الشكل المرفق، $x = 0, x = \pi, x = 2\pi$
31	$\cos^2 5x - \sin^2 5x = \cos 2(5x) = \cos 10x$
32	$2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} = \sin 2\left(\frac{x}{2}\right) = \sin x$
33	$\sqrt{\frac{1 - \cos 8x}{2}} = \sin \frac{1}{2}(8x) = \sin 4x$
34	$4 \sin x - 3 = 0 \Rightarrow \sin x = \frac{3}{4}$ $x \approx 0.85, x \approx 2.29$



$$\frac{1 - \cos x}{1 + \cos x} = 3 \Rightarrow 1 - \cos x = 3 + 3 \cos x$$

$$\Rightarrow 4 \cos x = -2$$

$$\Rightarrow \cos x = -\frac{1}{2}$$

35

$$x = \frac{2\pi}{3}, \quad x = \frac{4\pi}{3}$$

$$\cos x \sin x - \sin x = 0 \Rightarrow \sin x (\cos x - 1) = 0$$

$$\Rightarrow \sin x = 0, \cos x = 1$$

36

$$x = 0, \quad x = \pi$$

$$\sin x - 2 \sin^2 x = 0 \Rightarrow \sin x (1 - 2 \sin x) = 0$$

$$\Rightarrow \sin x = 0, \sin x = \frac{1}{2}$$

37

$$x = 0, \quad x = \pi, \quad x = \frac{\pi}{6}, \quad x = \frac{5\pi}{6}$$

$$\sin x - \cos x - \tan x = -1 \Rightarrow \sin x - \cos x - \tan x + 1 = 0$$

$$\Rightarrow \cos x \left(\frac{\sin x}{\cos x} - 1 \right) - (\tan x - 1) = 0$$

$$\Rightarrow \cos x (\tan x - 1) - (\tan x - 1) = 0$$

$$\Rightarrow (\cos x - 1)(\tan x - 1) = 0$$

$$\Rightarrow \cos x = 1, \tan x = 1$$

38

$$x = 0, \quad x = \frac{\pi}{4}, \quad x = \frac{5\pi}{4}$$



$$\sin x - \cos x = \frac{1}{2} \Rightarrow (\sin x - \cos x)^2 = \frac{1}{4}$$

$$\Rightarrow \sin^2 x - 2 \sin x \cos x + \cos^2 x = \frac{1}{4}$$

$$\Rightarrow 1 - \sin 2x = \frac{1}{4}$$

$$\Rightarrow \sin 2x = \frac{3}{4}$$

$$\Rightarrow 2x = 0.85 + 2k\pi,$$

$$2x = 2.29 + 2k\pi$$

$$\Rightarrow x = 0.425 + k\pi,$$

$$x = 1.145 + k\pi$$

39

$$x \approx 3.57, x \approx 1.15$$

$$\tan 3x + 1 = \sec 3x \Rightarrow (\tan 3x + 1)^2 = \sec^2 3x$$

$$\Rightarrow \tan^2 3x + 2 \tan 3x + 1 = \sec^2 3x$$

$$\Rightarrow \sec^2 3x + 2 \tan 3x = \sec^2 3x$$

$$\Rightarrow \tan 3x = 0$$

$$\Rightarrow 3x = k\pi$$

$$\Rightarrow x = \frac{k\pi}{3}$$

$$x = 0, \quad x = \frac{2\pi}{3}, \quad x = \frac{4\pi}{3}$$

40



الوحدة الثالثة: التفاضل وتطبيقاته

الدرس الأول: مشتقة اقترانات خاصة

مسألة اليوم صفحة 78

$$x(t) = 8 \sin t \rightarrow x\left(\frac{2}{3}\pi\right) = 8 \sin\left(\frac{2}{3}\pi\right) = 4\sqrt{3} \text{ cm}$$

$$1 \quad v(t) = \frac{dx}{dt} = 8 \cos t \rightarrow v\left(\frac{2}{3}\pi\right) = 8 \cos\left(\frac{2}{3}\pi\right) = -4 \text{ cm/s}$$

$$a(t) = \frac{dv}{dt} = -8 \sin t \rightarrow a\left(\frac{2}{3}\pi\right) = -8 \sin\left(\frac{2}{3}\pi\right) = -4\sqrt{3} \text{ cm/s}^2$$

بما أن إشارة السرعة سالبة، فإن الجسم يتحرك في الاتجاه السالب عندما

$t = \frac{2}{3}\pi$

أتحقق من فهمي صفحة 80

a $f(x) = 5e^x + 3$
 $f'(x) = 5e^x$

b $f(x) = \sqrt{x} - 4e^x = x^{\frac{1}{2}} - 4e^x$
 $f'(x) = \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}} - 4e^x = \frac{1}{2\sqrt{x}} - 4e^x$

c $y = 8e^x + \frac{4}{\sqrt[5]{x}} = 8e^x + 4x^{-\frac{1}{5}}$
 $y' = \frac{dy}{dx} = 8e^x - \frac{4}{5}x^{-\frac{6}{5}} = 8e^x - \frac{4}{5\sqrt[5]{x^6}}$



أتحقق من فهمي صفحة 82

a) $f(x) = \sqrt{x} + \ln(4x) = x^{\frac{1}{2}} + \ln 4 + \ln x$

$$f'(x) = \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}} + 0 + \frac{1}{x} = \frac{1}{2\sqrt{x}} + \frac{1}{x}$$

b) $f(x) = \ln(2x^3) = \ln 2 + 3 \ln x$

$$f'(x) = \frac{3}{x}$$

أتحقق من فهمي صفحة 84

a) $y = \frac{\sin x}{2} + 3 \cos x = \frac{1}{2} \sin x + 3 \cos x$

$$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{1}{2} \cos x - 3 \sin x$$

b) $f(x) = x^2 + \cos x + \sin \frac{\pi}{2}$

$$f'(x) = 2x - \sin x + 0 = 2x - \sin x$$

أتحقق من فهمي صفحة 85

$f(x) = \ln \sqrt{x} = \frac{1}{2} \ln x \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{2x}$

$$f'(e) = \frac{1}{2e}$$

$$y - \frac{1}{2} = \frac{1}{2e}(x - e)$$

$$y = \frac{1}{2e}x$$

ميل المماس عند النقطة $(e, \frac{1}{2})$ هو :

معادلة المماس عند النقطة $(e, \frac{1}{2})$ هي :

بما أن ميل المماس عند النقطة $(e, \frac{1}{2})$ هو $\frac{1}{2e}$ إذن ميل العمودي على المماس عندها هو $-2e$

معادلة العمودي على المماس عند النقطة $(e, \frac{1}{2})$ هي :

$$y - \frac{1}{2} = -2e(x - e)$$

$$y = -2ex + 2e^2 + \frac{1}{2}$$



أتحقق من فهمي صفحة 88

	$s(t) = t^2 - 7t + 8$	
a	$v(t) = 2t - 7 \Rightarrow v(4) = 1 \text{ m/s}$ $a(t) = 2 \Rightarrow a(4) = 2 \text{ m/s}^2$	
b	$v(t) = 2t - 7 = 0 \Rightarrow t = \frac{7}{2} \text{ s}$	
c	$v(2) = -3 \text{ m/s}$ بما أن إشارة السرعة سالبة، فإن الجسم يتحرك في الاتجاه السالب عندما $t = 2$	
d	$s(t) = 8 \Rightarrow t^2 - 7t + 8 = 8 \Rightarrow t^2 - 7t = 0$ $t(t - 7) = 0 \Rightarrow t = 0, t = 7$ إذن يعود الجسم إلى موقعه الابتدائي عندما $s = 7 \text{ m}$ ، أي بعد 7 ثوانٍ من بدء حركته.	$s(0) = 8 \text{ m}$ الموقع الابتدائي للجسم:

أتحقق من فهمي صفحة 90

	$s(t) = 7 \sin t$	
a	$v(t) = 7 \cos t$ $a(t) = -7 \sin t$	
b	بالنظر لاقتران الموقع $s(t)$ فإن قيم s تحصر بين $-7 \leq s \leq 7$ وهذا يعني أن الجسم يتحرك بمرور الزمن صعوداً وهبوطاً بين الموقعين $s = -7 \text{ m}$, $s = 7 \text{ m}$ ، ويمر ب نقطة الاتزان $s = 0$ عند قيم t التي تحقق $\cos t = 0$ وهي $t = n\pi$ حيث n أي عدد صحيح غير سالب. تتغير سرعة الجسم بمرور الزمن وتتراوح بين القيمتين -7 m/s و 7 m/s ويكون مقدار سرعة الجسم القياسية أكبر ما يمكن $ 7 \cos t = 7$ عندما $\cos t = \pm 1$ وذلك عندما $t = n\pi$ (نفسها لحظات مرور الجسم ب نقطة الاتزان)، بينما تكون سرعة الجسم صفرًا (يسكن لحظياً) عندما يكون الجسم في أقصى بعده عن نقطة الاتزان $(\text{عندما } s(t) = 7 \rightarrow v(t) = 0)$ حيث n عدد فردي موجب)	نلاحظ أن قيمة تسارع الجسم عند كل لحظة هي معكوس قيمة موقعه وأن التسارع ينعدم لحظة مرور الجسم ب نقطة الاتزان، وهي اللحظة التي تكون محصلة القوى المؤثرة على الجسم فيها صفرًا.

أتدرب وأحل المسائل صفحة 90

1	$f'(x) = 2 \cos x - e^x$	
2	$f'(x) = \frac{1}{4x} + \pi \sin x$	
3	$f(x) = \ln\left(\frac{1}{x^3}\right) + x^4$ $= \ln 1 - \ln x^3 + x^4$ $= -3 \ln x + x^4$	
	$f'(x) = -\frac{3}{x} + 4x^3$	



4	$f(x) = e^{x+1} + 1 = e \times e^x + 1$ $f'(x) = e \times e^x = e^{x+1}$
5	$f'(x) = e^x + ex^{e-1}$
6	$f(x) = \ln\left(\frac{10}{x^n}\right)$ $= \ln 10 - \ln x^n = \ln 10 - n \ln x$ $f'(x) = 0 - n\left(\frac{1}{x}\right) = -\frac{n}{x}$
7	$f'(x) = \cos x + \frac{1}{2}e^x$ $f'(\pi) = \cos \pi + \frac{1}{2}e^\pi = -1 + \frac{1}{2}e^\pi$ ميل المماس عند النقطة $\left(\pi, \frac{1}{2}e^\pi\right)$ $y - \frac{1}{2}e^\pi = \left(-1 + \frac{1}{2}e^\pi\right)(x - \pi)$ معادلة المماس عند النقطة $\left(\pi, \frac{1}{2}e^\pi\right)$ $y = \left(-1 + \frac{1}{2}e^\pi\right)x + \pi - \frac{\pi}{2}e^\pi + \frac{1}{2}e^\pi$
8	بما أن ميل المماس عند النقطة $\left(\pi, \frac{1}{2}e^\pi\right)$ هو $-1 + \frac{1}{2}e^\pi$ ، فإن ميل العمودي على المماس هو $\frac{-1}{-1+\frac{1}{2}e^\pi} = \frac{-2}{-2+e^\pi} = \frac{2}{2-e^\pi}$ معادلة العمودي على المماس هي: $y - \frac{1}{2}e^\pi = \frac{2}{2-e^\pi}(x - \pi) \Rightarrow y = \frac{2}{2-e^\pi}x - \frac{2\pi}{2-e^\pi} + \frac{1}{2}e^\pi$
9	$f(x) = e^x - 2x \Rightarrow f'(x) = e^x - 2$ $f'(x) = 0 \Rightarrow e^x = 2 \Rightarrow x = \ln 2 \approx 0.69$
10	$f(x) = \sin x + \cos x \Rightarrow f'(x) = \cos x - \sin x$ عندما $x = \pi$ ، فإن: $y = f(\pi) = \sin \pi + \cos \pi = -1$ ميل المماس عند النقطة $(-\pi, -1)$ هو: $f'(-\pi) = \cos(-\pi) - \sin(-\pi) = -1$ بما أن ميل المماس هو 1 – إذن ميل العمودي على المماس هو 1 معادلة العمودي على المماس: $y + 1 = 1(x - \pi) \Rightarrow y = x - \pi - 1$ الإجابة الصحيحة هي b
11	$f(x) = \ln kx = \ln k + \ln x$ $f'(x) = 0 + \frac{1}{x} = \frac{1}{x}$



	$f'(x) = \frac{1}{x}$	$f'(e) = \frac{1}{e}$	ميل المماس عند النقطة $(1, e)$ هو: معادلة المماس هي:
12	$y - 1 = \frac{1}{e}(x - e) \Rightarrow y = \frac{1}{e}x$		وهو مستقيم يمر بنقطة الأصل لأن النقطة $(0, 0)$ تحقق معادلته.
13	$y - 1 = -e(x - e) \rightarrow y = -ex + e^2 + 1$		بما أن ميل المماس هو $\frac{1}{e}$ ، فإن ميل العمودي على المماس هو $-e$ معادلة العمودي على المماس: لإيجاد المقطع x لهذا المستقيم نضع $y = 0$ في معادلته
	$0 = -ex + e^2 + 1$	$ex = e^2 + 1 \Rightarrow x = \frac{e^2 + 1}{e} = e + \frac{1}{e}$	
14	$s(t) = t^3 - 4t^2 + 5t$ $v(t) = 3t^2 - 8t + 5 \Rightarrow v(5) = 40 \text{ m/s}$ $a(t) = 6t - 8 \Rightarrow a(5) = 22 \text{ m/s}^2$		
15	$v(t) = 3t^2 - 8t + 5 = 0$ $(3t - 5)(t - 1) = 0$ $\Rightarrow t = \frac{5}{3} \text{ s}, t = 1 \text{ s}$		
16	$v(4) = 21 \text{ m/s}$ بما أن إشارة السرعة موجبة، فإن الجسم يتحرك في الاتجاه الموجب عندما $t = 4$		الموقع الابتدائي للجسم:
17	$s(t) = 0 \Rightarrow t^3 - 4t^2 + 5t = 0$ $\Rightarrow t(t^2 - 4t + 5) = 0$ $\Rightarrow t = 0$		العبارة التربيعية $5 - 4t + t^2$ مميزة سالبة وبالتالي ليس لها جذور حقيقية. إذن، لا يعود الجسم إلى موقعه الابتدائي أبداً.



18	$s(0) = e^0 - 4(0) = 1 \text{ m}$	الموقع الابتدائي للجسم:
19	$v(t) = e^t - 4$ $v(t) = 0 \Rightarrow e^t = 4 \Rightarrow t = \ln 4$ $a(t) = e^t \Rightarrow a(\ln 4) = e^{\ln 4} = 4 \text{ m/s}^2$	
20	$s(t) = 4 \cos t$ $v(t) = -4 \sin t$ $a(t) = -4 \cos t$	
21	$v\left(\frac{\pi}{4}\right) = -4 \sin \frac{\pi}{4} = -4 \times \frac{1}{\sqrt{2}} = -2\sqrt{2} \text{ m/s}$ $a\left(\frac{\pi}{4}\right) = -4 \cos \frac{\pi}{4} = -4 \times \frac{1}{\sqrt{2}} = -2\sqrt{2} \text{ m/s}^2$	
22	<p>من خصائص اقتران الموضع $s = 4 \cos t$ نعرف أن الجسم يتحرك بمرور الزمن صعوداً وهبوطاً بين الموقعين $s = 4 \text{ m}$, $s = -4 \text{ m}$ وأنه يمر بنقطة الاتزان $s = 0$ أثناء هذه الحركة عندما $t = \frac{n\pi}{2}$ حيث n أي عدد فردي موجب.</p> <p>تتغير سرعة الجسم بمرور الزمن ونعرف من خصائص الاقتران $v(t) = -4 \sin t$ أن قيم السرعة تتراوح بين -4 m/s و 4 m/s. ونلاحظ أن الجسم يصل إلى هذه السرعة عند اللحظات التي يمر فيها بنقطة الاتزان.</p> <p>نلاحظ أن قيمة تسارع الجسم عند كل لحظة تساوي معكوس قيمة اقتران الموضع عند تلك اللحظة، وأن التسارع ينعدم عند مرور الجسم بنقطة الاتزان حيث تكون محصلة القوى المؤثرة في الجسم صفرًا.</p>	
23	$y = e^x - ax$ $x = 0 \Rightarrow y = e^0 - a(0) = 1$ $\frac{dy}{dx} = e^x - a$ $\left.\frac{dy}{dx}\right _{x=0} = e^0 - a = 1 - a$	<p>نقطة تقاطع منحنى الاقتران مع محور y هي: $(0, 1)$</p> <p>ميل المماس عند هذه النقطة هو:</p> <p>معادلة المماس هي:</p> $y - 1 = (1 - a)(x - 0) \rightarrow y = (1 - a)x + 1$



24

$$y' = 2e^x + 3 + 15x^2$$

ميل مماس المنحني عند أي نقطة عليه هو

$$\text{لكل } x \text{ فإن } 2e^x > 0$$

$$\text{و لـ كل } x \text{ فإن } 15x^2 \geq 0$$

$$\text{بالـ جـمـعـ نـجـدـ أـنـهـ لـكـلـ } x \text{ فـإـنـ } 0 < 2e^x + 15x^2$$

$$\text{بـإـضـافـةـ 3ـ لـلـطـرـفـينـ:ـ لـكـلـ } x \text{ فـإـنـ } 3 > 2e^x + 15x^2 + 3 > 0 \text{ـ أـيـ أـنـ } 3 > y'$$

إذـنـ لـأـنـ يـمـكـنـ أـنـ تـكـونـ قـيـمـةـ } y ~ تـسـاـوـيـ 2ـ لـأـيـ قـيـمـةـ حـقـيقـيـةـ لـلـمـتـغـرـ xـ .ـ

الـإـحـدـائـيـ xـ لـنـقـطـةـ تقـاطـعـ منـحـنـيـ } y = ke^xـ مـعـ الـمحـورـ yـ هـوـ 0ـ وـبـالـتـعـويـضـ فـيـ مـعـادـلـةـ الـاقـترـانـ

$$\text{نـجـدـ أـنـ } k = y = ke^0 = k \text{ـ هـماـ } (0, k) \text{ـ ،ـ أـيـ أـنـ إـحـدـائـيـ } P \text{ـ هـماـ } (0, k)$$

معـادـلـةـ المـمـاسـ هـيـ:

$$\frac{dy}{dx} = ke^x \Rightarrow \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} = ke^0 = k$$

25

$$y - k = k(x - 0) \Rightarrow y = kx + k$$

ولـاجـدـ نـقـطـةـ تقـاطـعـهـ مـعـ الـمحـورـ xـ نـعـوـضـ 0ـ

$$0 = kx + k \Rightarrow x = -1$$

إـذـنـ نـقـطـةـ تقـاطـعـ المـمـاسـ عـنـدـ Pـ مـعـ الـمحـورـ xـ هـيـ:ـ } (-1, 0)

مـيلـ العـمـودـيـ عـلـىـ المـمـاسـ عـنـدـ النـقـطـةـ Pـ هـوـ } $-\frac{1}{k}$

معـادـلـةـ العـمـودـيـ عـلـىـ المـمـاسـ هـيـ:

$$y - k = -\frac{1}{k}(x - 0) \Rightarrow y = -\frac{1}{k}x + k$$

26

$$0 = -\frac{1}{k}(100) + k \Rightarrow k^2 = 100 \Rightarrow k = \pm 10$$

وـبـتـعـويـضـ إـحـدـائـيـ نـقـطـةـ التـقـاطـعـ نـجـدـ أـنـ:

ولـأـنـ 0 > kـ ،ـ فـإـنـ k~ > 0ـ

$$y = \log x = \log_{10} x = \frac{\ln x}{\ln 10} = \frac{1}{\ln 10} \ln x$$

27

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\ln 10} \times \frac{1}{x} = \frac{1}{x \ln 10}$$

$$y = \log ax^2 = \log a + 2 \log x$$

28

$$\frac{dy}{dx} = 0 + 2 \times \frac{1}{x \ln 10} = \frac{2}{x \ln 10}$$



29	$s(t) = 4 - \sin t$ $v(t) = -\cos t$ $a(t) = \sin t$		
30	$v(t) = -\cos t = 0 \Rightarrow t = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}, \dots$	$t = \frac{\pi}{2}$ <p>يكون الجسم في حالة سكون لحظي لأول مرة بعد انطلاقه عندما</p>	$s\left(\frac{\pi}{2}\right)$ <p>ويكون موقعه عندها هو</p>
31	$s\left(\frac{\pi}{2}\right) = 4 - \sin \frac{\pi}{2} = 4 - 1 = 3 \text{ m}$ $a(t) = v'(t) = \sin t \Rightarrow a(t) = 0 \Rightarrow \sin t = 0$	<p>وبتعويض هذه النتيجة في اقتراح الموضع نجد أن:</p>	<p>أي أن الجسم يكون عند $s = 4 \text{ m}$ عندما يكون تسارعه صفرًا.</p>



الدرس الثاني: مشتقاً الضرب والقسمة والمشتقات العليا

مأساة اليوم صفة 93

$$A(b) = \frac{40 + 24b^{0.4}}{1 + 4b^{0.4}}$$

$$A'(b) = \frac{(1 + 4b^{0.4})(9.6b^{-0.6}) - (40 + 24b^{0.4})(1.6b^{-0.6})}{(1 + 4b^{0.4})^2}$$

$$= \frac{9.6b^{-0.6} + 38.4b^{-0.2} - 64b^{-0.6} - 38.4b^{-0.2}}{(1 + 4b^{0.4})^2}$$

$$= \frac{-54.4b^{-0.6}}{(1 + 4b^{0.4})^2}$$

أتحقق من فهمي صفة 95

$$f(x) = (x^3 - 2x^2 + 3)(7x^2 - 4x)$$

a

$$f'(x) = (x^3 - 2x^2 + 3)(14x - 4) + (7x^2 - 4x)(3x^2 - 4x)$$

$$= 14x^4 - 4x^3 - 28x^3 + 8x^2 + 42x - 12 + 21x^4 - 28x^3 - 12x^3 + 16x^2$$

$$= 35x^4 - 72x^3 + 24x^2 + 42x - 12$$

$$f(x) = \ln x \cos x$$

b

$$f'(x) = (\ln x)(-\sin x) + (\cos x)\left(\frac{1}{x}\right) = -\ln x \sin x + \frac{\cos x}{x}$$

أتحقق من فهمي صفة 97

$$f(x) = \frac{x+1}{2x+1}$$

a

$$f'(x) = \frac{(2x+1)(1) - (x+1)(2)}{(2x+1)^2} = \frac{-1}{(2x+1)^2}$$

$$f(x) = \frac{\sin x}{e^x}$$

b

$$f'(x) = \frac{e^x(\cos x) - (\sin x)e^x}{e^{2x}} = \frac{\cos x - \sin x}{e^x}$$



أتحقق من فهمي صفحة 98

a

$$P(t) = \frac{500t^2}{2t + 9}$$

$$P'(t) = \frac{(2t + 9)(1000t) - (500t^2)(2)}{(2t + 9)^2} = \frac{9000t + 1000t^2}{(2t + 9)^2}$$

b

$$P'(12) = \frac{9000(12) + 1000(12)^2}{(24 + 9)^2} \approx 231.405$$

إذن، عندما $t = 12$ فإن عدد سكان هذه المدينة يزيد بمقادير 231 ألف نسمة لكل سنة.

أتحقق من فهمي صفحة 100

a

$$f(x) = \frac{1}{5x - x^2}$$

$$f'(x) = \frac{-(5 - 2x)}{(5x - x^2)^2} = \frac{2x - 5}{(5x - x^2)^2}$$

b

$$f(x) = \frac{1}{e^x + \sqrt{x}}$$

$$f'(x) = \frac{-\left(e^x + \frac{1}{2\sqrt{x}}\right)}{\left(e^x + \sqrt{x}\right)^2} = -\frac{2\sqrt{x}e^x + 1}{2\sqrt{x}(e^x + \sqrt{x})^2}$$

أتحقق من فهمي صفحة 102

a

$$f(x) = x \cot x$$

$$f'(x) = (x)(-\csc^2 x) + (\cot x)(1) = -x \csc^2 x + \cot x$$

b

$$f(x) = \frac{\tan x}{1 + \sin x}$$

$$f'(x) = \frac{(1 + \sin x)(\sec^2 x) - (\tan x)(\cos x)}{(1 + \sin x)^2}$$

$$= \frac{\sec^2 x + \sin x \sec^2 x - \sin x}{(1 + \sin x)^2}$$



أتحقق من فهمي صفحة 103

$$f(x) = x \sin x$$

$$f'(x) = x \cos x + \sin x$$

$$\begin{aligned} f''(x) &= -x \sin x + \cos x + \cos x \\ &= 2\cos x - x \sin x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f'''(x) &= -2\sin x - (x \cos x + \sin x) \\ &= -3\sin x - x \cos x \end{aligned}$$

أتدرب وأحل المسائل صفحة 103

$$f(x) = \frac{x^3}{2x - 1}$$

$$1 \quad f'(x) = \frac{(2x - 1)(3x^2) - (x^3)(2)}{(2x - 1)^2} = \frac{4x^3 - 3x^2}{(2x - 1)^2}$$

$$f(x) = x^3 \sec x$$

$$2 \quad f'(x) = (x^3)(\sec x \tan x) + (\sec x)(3x^2)$$

$$= x^3 \sec x \tan x + 3x^2 \sec x$$

$$f(x) = \frac{x + 1}{\cos x}$$

$$3 \quad f'(x) = \frac{(\cos x)(1) - (x + 1)(-\sin x)}{(\cos x)^2} = \frac{\cos x + x \sin x + \sin x}{\cos^2 x}$$

$$f(x) = e^x(\tan x - x)$$

$$4 \quad f'(x) = (e^x)(\sec^2 x - 1) + (\tan x - x)(e^x)$$

$$= e^x \tan^2 x + e^x \tan x - xe^x$$

$$f(x) = \frac{\sin x + \cos x}{e^x}$$

$$5 \quad f'(x) = \frac{(e^x)(\cos x - \sin x) - (\sin x + \cos x)(e^x)}{(e^x)^2} = \frac{-2 \sin x}{e^x}$$

$$f(x) = x^3 \sin x + x^2 \cos x$$

$$6 \quad f'(x) = (x^3)(\cos x) + (\sin x)(3x^2) + (x^2)(-\sin x) + (\cos x)(2x)$$

$$= x^3 \cos x + 2x^2 \sin x + 2x \cos x$$



	$f(x) = \sqrt[3]{x}(\sqrt{x} + 3) = x^{\frac{5}{6}} + 3x^{\frac{1}{3}}$
7	$f'(x) = \frac{5}{6}x^{-\frac{1}{6}} + x^{-\frac{2}{3}} = \frac{5}{6\sqrt[6]{x}} + \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}}$
8	$f(x) = \frac{1 + \sec x}{1 - \sec x}$ $f'(x) = \frac{(1 - \sec x)(\sec x \tan x) - (1 + \sec x)(-\sec x \tan x)}{(1 - \sec x)^2}$ $= \frac{2 \sec x \tan x}{(1 - \sec x)^2}$
9	$f(x) = \frac{2 - \frac{1}{x}}{x - 3} = \frac{2x - 1}{x^2 - 3x}$ $f'(x) = \frac{(x^2 - 3x)(2) - (2x - 1)(2x - 3)}{(x^2 - 3x)^2} = \frac{-2x^2 + 2x - 3}{(x^2 - 3x)^2}$
10	$f(x) = (x^3 - x)(x^2 + 2)(x^2 + x + 1)$ $f'(x) = (x^3 - x)((x^2 + 2)(2x + 1) + (x^2 + x + 1)(2x)) + (x^2 + 2)(x^2 + x + 1)(3x^2 - 1)$ $= (x^3 - x)(x^2 + 2)(2x + 1) + (x^3 - x)(x^2 + x + 1)(2x) + (x^2 + 2)(x^2 + x + 1)(3x^2 - 1)$
11	$f(x) = (\csc x + \cot x)^{-1} = \frac{1}{\csc x + \cot x}$ $f'(x) = \frac{-1(-\csc x \cot x - \csc^2 x)}{(\csc x + \cot x)^2}$ $= \frac{\csc x \cot x + \csc^2 x}{(\csc x + \cot x)^2}$ $= \frac{\csc x (\cot x + \csc x)}{(\csc x + \cot x)^2}$ $= \frac{\csc x}{\cot x + \csc x}$
12	$(fg)'(0) = f(0)g'(0) + g(0)f'(0)$ $= 5 \times 2 - 1 \times -3 = 13$



13	$\left(\frac{f}{g}\right)'(0) = \frac{g(0)f'(0) - f(0)g'(0)}{g^2(0)} = \frac{-1 \times -3 - 5 \times 2}{(-1)^2} = -7$
14	$(7f - 2fg)'(0) = 7f'(0) - 2(fg)'(0) = 7(-3) - 2(13) = -47$
15	$f(x) = \frac{x^2 - 4}{x^2 + 4}$ $f'(x) = \frac{(x^2 + 4)(2x) - (x^2 - 4)(2x)}{(x^2 + 4)^2} = \frac{16x}{(x^2 + 4)^2}$ $f''(x) = \frac{(x^2 + 4)^2(16) - (16x)(2)(x^2 + 4)^1(2x)}{(x^2 + 4)^4}$ $= \frac{(16)(x^2 + 4) - (16x)(2)(2x)}{(x^2 + 4)^3}$ $f''(-2) = \frac{(16)(8) - (-32)(2)(-4)}{(8)^3} = -\frac{1}{4}$
16	$f(x) = \frac{1+x}{1+\sqrt[3]{x}} = \frac{(1+\sqrt[3]{x})(1-\sqrt[3]{x}+\sqrt[3]{x^2})}{1+\sqrt[3]{x}} = 1 - \sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{x^2}$ $f'(x) = -\frac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}} + \frac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}}$ $f''(x) = \frac{2}{9}x^{-\frac{5}{3}} - \frac{2}{9}x^{-\frac{4}{3}} = \frac{2}{9\sqrt[3]{x^5}} - \frac{2}{9\sqrt[3]{x^4}}$ $f''(8) = \frac{2}{9\sqrt[3]{8^5}} - \frac{2}{9\sqrt[3]{8^4}} = \frac{2}{9}\left(\frac{1}{32} - \frac{1}{16}\right) = -\frac{1}{144}$



$$f(x) = \frac{1-x}{1+\sqrt{x}} = \frac{(1-\sqrt{x})(1+\sqrt{x})}{1+\sqrt{x}} = 1-\sqrt{x}$$

$$f'(x) = \frac{-1(1+\sqrt{x}) - (1-x)\frac{1}{2\sqrt{x}}}{(1+\sqrt{x})^2}$$

$$= \frac{-2\sqrt{x}(1+\sqrt{x}) - (1-x)}{2\sqrt{x}(1+\sqrt{x})^2} = \frac{-2\sqrt{x}-2x-1+x}{2\sqrt{x}(1+\sqrt{x})^2}$$

$$= -\frac{x+2\sqrt{x}+1}{2\sqrt{x}(1+\sqrt{x})^2}$$

$$f'(x) = -\frac{(1+\sqrt{x})^2}{2\sqrt{x}(1+\sqrt{x})^2} = -\frac{1}{2\sqrt{x}} = -\frac{1}{2}x^{-1/2}$$

$$f''(x) = -\frac{1}{2} \times -\frac{1}{2}x^{-3/2} = \frac{1}{4\sqrt{x^3}}$$

$$f''(4) = \frac{1}{4\sqrt{4^3}} = \frac{1}{32}$$

17

طريقة ثانية:

يمكن تبسيط $f(x) = \frac{1-x}{1+\sqrt{x}}$ بتحليل بسطه في صورة فرق بين مربعين واختصار العامل المشترك.

$$f(x) = \frac{(1-\sqrt{x})(1+\sqrt{x})}{1+\sqrt{x}} = 1-\sqrt{x}$$

$$f'(x) = -\frac{1}{2\sqrt{x}} = -\frac{1}{2}x^{-1/2}$$

$$f''(x) = -\frac{1}{2} \times -\frac{1}{2}x^{-3/2} = \frac{1}{4\sqrt{x^3}}$$

$$f''(4) = \frac{1}{4\sqrt{4^3}} = \frac{1}{32}$$



18

$$f(x) = \frac{1+x}{1+e^x}$$

$$f'(x) = \frac{(1+e^x)(1) - (1+x)(e^x)}{(1+e^x)^2} = \frac{1-xe^x}{(1+e^x)^2}$$

ميل المماس عند النقطة $(0, \frac{1}{2})$ هو:

معادلة المماس هي:

$$y - \frac{1}{2} = \frac{1}{4}(x - 0) \Rightarrow y = \frac{1}{4}x + \frac{1}{2}$$

19

$$f(x) = e^x \cos x + \sin x$$

$$f'(x) = (e^x)(-\sin x) + (\cos x)(e^x) + \cos x$$

ميل المماس عند النقطة $(0, 1)$ هو:

معادلة المماس هي:

$$y - 1 = 2(x - 0) \Rightarrow y = 2x + 1$$

20

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(\cot x) &= \frac{d}{dx}\left(\frac{\cos x}{\sin x}\right) \\ &= \frac{(\sin x)(-\sin x) - (\cos x)(\cos x)}{\sin^2 x} \\ &= \frac{-\sin^2 x - \cos^2 x}{\sin^2 x} \\ &= -\frac{1}{\sin^2 x} \\ &= -\csc^2 x \end{aligned}$$

21

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(\sec x) &= \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{\cos x}\right) \\ &= \frac{-(-\sin x)}{\cos^2 x} \\ &= \frac{1}{\cos x} \times \frac{\sin x}{\cos x} \\ &= \sec x \tan x \end{aligned}$$



	$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(\csc x) &= \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{\sin x}\right) \\ &= \frac{-(\cos x)}{\sin^2 x} \\ &= -\frac{1}{\sin x} \times \frac{\cos x}{\sin x} \\ &= -\csc x \cot x \end{aligned}$	
22	$\begin{aligned} f''(x) &= 2 - \frac{2}{x} \\ f'''(x) &= \frac{2}{x^2} \end{aligned}$	
23	$\begin{aligned} f'''(x) &= 2\sqrt{x} \\ f^{(4)}(x) &= \frac{1}{\sqrt{x}} \end{aligned}$	
24	$\begin{aligned} f^{(4)}(x) &= 2x + 1 \\ f^{(5)}(x) &= 2 \\ f^{(6)}(x) &= 0 \end{aligned}$	
25	$\begin{aligned} h(t) &= \frac{3t^2}{4+t^2} \\ h'(t) &= \frac{(4+t^2)(6t) - (3t^2)(2t)}{(4+t^2)^2} = \frac{24t}{(4+t^2)^2} \end{aligned}$	
26	$\begin{aligned} y &= e^x \sin x \\ \frac{dy}{dx} &= (e^x)(\cos x) + (\sin x)(e^x) = e^x(\cos x + \sin x) \\ \frac{d^2y}{dx^2} &= e^x(-\sin x + \cos x) + e^x(\cos x + \sin x) = 2e^x \cos x \end{aligned}$	
27	$\begin{aligned} 2 \frac{dy}{dx} - 2y &= 2e^x(\cos x + \sin x) - 2e^x \sin x \\ &= 2e^x \cos x \\ &= \frac{d^2y}{dx^2} \end{aligned}$	
28		



<p>29</p> $\csc \theta = \frac{r+h}{r} \Rightarrow r+h = r \csc \theta$ $\Rightarrow h = r(\csc \theta - 1)$	<p>30</p> $\frac{dh}{d\theta} = r(-\csc \theta \cot \theta)$ $\left. \frac{dh}{d\theta} \right _{\theta=\frac{\pi}{6}} = 6371 \left(-\csc \frac{\pi}{6} \cot \frac{\pi}{6} \right)$ $= 6371(-2 \times \sqrt{3}) \approx -22070 \text{ km/rad}$	<p>31</p> $f(x) = 9 \ln x + \frac{1}{2x^2}$ $f'(x) = 9 \left(\frac{1}{x} \right) + \frac{-1(4x)}{4x^4}$ $= \frac{9}{x} - \frac{1}{x^3}$ $= \frac{9x^2 - 1}{x^3}$ $= \frac{(3x-1)(3x+1)}{x^3}$	<p>32</p> $P'(2) = F(2)G'(2) + G(2)F'(2)$ $P'(2) = 3 \times \frac{1}{2} + 2 \times 0 = \frac{3}{2}$	<p>33</p> $Q'(7) = \frac{G(7)F'(7) - F(7)G'(7)}{G^2(7)} = \frac{1 \times \frac{1}{4} - 5 \times -\frac{2}{3}}{1} = \frac{43}{12}$
--	---	--	---	---



<p>34</p> $y = \frac{1 - e^{-x}}{1 + e^{-x}} = \frac{1 - \frac{1}{e^x}}{1 + \frac{1}{e^x}}$ $= \frac{e^x - 1}{e^x + 1}$ $\frac{dy}{dx} = \frac{(e^x + 1)(e^x) - (e^x - 1)(e^x)}{(e^x + 1)^2} = \frac{2e^x}{(e^x + 1)^2}$ $\left. \frac{dy}{dx} \right _{x=0} = \frac{2(1)}{(1 + 1)^2} = \frac{1}{2}$	<p>إذا وجد مماس أفقي فإن ميله يساوي صفرًا، أي أن : $\frac{2e^x}{(e^x + 1)^2} = 0$ ، وهذا لا يتحقق إلا إذا كان $e^x = 0$، ولكن $0 < e^x < \infty$ لجميع الأعداد الحقيقية x، ولذا لا يوجد لهذا المنحنى مماسات أفقية.</p>
<p>35</p> $y = \frac{x + 1}{x - 1}$ $\frac{dy}{dx} = \frac{(x - 1)(1) - (x + 1)(1)}{(x - 1)^2} = \frac{-2}{(x - 1)^2}$	
<p>36</p> $y = \frac{x + 1}{x - 1} \Rightarrow x + 1 = y(x - 1) \Rightarrow x(1 - y) = -y - 1$ $\Rightarrow x = \frac{y + 1}{y - 1}$ $\frac{dx}{dy} = \frac{-2}{(y - 1)^2}$	
<p>37</p> $\frac{dx}{dy} = \frac{-2}{(y - 1)^2}$ $= \frac{-2}{\left(\frac{x + 1}{x - 1} - 1\right)^2}$ $= \frac{-2}{\left(\frac{2}{x - 1}\right)^2} = \frac{-2}{\frac{4}{(x - 1)^2}} = \frac{(x - 1)^2}{-2} = \frac{1}{\frac{dy}{dx}}$	
<p>38</p> $\frac{dx}{dy} = \frac{-2}{(y - 1)^2}$ $= \frac{-2}{\left(\frac{x + 1}{x - 1} - 1\right)^2}$ $= \frac{-2}{\left(\frac{2}{x - 1}\right)^2} = \frac{-2}{\frac{4}{(x - 1)^2}} = \frac{(x - 1)^2}{-2} = \frac{1}{\frac{dy}{dx}}$	



39

$$f(x) = \frac{\ln x}{x^2}$$
$$f'(x) = \frac{x^2 \left(\frac{1}{x}\right) - (\ln x)(2x)}{x^4} = \frac{1 - 2 \ln x}{x^3}$$
$$f''(x) = \frac{x^3 \left(-\frac{2}{x}\right) - (1 - 2 \ln x)(3x^2)}{x^6}$$
$$= \frac{-5x^2 + 6x^2 \ln x}{x^6}$$
$$= \frac{-5 + 6 \ln x}{x^4}$$

$x^4 f''(x) + 4x^3 f'(x) + 2x^2 f(x) + 1$

40

$$= x^4 \times \frac{-5 + 6 \ln x}{x^4} + 4x^3 \times \frac{1 - 2 \ln x}{x^3} + 2x^2 \times \frac{\ln x}{x^2} + 1$$
$$= -5 + 6 \ln x + 4 - 8 \ln x + 2 \ln x + 1 = 0$$



الدرس الثالث: قاعدة السلسلة

مأساة اليوم صفحة 106

$$P(t) = \frac{100}{1 + e^{3-t}}$$

$$P'(t) = \frac{100e^{3-t}}{(1 + e^{3-t})^2}$$

$$P'(3) = \frac{100}{4} = 25$$

أي أن الانفلونزا تنتشر في المدرسة بعد 3 أيام بمعدل 25 طالباً/يوم

تحقق من فهمي صفحة 108

a $f(x) = \tan 3x^2$
 $f'(x) = 6x \sec^2(3x^2)$

b $f(x) = e^{\ln x} = x$
 $f'(x) = 1$

c $f(x) = \ln \cot x$
 $f'(x) = -\csc^2 x$

تحقق من فهمي صفحة 109

a $f(x) = \sqrt[5]{(x^2 - 1)^2} = (x^2 - 1)^{\frac{2}{5}}$
 $f'(x) = \frac{2}{5}(x^2 - 1)^{-\frac{3}{5}}(2x) = \frac{4x}{5\sqrt[5]{(x^2 - 1)^3}}$

b $f(x) = \sqrt{\cos x}$
 $f'(x) = \frac{-\sin x}{2\sqrt{\cos x}}$

c $f(x) = (\ln x)^5$
 $f'(x) = 5(\ln x)^4 \left(\frac{1}{x}\right)$
 $= \frac{5(\ln x)^4}{x}$



أتحقق من فهمي صفحة 111

a $f(x) = \cos^2(7x^3 + 6x - 1) = (\cos(7x^3 + 6x - 1))^2$
 $f'(x) = 2(\cos(7x^3 + 6x - 1))^1(-\sin(7x^3 + 6x - 1)(21x^2 + 6))$
 $= -2(21x^2 + 6) \sin(7x^3 + 6x - 1) \cos(7x^3 + 6x - 1)$
 $= -(21x^2 + 6) \sin 2(7x^3 + 6x - 1)$

b $f(x) = (2 + (x^2 + 1)^4)^3$
 $f'(x) = 3(2 + (x^2 + 1)^4)^2(4(x^2 + 1)^3(2x))$
 $= 24x(x^2 + 1)^3(2 + (x^2 + 1)^4)^2$

أتحقق من فهمي صفحة 112

a $f(x) = (2x + 1)^5(x^3 - x + 1)^4$
 $f'(x) = (2x + 1)^5(4)(x^3 - x + 1)^3(3x^2 - 1)$
 $+ (x^3 - x + 1)^4(5)(2x + 1)^4(2)$
 $f'(1) = (3)^5(4)(1)^3(2) + (1)^4(5)(3)^4(2) = 2754$

b $f(x) = \frac{(\cos x)^2}{e^{2x}}$
 $f'(x) = \frac{e^{2x} \times 2(\cos x)^1(-\sin x) - (\cos x)^2 \times 2e^{2x}}{e^{4x}} = \frac{-\sin 2x - 2(\cos x)^2}{e^{2x}}$
 $f'\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{-\sin \pi - 2(\cos \frac{\pi}{2})^2}{e^{\pi}} = 0$

ميل المماس يساوي صفرًا أي أن المماس أفقي، ومنه يكون العمودي على المماس رأسياً وميله غير معرف.

أتحقق من فهمي صفحة 113

a $U(x) = 80 \sqrt{\frac{2x+1}{3x+4}}$
 $U'(x) = 80 \times \frac{\frac{(3x+4)(2)-(2x+1)(3)}{(3x+4)^2}}{2\sqrt{\frac{2x+1}{3x+4}}} = \frac{200}{(3x+4)^2} \sqrt{\frac{3x+4}{2x+1}}$

b $U'(20) = \frac{200}{(64)^2} \sqrt{\frac{64}{41}} \approx 0.061$
 وهذا يعني أنه عند بيع 20 قطعة فإن قيمة بدل الخدمة تترايد بمقدار 0.061 دينار/قطعة تقريباً

أتحقق من فهمي صفحة 115



a	$f(x) = \pi^{\pi x}$ $f'(x) = (\pi \ln \pi)\pi^{\pi x} = \pi^{\pi x+1} \ln \pi$
b	$f(x) = 6^{1-x^3}$ $f'(x) = (-3x^2 \ln 6)6^{1-x^3}$
c	$f(x) = e^{4x} + 4^{2x}$ $f'(x) = 4e^{4x} + (2 \ln 4)4^{2x}$

أتحقق من فهمي صفحة 116

a	$f(x) = \log \sec x$ $f'(x) = \frac{\sec x \tan x}{\ln 10 \sec x} = \frac{\tan x}{\ln 10}$
b	$f(x) = \log_8(x^2 + 3x)$ $f'(x) = \frac{2x + 3}{(x^2 + 3x) \ln 8}$

أتحقق من فهمي صفحة 119

$\frac{dy}{dt} = \sec^2 t$, $\frac{dx}{dt} = \sec t \tan t$	$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\sec^2 t}{\sec t \tan t} = \frac{\sec t}{\tan t}$
$m = \frac{dy}{dx} \Big _{t=\frac{\pi}{4}} = \frac{\sec \frac{\pi}{4}}{\tan \frac{\pi}{4}} = \frac{\sqrt{2}}{1} = \sqrt{2}$	
$x = \sec \frac{\pi}{4} = \sqrt{2}$, $y = \tan \frac{\pi}{4} = 1$	$y - 1 = \sqrt{2}(x - \sqrt{2}) \Rightarrow y = \sqrt{2}x - 1$ معادلة المماس هي:



أدرب وأحل المسائل صفة 120

1	$f(x) = e^{4x+2}$ $f'(x) = 4e^{4x+2}$
2	$f(x) = 50e^{2x-10}$ $f'(x) = 100e^{2x-10}$
3	$f(x) = \cos(x^2 - 3x - 4)$ $f'(x) = -(2x - 3) \sin(x^2 - 3x - 4) = (3 - 2x) \sin(x^2 - 3x - 4)$
4	$f(x) = 10x^2 e^{-x^2}$ $f'(x) = (10x^2)(-2xe^{-x^2}) + (e^{-x^2})(20x) = 20xe^{-x^2}(1 - x^2)$
5	$f(x) = \sqrt{\frac{x+1}{x}} = \sqrt{1 + \frac{1}{x}}$ $f'(x) = \frac{-\frac{1}{x^2}}{2\sqrt{1+\frac{1}{x}}} = -\frac{1}{2x^2\sqrt{1+\frac{1}{x}}}$
6	$f(x) = x^2 \tan\frac{1}{x}$ $f'(x) = (x^2) \left(-\frac{1}{x^2} \sec^2 \frac{1}{x} \right) + \left(\tan \frac{1}{x} \right) (2x)$ $= -\sec^2 \frac{1}{x} + 2x \tan \frac{1}{x}$
7	$f(x) = 3x - 5 \cos(\pi x)^2$ $f'(x) = 3 + 5(2)(\pi x)(\pi) \sin(\pi x)^2 = 3 + 10\pi^2 x \sin(\pi x)^2$
8	$f(x) = \ln\left(\frac{1+e^x}{1-e^x}\right) = \ln(1+e^x) - \ln(1-e^x)$ $f'(x) = \frac{e^x}{1+e^x} + \frac{e^x}{1-e^x} = \frac{2e^x}{1-e^{2x}}$
9	$f(x) = (\ln x)^4$ $f'(x) = \frac{4}{x} (\ln x)^3$
10	$f(x) = \sin \sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{\sin x}$ $f'(x) = \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}} \cos \sqrt[3]{x} + \frac{\cos x}{3\sqrt[3]{\sin^2 x}}$



11	$f(x) = \sqrt[5]{x^2 + 8x} = (x^2 + 8x)^{\frac{1}{5}}$ $f'(x) = \frac{2x + 8}{5\sqrt[5]{(x^2 + 8x)^4}}$
12	$f(x) = \frac{3^{2x}}{x}$ $f'(x) = \frac{(x)(2 \ln 3)3^{2x} - 3^{2x}}{x^2} = \frac{(-1 + 2x \ln 3)3^{2x}}{x^2}$
13	$f(x) = 2^{-x} \cos \pi x$ $f'(x) = (2^{-x})(-\pi \sin \pi x) + (\cos \pi x)(-\ln 2)2^{-x}$ $= -\pi 2^{-x} \sin \pi x - 2^{-x}(\cos \pi x) \ln 2$
14	$f(x) = \frac{10 \log_4 x}{x}$ $f'(x) = \frac{\frac{10x}{x \ln 4} - 10 \log_4 x}{x^2} = \frac{10 - 10 \ln 4 \log_4 x}{x^2 \ln 4}$
15	$f(x) = \left(\frac{\sin x}{1 + \cos x} \right)^2$ $f'(x) = 2 \left(\frac{\sin x}{1 + \cos x} \right)^1 \times \frac{(1 + \cos x)(\cos x) - (\sin x)(-\sin x)}{(1 + \cos x)^2}$ $= 2 \times \frac{\sin x}{1 + \cos x} \times \frac{\cos x + \cos^2 x + \sin^2 x}{(1 + \cos x)^2}$ $= 2 \times \frac{\sin x}{1 + \cos x} \times \frac{\cos x + 1}{(1 + \cos x)^2}$ $= \frac{2 \sin x}{(1 + \cos x)^2}$
16	$f(x) = \log_3(1 + x \ln x)$ $f'(x) = \frac{(x)\left(\frac{1}{x}\right) + (\ln x)(1)}{(\ln 3)(1 + x \ln x)} = \frac{1 + \ln x}{(\ln 3)(1 + x \ln x)}$
17	$f(x) = e^{\sin 2x} + \sin(e^{2x})$ $f'(x) = 2e^{\sin 2x} \cos 2x + 2e^{2x} \cos(e^{2x})$
18	$f(x) = \tan^4(\sec(\cos x)) = (\tan(\sec(\cos x)))^4$ $f'(x) = 4(\tan(\sec(\cos x)))^3 \sec^2(\sec(\cos x)) \times \sec(\cos x) \tan(\cos x)$ $\times (-\sin x)$ $= -4 \tan^3(\sec(\cos x)) \sec^2(\sec(\cos x)) \sec(\cos x) \tan(\cos x) \sin x$



19 $f(x) = 4e^{-0.5x^2}$ $f(-2) = 4e^{-0.5(-2)^2} = \frac{4}{e^2}$ $f'(x) = -4xe^{-0.5x^2}$ $m = f'(-2) = -4(-2)e^{-0.5(-2)^2} = \frac{8}{e^2}$ $y - \frac{4}{e^2} = \frac{8}{e^2}(x + 2) \Rightarrow y = \frac{8}{e^2}x + \frac{20}{e^2}$	ميل المماس هو: معادلة المماس هي:
20 $f(x) = x + \cos 2x$ $f(0) = 0 + \cos(0) = 1$ $f'(x) = 1 - 2 \sin 2x$ $m = f'(0) = 1 - 2 \sin 2(0) = 1$ $y - 1 = 1(x - 0) \Rightarrow y = x + 1$	ميل المماس هو: معادلة المماس هي:
21 $f(x) = 2^x$ $f(0) = 2^0 = 1$ $f'(x) = (\ln 2)2^x$ $m = f'(0) = (\ln 2)2^0 = \ln 2$ $y - 1 = (\ln 2)(x - 0) \Rightarrow y = (\ln 2)x + 1$	ميل المماس هو: معادلة المماس هي:
22 $f(x) = \sqrt{x+1} \sin \frac{\pi x}{2}$ $f(3) = 2 \sin \frac{3\pi}{2} = -2$ $f'(x) = \left(\sqrt{x+1}\right) \left(\frac{\pi}{2} \cos \frac{\pi x}{2}\right) + \left(\sin \frac{\pi x}{2}\right) \left(\frac{1}{2\sqrt{x+1}}\right)$ $m = f'(3) = (2)(0) + (-1)\left(\frac{1}{4}\right) = -\frac{1}{4}$ $y + 2 = -\frac{1}{4}(x - 3) \Rightarrow y = -\frac{1}{4}x - \frac{5}{4}$	ميل المماس هو: معادلة المماس هي:
23 $A(x) = f(g(x))$ $A'(x) = f'(g(x)) \times g'(x)$ $A'(5) = f'(g(5)) \times g'(5)$ $= f'(-2) \times g'(5)$ $= 4 \times 6 = 24$	



	$f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$ $f'(x) = \frac{(\sqrt{x^2 + 1})(1) - (x)\left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}\right)}{x^2 + 1}$ 24 $= \frac{\left(\frac{x^2 + 1 - x^2}{\sqrt{x^2 + 1}}\right)}{x^2 + 1}$ $= \frac{1}{(x^2 + 1)\sqrt{x^2 + 1}}$ $= \frac{1}{\sqrt{(x^2 + 1)^3}}$	
25	$A(t) = Ne^{0.1t}$ $A'(t) = 0.1Ne^{0.1t}$ $A'(3) = 0.1Ne^{0.3}$	
26	$A'(k) = 0.1Ne^{0.1k}$ $0.2 = 0.1Ne^{0.1k}$ $e^{0.1k} = \frac{0.2}{0.1N} = \frac{2}{N}$ $0.1k = \ln \frac{2}{N} \Rightarrow k = 10 \ln \frac{2}{N}$	
27	$f(x) = \sin \pi x$ $f'(x) = \pi \cos \pi x$ $f''(x) = -\pi^2 \sin \pi x$ $f'''(x) = -\pi^3 \cos \pi x$	
28	$f(x) = \cos(2x + 1)$ $f'(x) = -2\sin(2x + 1)$ $f''(x) = -4 \cos(2x + 1)$ $f'''(x) = 8 \sin(2x + 1)$ $f^{(4)}(x) = 16 \cos(2x + 1)$ $f^{(5)}(x) = -32 \sin(2x + 1)$	
29	$f(x) = \cos x^2$ $f'(x) = -2x \sin x^2$ $f''(x) = (-2x)(2x \cos x^2) + (\sin x^2)(-2)$ $= -4x^2 \cos x^2 - 2 \sin x^2$	



30	$y = e^{\sin x}$ $\frac{dy}{dx} = e^{\sin x} \cos x$ $m = \left. \frac{dy}{dx} \right _{x=0} = e^{\sin 0} \cos 0 = 1$	ميل المماس هو:
31	$A(t) = 20 \left(\frac{1}{2} \right)^{\frac{t}{140}}$ $A'(t) = \frac{20}{140} \left(\ln \frac{1}{2} \right) \left(\frac{1}{2} \right)^{\frac{t}{140}}$ $A'(2) = \frac{20}{140} \left(\ln \frac{1}{2} \right) \left(\frac{1}{2} \right)^{\frac{2}{140}} \approx -0.098$	إذن يتحلل البلوتونيوم بمعدل $0.098\text{g}/\text{كل يوم}$ عندما $t = 2$
32	$s(t) = 0.1 \sin 2.4t$ $v(t) = 2.4 \times 0.1 \cos 2.4t = 0.24 \cos 2.4t$ $v(1) = 0.24 \cos 2.4 \approx -0.177 \text{ cm/s}$	
33	$v(t) = 0 \Rightarrow 0.24 \cos 2.4t = 0$ $\Rightarrow \cos 2.4t = 0$ $ \sin 2.4t = 1$ $\sin 2.4t = 1, \quad \sin 2.4t = -1$	وهذا يعني أن: أي أن:
34	$s(t) = 0.1 \sin 2.4t$ $s = 0.1(1) = 0.1, \quad s = 0.1(-1) = -0.1$ -0.1 cm أو 0.1 cm $a(t) = -0.24 \times 2.4 \sin 2.4t = -0.576 \sin 2.4t$ $a(t) = 0 \Rightarrow \sin 2.4t = 0$ $s(t) = 0.1 \sin 2.4t$ $s = 0.1(0) = 0$ $\text{إذن، عندما تكون سرعة الكرة صفرًا يكون موقعها عند } s = 0, \text{ أي عند مرورها بموقع الاتزان.}$	لكن موقع الكرة هو: وبتعيين قيمة $\sin 2.4t$ نجد أن الموقع هو: $s = 0.1(1) = 0.1, \quad s = 0.1(-1) = -0.1$ إذن، عندما تكون سرعة الكرة صفرًا يكون موقعها عند 0.1 cm أو -0.1 cm لكن موقع الكرة هو: وبتعيين قيمة $\sin 2.4t$ نجد أن الموقع هو: $s = 0.1(0) = 0$ إذن، عندما يكون تسارع الكرة صفرًا يكون موقعها عند $s = 0$, أي عند مرورها بموقع الاتزان.



	$\frac{dy}{dt} = 2t , \quad \frac{dx}{dt} = 1$ $\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{2t}{1} = 2t$		
35	$m = \left. \frac{dy}{dx} \right _{t=1} = 2 \times 1 = 2$ $x = 1 + 2 = 3 , \quad y = (1)^2 - 1 = 0$ $y - 0 = 2(x - 3) \Rightarrow y = 2x - 6$	ميل التماس: نقطة التماس:	
36	$\frac{dy}{dt} = 2t , \quad \frac{dx}{dt} = \frac{1}{2}$ $\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{2t}{\frac{1}{2}} = 4t$ $m = \left. \frac{dy}{dx} \right _{t=-1} = 4 \times -1 = -4$ $x = -\frac{1}{2} , \quad y = (-1)^2 - 4 = -3$ $y + 3 = -4 \left(x + \frac{1}{2} \right) \Rightarrow y = -4x - 5$	ميل التماس: نقطة التماس:	معادلة التماس: معادلة المماس:



	$\frac{dy}{dt} = \sin t$, $\frac{dx}{dt} = 1 - \cos t$		
	$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\sin t}{1 - \cos t}$		
37	$m = \frac{dy}{dx} \Big _{t=\frac{\pi}{3}} = \frac{\sin \frac{\pi}{3}}{1 - \cos \frac{\pi}{3}} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{1 - \frac{1}{2}} = \sqrt{3}$		نقطة التماس:
	$x = \frac{\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2}$, $y = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$		معادلة المماس:
	$y - \frac{1}{2} = \sqrt{3} \left(x - \frac{\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \Rightarrow y = \sqrt{3}x - \frac{\sqrt{3}\pi}{3} + 2$		
	$\frac{dy}{dt} = \sec^2 t$, $\frac{dx}{dt} = 2 \times \sec t \times \sec t \tan t = 2 \sec^2 t \tan t$		
	$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\sec^2 t}{2 \sec^2 t \tan t} = \frac{1}{2} \cot t$		
38	$m = \frac{dy}{dx} \Big _{t=-\frac{\pi}{4}} = \frac{1}{2} \cot \left(-\frac{\pi}{4} \right) = -\frac{1}{2}$		نقطة التماس:
	$x = \sec^2 \left(-\frac{\pi}{4} \right) - 1 = 1$, $y = \tan \left(-\frac{\pi}{4} \right) = -1$		معادلة المماس:
	$y + 1 = -\frac{1}{2}(x - 1) \Rightarrow y = -\frac{1}{2}x - \frac{1}{2}$		



	$\frac{dy}{dt} = 2 \sin t$, $\frac{dx}{dt} = 2(1 - \cos t)$	
	$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{2 \sin t}{2(1 - \cos t)} = \frac{\sin t}{1 - \cos t}$	
39	$m = \frac{dy}{dx} \Big _{t=\frac{\pi}{4}} = \frac{\sin \frac{\pi}{4}}{1 - \cos \frac{\pi}{4}} = \frac{\frac{1}{\sqrt{2}}}{1 - \frac{1}{\sqrt{2}}} = \frac{1}{\sqrt{2}-1} \times \frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}+1} = \sqrt{2} + 1$ $m = \frac{-1}{\sqrt{2}+1} \times \frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}-1} = 1 - \sqrt{2}$	ميل المماس: ميل العمودي على المماس:
40	$h(x) = f(g(x))$ $h'(x) = f'(g(x)) \times g'(x)$ $h'(1) = f'(g(1)) \times g'(1) = f'(4) \times g'(1)$	$g'(1)$ ميل المستقيم الذي يمر بالنقطتين (2,3) و (0,5) ويساوي 1 $f'(4)$ ميل المستقيم الذي يمر بالنقطتين (5,3) و (2,4) ويساوي $-\frac{1}{3}$
	$h'(1) = -\frac{1}{3} \times -1 = \frac{1}{3}$	
41	$p(x) = g(f(x))$ $p'(x) = g'(f(x)) \times f'(x)$ $p'(1) = g'(f(1)) \times f'(1) = g'(2) \times f'(1)$	$g'(2)$ ميل المستقيم الذي يمر بالنقطتين (3,2) و (0,5) ويساوي -1 $f'(1)$ ميل المستقيم الذي يمر بالنقطتين (0,0) و (2,4) ويساوي 2
	$p'(1) = -1 \times 2 = -2$	



	$y = \ln(ax + b)$ $\frac{dy}{dx} = \frac{a}{ax + b}$	ليكن إحداثياً P هما (x_1, y_1) ، فيكون ميل المماس عند P هو: $\left. \frac{dy}{dx} \right _{x=x_1} = \frac{a}{ax_1 + b} \Rightarrow \frac{a}{ax_1 + b} = 1$ $\Rightarrow a = ax_1 + b$ $\Rightarrow x_1 = \frac{a - b}{a} = 1 - \frac{b}{a}$ المدار $(1 - \frac{b}{a})$ أقل من 1 لأن $\frac{b}{a}$ مقدار موجب كون a, b موجبين. إذن، الإحداثي x للنقطة P أقل من 1
42	$y = f(x) = \ln(ax + b)$ $y' = f'(x) = \frac{a}{ax + b}$	ميل المماس عند $P(0, 2)$ يساوي 1، أي أن: $f'(0) = 1$ $f'(0) = \frac{a}{b} = 1 \Rightarrow a = b$ $f(0) = \ln b = 2 \Rightarrow b = e^2$ $\Rightarrow a = b = e^2$
43		أفترض أن النقطة التي ميل المماس عندها يساوي $\frac{1}{2}$ هي (x_1, y_1) . بتعويض قيمة كل من a ، و b نجد أن: $f(x) = \ln(e^2x + e^2) = \ln(e^2(x + 1)) = 2 + \ln(x + 1)$ $f'(x) = \frac{1}{x + 1} \Rightarrow f'(x_1) = \frac{1}{x_1 + 1} = \frac{1}{2} \Rightarrow x_1 = 1$ $y_1 = f(x_1) = f(1) = \ln(e^2 + e^2) = \ln(2e^2) = \ln 2 + \ln e^2 = \ln 2 + 2$ إذن، النقطة التي ميل المماس عندها يساوي $\frac{1}{2}$ هي $(1, 2 + \ln 2)$.
44	$\frac{dy}{dt} = 2$ ، $\frac{dx}{dt} = 2t$ $\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{2}{2t} = \frac{1}{t}$	
45		



$$m = \frac{dy}{dx} = \frac{1}{a}$$

46

$$m = \frac{-1}{\frac{1}{a}} = -a$$

ميل المماس عند النقطة $(a^2, 2a)$:

ميل العمودي على المماس:

معادلة العمودي على المماس:

$$y - 2a = -a(x - a^2) \Rightarrow y = -ax + a^3 + 2a$$

لإيجاد المقطع x للعمودي على المماس نضع $y = 0$ في معادلته:

$$0 = -ax + a^3 + 2a \Rightarrow x = \frac{a^3 + 2a}{a} = a^2 + 2$$

لإيجاد المقطع y للعمودي على المماس نضع $x = 0$:

$$y = -a(0) + a^3 + 2a = a^3 + 2a$$

مساحة المثلث:

47

$$\begin{aligned} A &= \frac{1}{2} |a^2 + 2| |a^3 + 2a| \\ &= \frac{1}{2} |a^2 + 2| |a(a^2 + 2)| \\ &= \frac{1}{2} |a(a^2 + 2)^2| \\ &= \frac{1}{2} |a|(a^2 + 2)^2 \end{aligned}$$

48

$$y = \sqrt{\sin \sqrt{x}}$$

49

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{1}{2\sqrt{x}} \cos \sqrt{x}}{\frac{2\sqrt{\sin \sqrt{x}}}{2\sqrt{\sin \sqrt{x}}} = \frac{\cos \sqrt{x}}{4\sqrt{x}\sqrt{\sin \sqrt{x}}} = \frac{\cos \sqrt{x}}{4\sqrt{x}\sin \sqrt{x}}$$

$$y = e^x \sin^2 x \cos x = (e^x \sin^2 x)(\cos x)$$

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= (e^x \sin^2 x)(-\sin x) + (\cos x)((e^x)(2 \sin x \cos x) + (\sin^2 x)(e^x)) \\ &= -e^x \sin^3 x + 2e^x \cos^2 x \sin x + e^x \cos x \sin^2 x \end{aligned}$$



<p>50</p> $\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{3 \cos 3t}{2 \cos 2t}$ $\frac{dy}{dx} = 0 \Rightarrow \frac{3 \cos 3t}{2 \cos 2t} = 0$ $\Rightarrow \cos 3t = 0 \Rightarrow 3t = \frac{\pi}{2} \Rightarrow t = \frac{\pi}{6}$ $x_A = \sin 2\left(\frac{\pi}{6}\right) = \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ $y_A = \sin 3\left(\frac{\pi}{6}\right) = \sin \frac{\pi}{2} = 1$	<p>إذن، إحداثيا A هما $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, 1\right)$</p>	<p>عند النقطة B يكون المماس موازياً للمحور y، أي إن ميله غير معروف، ومنه يكون:</p> $\cos 2t = 0 \Rightarrow 2t = \frac{\pi}{2} \Rightarrow t = \frac{\pi}{4}$ $x_B = \sin 2\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sin \frac{\pi}{2} = 1$ $y_B = \sin 3\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sin \frac{3\pi}{4} = \frac{1}{\sqrt{2}}$	<p>إذن، إحداثيا B هما $\left(1, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$</p>	<p>عند نقطة الأصل $x = y = 0$</p>	<p>$\sin 2t = \sin 3t = 0$ أي أن:</p>	<p>تحقق هاتان المعادلتان معاً عندما $t = 0$، وعندما يكون ميل المماس:</p> $m = \frac{dy}{dx} \Big _{t=0} = \frac{3 \cos 3(0)}{2 \cos 2(0)} = \frac{3 \cos 0}{2 \cos 0} = \frac{3}{2}$	<p>كما تتحققان أيضاً عندما $t = \pi$، وعندما يكون ميل المماس:</p> $m = \frac{dy}{dx} \Big _{t=\pi} = \frac{3 \cos 3\pi}{2 \cos 2\pi} = \frac{3 \cos \pi}{2 \cos 0} = \frac{-3}{2}$
---	---	---	---	--	--	---	---



	$s(t) = \ln(t^2 - 2t + 1.9)$	
53	$v(t) = \frac{2t - 2}{t^2 - 2t + 1.9}$ $a(t) = \frac{(t^2 - 2t + 1.9)(2) - (2t - 2)(2t - 2)}{(t^2 - 2t + 1.9)^2} = \frac{-2t^2 + 4t - 0.2}{(t^2 - 2t + 1.9)^2}$	
54	$v(t) = 0 \Rightarrow 2t - 2 = 0 \Rightarrow t = 1$ $s(1) = \ln(1 - 2 + 1.9) = \ln 0.9 \text{ m}$ $a(1) = \frac{-2 + 4 - 0.2}{(1 - 2 + 1.9)^2} = \frac{1.8}{(0.9)^2} \approx 2.2 \text{ m/s}^2$	
55	$s(0) = \ln(1.9)$ $s(t) = \ln(1.9) \Rightarrow \ln(t^2 - 2t + 1.9) = \ln(1.9)$ $\Rightarrow t^2 - 2t + 1.9 = 1.9$ $\Rightarrow t^2 - 2t = 0$ $\Rightarrow t(t - 2) = 0$ $\Rightarrow t = 0, t = 2$	الموقع الابتدائي هو: يعود الجسم إلى موقعه الابتدائي بعد ثانية من بدء حركته.



الدرس الرابع: الاستدراك الضمني

مأساة اليوم صفحة 123

$$\tan \theta = \frac{4x}{x^2 + 252}$$

$$\begin{aligned} \sec^2 \theta \times \frac{d\theta}{dx} &= \frac{(x^2 + 252)(4) - (4x)(2x)}{(x^2 + 252)^2} \\ \frac{d\theta}{dx} &= \frac{1008 - 4x^2}{\sec^2 \theta (x^2 + 252)^2} \\ &= \frac{1008 - 4x^2}{(1 + \tan^2 \theta)(x^2 + 252)^2} \\ &= \frac{1008 - 4x^2}{\left(1 + \frac{16x^2}{(x^2 + 252)^2}\right)(x^2 + 252)^2} \\ &= \frac{1008 - 4x^2}{(x^2 + 252)^2 + 16x^2} \end{aligned}$$

باشتراك طرفي العلاقة بالنسبة إلى x ينتج أن:

أتحقق من فهمي صفحة 125

$$x^2 + y^2 = 13$$

$$a \quad 2x + 2y \frac{dy}{dx} = 0$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{2x}{2y} = -\frac{x}{y}$$

$$b \quad 2x + 5y^2 = \sin y$$

$$2 + 10y \frac{dy}{dx} = \cos y \frac{dy}{dx}$$

$$\frac{dy}{dx}(10y - \cos y) = -2$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-2}{10y - \cos y}$$



أتحقق من فهمي صفحة 127

<p>a</p> $3xy^2 + y^3 = 8$ $6xy \frac{dy}{dx} + 3y^2 + 3y^2 \frac{dy}{dx} = 0$ $\frac{dy}{dx} = -\frac{3y^2}{6xy + 3y^2}$	<p>b</p> $\tan(x - y) = 2xy^3 + 1$ $\left(1 - \frac{dy}{dx}\right) \sec^2(x - y) = 6xy^2 \frac{dy}{dx} + 2y^3$ $\sec^2(x - y) - \sec^2(x - y) \frac{dy}{dx} = 6xy^2 \frac{dy}{dx} + 2y^3$ $\frac{dy}{dx} (6xy^2 + \sec^2(x - y)) = \sec^2(x - y) - 2y^3$ $\frac{dy}{dx} = \frac{\sec^2(x - y) - 2y^3}{6xy^2 + \sec^2(x - y)}$
<p>c</p> $x^2 = \frac{x - y}{x + y}$ $2x = \frac{(x + y) \left(1 - \frac{dy}{dx}\right) - (x - y) \left(1 + \frac{dy}{dx}\right)}{(x + y)^2}$ $2x(x + y)^2 = x - x \frac{dy}{dx} + y - y \frac{dy}{dx} - x + x \frac{dy}{dx} + y + y \frac{dy}{dx}$ $2x \frac{dy}{dx} = 2y - 2x(x + y)^2$ $\frac{dy}{dx} = \frac{2y - 2x(x + y)^2}{2x} = \frac{y - x(x + y)^2}{x}$	

أتحقق من فهمي صفحة 128

<p>a</p> $y^2 = \ln x \Rightarrow 2y \frac{dy}{dx} = \frac{1}{x}$ $\Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{1}{2xy}$ $\left.\frac{dy}{dx}\right _{(e,1)} = \frac{1}{2e}$	
---	--



$$(y - 3)^2 = 4(6 - 5) \Rightarrow (y - 3)^2 = 4 \\ \Rightarrow y - 3 = \pm 2 \\ \Rightarrow y = 5, y = 1$$

نجد قيمة y عندما $x = 6$

باشتلاق طرفي العلاقة $(y - 3)^2 = 4(x - 5)$ بالنسبة إلى x ينتج أن:

$$2(y - 3) \frac{dy}{dx} = 4 \\ \frac{dy}{dx} = \frac{2}{y - 3}$$

ميل المماس عند النقطة الأولى هو:

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{(6,1)} = \frac{2}{1 - 3} = -1$$

وميل المماس عند النقطة الثانية هو:

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{(6,5)} = \frac{2}{5 - 3} = 1$$

أتحقق من فهمي صفحة 130

$$x^3 + y^3 - 3xy = 17 \Rightarrow 3x^2 + 3y^2 \frac{dy}{dx} - 3x \frac{dy}{dx} - 3y = 0$$

بتعويض $x = 2$ ، $y = 3$ ينتج أن:

$$3(2)^2 + 3(3)^2 \frac{dy}{dx} - 3(2) \frac{dy}{dx} - 3(3) = 0 \\ \Rightarrow \left. \frac{dy}{dx} \right|_{(2,3)} = -\frac{1}{7}$$

ميل المماس هو: $-\frac{1}{7}$

إذن، معادلة المماس هي:

$$y - 3 = -\frac{1}{7}(x - 2) \Rightarrow y = -\frac{1}{7}x + \frac{23}{7}$$



أتحقق من فهمي صفحة 131

$$\begin{aligned}
 xy + y^2 &= 2x \Rightarrow x \frac{dy}{dx} + y + 2y \frac{dy}{dx} = 2 \\
 \Rightarrow \frac{dy}{dx} &= \frac{2-y}{x+2y} \\
 \Rightarrow \frac{d^2y}{dx^2} &= \frac{(x+2y)\left(-\frac{dy}{dx}\right) - (2-y)\left(1+2\frac{dy}{dx}\right)}{(x+2y)^2} \\
 &= \frac{(x+2y)\left(\frac{y-2}{x+2y}\right) - (2-y)\left(1+2\times\frac{2-y}{x+2y}\right)}{(x+2y)^2} \\
 &= \frac{(x+2y)(y-2) - (2-y)(x+4)}{(x+2y)^3} \\
 &= \frac{2xy - 4x + 2y^2 - 8}{(x+2y)^3}
 \end{aligned}$$

أتحقق من فهمي صفحة 132

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{3t^2 - 4t}{6t} = \frac{1}{2}t - \frac{2}{3}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right)}{\frac{dx}{dt}} = \frac{1}{2} = \frac{1}{12t}$$

$$\left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{t=2} = \frac{1}{24}$$



أتدرب وأحل المسائل صفة 132

$$x^2 - 2y^2 = 4$$

$$2x - 4y \frac{dy}{dx} = 0$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x}{2y}$$

1

$$\frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} = \frac{1}{10}$$

$$\frac{-2x}{x^4} + \frac{-2y \frac{dy}{dx}}{y^4} = 0$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2x}{x^4} \times \frac{y^4}{-2y} = -\frac{y^3}{x^3}$$

2

$$(x^2 + y^2)^2 = 50(x^2 - y^2)$$

$$2(x^2 + y^2) \left(2x + 2y \frac{dy}{dx} \right) = 50 \left(2x - 2y \frac{dy}{dx} \right)$$

3

$$\frac{dy}{dx} (yx^2 + y^3 + 25y) = 25x - x^3 - xy^2$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{25x - x^3 - xy^2}{yx^2 + y^3 + 25y}$$

$$e^x y = x e^y$$

$$(e^x) \left(\frac{dy}{dx} \right) + (y)(e^x) = (x) \left(e^y \frac{dy}{dx} \right) + (e^y)(1)$$

4

$$\frac{dy}{dx} (e^x - x e^y) = e^y - y e^x$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{e^y - y e^x}{e^x - x e^y}$$



	$3^x = y - 2xy$ $3^x \ln 3 = \frac{dy}{dx} - 2x \frac{dy}{dx} - 2y$ 5 $\frac{dy}{dx}(1 - 2x) = 2y + 3^x \ln 3$ $\frac{dy}{dx} = \frac{2y + 3^x \ln 3}{1 - 2x}$	
6	$\sqrt{x} + \sqrt{y} = 5$ $\frac{1}{2\sqrt{x}} + \frac{dy}{2\sqrt{y}} = 0$ $\frac{dy}{dx} = \frac{-2\sqrt{y}}{2\sqrt{x}} = \frac{-\sqrt{y}}{\sqrt{x}}$	
7	$x = \sec \frac{y}{x}$ $1 = -\frac{1}{y^2} \frac{dy}{dx} \sec \frac{1}{y} \tan \frac{1}{y}$ $\frac{dy}{dx} = \frac{-y^2}{\sec \frac{1}{y} \tan \frac{1}{y}} = -y^2 \cos \frac{1}{y} \cot \frac{1}{y}$	
8	$(\sin \pi x + \cos \pi y)^2 = 2$ $2(\sin \pi x + \cos \pi y)^1 \left(\pi \cos \pi x - \pi \sin \pi y \frac{dy}{dx} \right) = 0$ $\frac{dy}{dx} (\pi \sin \pi y)(\sin \pi x + \cos \pi y) = (\pi \cos \pi x)(\sin \pi x + \cos \pi y)$ $\frac{dy}{dx} = \frac{(\pi \cos \pi x)(\sin \pi x + \cos \pi y)}{(\pi \sin \pi y)(\sin \pi x + \cos \pi y)} = \frac{\cos \pi x}{\sin \pi y}$	



	$\frac{x}{y^2} + \frac{y^2}{x} = 5$ $\frac{y^2(1) - x\left(2y\frac{dy}{dx}\right)}{y^4} + \frac{2y\frac{dy}{dx}(x) - 1(y^2)}{x^2} = 0$ $\frac{y^2 - 2xy\frac{dy}{dx}}{y^4} = -\frac{2xy\frac{dy}{dx} - y^2}{x^2}$ <p style="text-align: center;">9</p> $x^2(y^2 - 2xy\frac{dy}{dx}) = -y^4(2xy\frac{dy}{dx} - y^2)$ $2xy^5\frac{dy}{dx} - 2x^3y\frac{dy}{dx} = y^6 - x^2y^2$ $(2xy^5 - 2x^3y)\frac{dy}{dx} = y^6 - x^2y^2$ $\frac{dy}{dx} = \frac{y^6 - x^2y^2}{2xy^5 - 2x^3y} = \frac{y^2(y^4 - x^2)}{2xy(y^4 - x^2)} = \frac{y}{2x}$
10	$x + y = \cos xy$ $1 + \frac{dy}{dx} = -\left(x\frac{dy}{dx} + y\right) \sin xy$ $\frac{dy}{dx}(-x \sin xy - 1) = 1 + y \sin xy$ $\frac{dy}{dx} = -\frac{1 + y \sin xy}{x \sin xy + 1}$
11	$x^2 + y^2 = \ln(x + y)^2$ $2x + 2y\frac{dy}{dx} = \frac{2(x + y)\left(1 + \frac{dy}{dx}\right)}{(x + y)^2}$ $x + y\frac{dy}{dx} = \frac{1 + \frac{dy}{dx}}{x + y}$ $\frac{dy}{dx}(xy + y^2 - 1) = 1 - x^2 - xy$ $\frac{dy}{dx} = \frac{1 - x^2 - xy}{xy + y^2 - 1}$



	$\sin x \cos y = x^2 - 5y$	
12	$(\sin x) \left(-\sin y \frac{dy}{dx} \right) + (\cos y)(\cos x) = 2x - 5 \frac{dy}{dx}$ $\frac{dy}{dx} (\sin x \sin y - 5) = \cos x \cos y - 2x$ $\frac{dy}{dx} = \frac{\cos x \cos y - 2x}{\sin x \sin y - 5}$	
13	$2y^2 + 2xy - 1 = 0$ $2y^2 + 2\left(\frac{1}{2}\right)y - 1 = 0 \Rightarrow 2y^2 + y - 1 = 0$ $\Rightarrow (2y - 1)(y + 1) = 0 \Rightarrow y = \frac{1}{2}, y = -1$ <p>باستناد طرفي العلاقة بالنسبة إلى x ينتهي أن:</p> $y' = \frac{-y}{2y + x}$ $y' _{\left(\frac{1}{2}, 1\right)} = \frac{-\frac{1}{2}}{2 \times \frac{1}{2} + 1} = -\frac{1}{3}$ $y' _{(-1, -1)} = \frac{1}{-2 + \frac{1}{2}} = -\frac{2}{3}$	$x = \frac{1}{2}$ $y = \frac{1}{2}, y = -1$



$$y^3 + 2x^2 = 11y$$

أجد قيمة x عندما $y = 1$

$$1 + 2x^2 = 11 \rightarrow x^2 = 5 \rightarrow x = \pm\sqrt{5}$$

باشتراك طرفي العلاقة بالنسبة إلى x ينتج أن:

$$14 \quad 3y^2y' + 4x = 11y'$$

$$y' = \frac{4x}{11 - 3y^2}$$

$$y'|_{(-\sqrt{5}, 1)} = \frac{-\sqrt{5}}{2}$$

$$y'|_{(\sqrt{5}, 1)} = \frac{\sqrt{5}}{2}$$

$$15 \quad x^2 + y^2 = 25$$

$$2x + 2y \frac{dy}{dx} = 0$$

$$2(3) + 2(-4) \frac{dy}{dx} = 0 \Rightarrow \frac{dy}{dx}\Big|_{(3, -4)} = \frac{3}{4}$$

$$16 \quad x^2y = 4(2 - y)$$

$$x^2 \frac{dy}{dx} + 2xy = -4 \frac{dy}{dx}$$

$$4 \frac{dy}{dx} + 2(2)(1) = -4 \frac{dy}{dx} \Rightarrow \frac{dy}{dx}\Big|_{(2, 1)} = -\frac{1}{2}$$

$$17 \quad e^{\sin x} + e^{\cos y} = e + 1$$

$$e^{\sin x} \cos x - e^{\cos y} \sin y \frac{dy}{dx} = 0$$

$$e^{\sin \frac{\pi}{2}} \cos \frac{\pi}{2} - e^{\cos \frac{\pi}{2}} \sin \frac{\pi}{2} \frac{dy}{dx} = 0 \Rightarrow \frac{dy}{dx}\Big|_{(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})} = 0$$



<p>18</p> $\sqrt[3]{x^2} + \sqrt[3]{y^2} = 5$ $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = 5$ $\frac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}} + \frac{2}{3}y^{-\frac{1}{3}} \frac{dy}{dx} = 0$ $\frac{2}{3}\left(\frac{1}{2}\right) + \frac{2}{3}(1)\frac{dy}{dx} = 0 \Rightarrow \frac{dy}{dx}\Big _{(8,1)} = -\frac{1}{2}$	$x^2 + xy + y^2 = 13$ $2x + x \frac{dy}{dx} + y + 2y \frac{dy}{dx} = 0$ $-8 - 4 \frac{dy}{dx} + 3 + 6 \frac{dy}{dx} = 0$ $\frac{dy}{dx}\Big _{(-4,3)} = \frac{5}{2}$ $y - 3 = \frac{5}{2}(x + 4) \Rightarrow y = \frac{5}{2}x + 13$	<p>ميل المماس هو:</p> <p>معادلة المماس هي:</p>
$x + y - 1 = \ln(x^2 + y^2)$ $1 + \frac{dy}{dx} = \frac{2x + 2y \frac{dy}{dx}}{x^2 + y^2}$	$1 + \frac{dy}{dx} = 2$ $\frac{dy}{dx}\Big _{(1,0)} = 1$ $y - 0 = 1(x - 1) \Rightarrow y = x - 1$	<p>بالتعويض ينتج أن:</p> <p>ميل المماس هو:</p> <p>معادلة المماس هي:</p>
$x + y = \sin y$ $1 + \frac{dy}{dx} = \cos y \frac{dy}{dx}$ $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{-1 + \cos y}$	$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\sin y \frac{dy}{dx}}{(-1 + \cos y)^2} = \frac{\sin y \left(\frac{1}{-1 + \cos y}\right)}{(-1 + \cos y)^2} = \frac{\sin y}{(-1 + \cos y)^3}$	



$$4y^3 = 6x^2 + 1$$

$$12y^2 \frac{dy}{dx} = 12x$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x}{y^2}$$

22

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{y^2 - 2xy \frac{dy}{dx}}{y^4} = \frac{y - 2x \left(\frac{x}{y^2} \right)}{y^3} = \frac{y^3 - 2x^2}{y^5}$$

$$xy + e^y = e$$

$$x \frac{dy}{dx} + y + e^y \frac{dy}{dx} = 0$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-y}{x + e^y}$$

23

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{(x + e^y) \left(-\frac{dy}{dx} \right) + y \left(1 + e^y \frac{dy}{dx} \right)}{(x + e^y)^2}$$

$$= \frac{(x + e^y) \left(\frac{y}{x + e^y} \right) + y \left(1 + e^y \frac{-y}{x + e^y} \right)}{(x + e^y)^2}$$

$$= \frac{(x + e^y)(y) + y(x + e^y - ye^y)}{(x + e^y)^3}$$

$$= \frac{2yx + 2ye^y - y^2e^y}{(x + e^y)^3}$$

$$(x - 6)(y + 4) = 2$$

$$(x - 6) \frac{dy}{dx} + (y + 4) = 0$$

24

$$(7 - 6) \frac{dy}{dx} + (-2 + 4) = 0 \Rightarrow \frac{dy}{dx} \Big|_{(7, -2)} = -2$$

إذن ميل العمودي على المماس هو $\frac{1}{2}$

$$y + 2 = \frac{1}{2}(x - 7) \Rightarrow y = \frac{1}{2}x - \frac{11}{2}$$

معادلة العمودي على المماس هي:



25	$3x^2 + 2xy + y^2 = 6$ $6x + 2x \frac{dy}{dx} + 2y + 2y \frac{dy}{dx} = 0$ $\frac{dy}{dx} = \frac{-3x - y}{x + y}$ $\frac{dy}{dx} = 0 \Rightarrow \frac{-3x - y}{x + y} = 0 \Rightarrow -3x - y = 0 \Rightarrow y = -3x$ $3x^2 + 2x(-3x) + (-3x)^2 = 6 \Rightarrow 6x^2 = 6 \Rightarrow x = \pm 1$ <p>إذن للمنحنى مماسان أفقيان عند نقطتين $(1, -3), (-1, 3)$</p>
26	$x + y^2 = 1$ $1 + 2y \frac{dy}{dx} = 0 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{-1}{2y}$ $\frac{-1}{2y} = -\frac{1}{2} \Rightarrow y = 1$ $\Rightarrow x + (1)^2 = 1 \Rightarrow x = 0$ <p>ميل المستقيم $x + 2y = 0$ هو $-\frac{1}{2}$</p> <p>النقطة المطلوبة هي $(0, 1)$</p>
27	$y^3 = x^2$ $3y^2 \frac{dy}{dx} = 2x \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{2x}{3y^2}, y \neq 0$ $\frac{2x}{3y^2} = \frac{1}{3} \Rightarrow 2x = y^2 \Rightarrow x = \frac{1}{2}y^2$ $y^3 = x^2 \Rightarrow y^3 = \frac{1}{4}y^4 \Rightarrow 1 = \frac{1}{4}y \Rightarrow y = 4$ $\Rightarrow x = \frac{1}{2}(4)^2 \rightarrow x = 8$ <p>ميل المستقيم $y + 3x - 5 = 0$ هو $\frac{1}{3}$ إذن ميل العمودي عليه يساوي 3</p> <p>النقطة المطلوبة هي $(8, 4)$</p>



$$x^2 + y^2 = 25 \Rightarrow 2x + 2y \frac{dy}{dx} = 0 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$$

$$y'' = -\frac{y - x \frac{dy}{dx}}{y^2} = \frac{x \frac{dy}{dx} - y}{y^2} = \frac{x \left(-\frac{x}{y}\right) - y}{y^2}$$

$$= \frac{-\frac{x^2}{y} - y}{y^2} = \frac{-x^2 - y^2}{y^3} = \frac{-(x^2 + y^2)}{y^3} = \frac{-25}{y^3}$$

28

$$\sqrt{\frac{x}{y}} + \sqrt{\frac{y}{x}} = 10, x > 0, y > 0$$

$$\frac{y - x \frac{dy}{dx}}{y^2} + \frac{x \frac{dy}{dx} - y}{x^2} = 0 \Rightarrow \frac{y - x \frac{dy}{dx}}{2y^2 \sqrt{\frac{x}{y}}} = \frac{y - x \frac{dy}{dx}}{2x^2 \sqrt{\frac{y}{x}}}$$

$$\Rightarrow \left(y - x \frac{dy}{dx}\right) \left(x^2 \sqrt{\frac{y}{x}}\right) = \left(y - x \frac{dy}{dx}\right) \left(y^2 \sqrt{\frac{x}{y}}\right)$$

29

$$x^2 y \sqrt{\frac{y}{x}} - x^3 \sqrt{\frac{y}{x}} \frac{dy}{dx} = y^3 \sqrt{\frac{x}{y}} - x y^2 \sqrt{\frac{x}{y}} \frac{dy}{dx}$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{y^3 \sqrt{\frac{x}{y}} - x^2 y \sqrt{\frac{y}{x}}}{x y^2 \sqrt{\frac{x}{y}} - x^3 \sqrt{\frac{y}{x}}}$$

$$= \frac{y(y^2 \sqrt{\frac{x}{y}} - x^2 \sqrt{\frac{y}{x}})}{x(y^2 \sqrt{\frac{x}{y}} - x^2 \sqrt{\frac{y}{x}})} = \frac{y}{x}$$

يمكن اختصار العامل المشترك من البسط والمقام لأنه لا يساوي صفرًا إلا إذا كان $y = x$ وهذا لا يتسق مع العلاقة الأصلية.



$$x^2 + y^2 = 100$$

$$2x + 2y \frac{dy}{dx} = 0$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$$

$$-\frac{x}{y} = \frac{3}{4} \Rightarrow y = -\frac{4}{3}x$$

30

$$x^2 + y^2 = 100 \Rightarrow x^2 + \left(-\frac{4}{3}x\right)^2 = 100$$

$$\Rightarrow \frac{25}{9}x^2 = 100$$

$$\Rightarrow x^2 = 36 \Rightarrow x = \pm 6$$

إذا كانت $x = 6$, فإن $y = -\frac{4}{3}(6) = -8$

وإذا كانت $x = -6$, فإن $y = -\frac{4}{3}(-6) = 8$

إذن، هناك نقطتان تحققان المطلوب هما $(6, -8), (-6, 8)$

$$y = \ln x, x > 0$$

$$e^y = x$$

بالتحويل إلى الصيغة الأسيّة ينتج أن:

باشتقاء الطرفين ضمنياً بالنسبة إلى x ينتج أن:

31

$$e^y \frac{dy}{dx} = 1 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{1}{e^y}$$

بتعييض $x = e^y$ ينتج أن:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{-\sin t}{\cos t} = -\tan t$$

32

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right)}{\frac{dx}{dt}} = \frac{-\sec^2 t}{\cos t} = -\sec^3 t$$

$$\left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{t=\frac{\pi}{4}} = -\sec^3 \frac{\pi}{4} = -2\sqrt{2}$$



	$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{3t^2 + 1}{-e^{-t}} = e^t(-3t^2 - 1)$	
33	$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right) = \frac{(e^t)(-6t) + (-3t^2 - 1)(e^t)}{-e^{-t}} = e^{2t}(1 + 6t + 3t^2)$ $\frac{d^2y}{dx^2} \Big _{t=0} = e^0(1) = 1$	
	$x^3 + y^3 = 6xy$ $y = x \Rightarrow x^3 + x^3 = 6x^2$ $\Rightarrow x^3 = 3x^2$ $\Rightarrow x^2(x - 3) = 0$ $\Rightarrow x = 0, \quad x = 3$	
34	$3x^2 + 3y^2 \frac{dy}{dx} = 6x \frac{dy}{dx} + 6y \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{2y - x^2}{y^2 - 2x}$ $\frac{dy}{dx} \Big _{(3,3)} = \frac{6-9}{9-6} = -1$ $y - 3 = -(x - 3) \Rightarrow y = -x + 6$	<p>نقطة التقاطع في الربع الأول هي (3,3)</p> <p>ميل المماس هو:</p> <p>معادلة المماس هي:</p>



بما أن المماس أفقي، فإن $\frac{dy}{dx} = 0$

$$\frac{2y - x^2}{y^2 - 2x} = 0 \Rightarrow 2y - x^2 = 0 \Rightarrow y = \frac{1}{2}x^2$$

$$x^3 + y^3 = 6xy \Rightarrow x^3 + \frac{1}{8}x^6 = 3x^3$$


$$\Rightarrow \frac{1}{8}x^6 - 2x^3 = 0$$

$$\Rightarrow x^6 - 16x^3 = 0$$

$$\Rightarrow x^3(x^3 - 16) = 0 \Rightarrow x = 0, x = \sqrt[3]{16}$$

$$\Rightarrow y = 0, y = \frac{1}{2}\sqrt[3]{(16)^2}$$

النقطة المطلوبة في الربع الأول هي: $(\sqrt[3]{16}, \frac{1}{2}\sqrt[3]{(16)^2})$



لتكن نقطة التماس $A(x_1, y_1)$

باشتراك طرف العلاقة $x^2 + y^2 = 2$ بالنسبة إلى x نجد أن:

$$2x + 2y \frac{dy}{dx} = 0 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$$

إذن، ميل المماس l هو $-\frac{x_1}{y_1}$

لكن ميل المماس l هو -1

$$-\frac{x_1}{y_1} = -1 \Rightarrow x_1 = y_1$$

وبتعويض (x_1, y_1) في المعادلة المعطاة نجد أن:

$$x_1^2 + y_1^2 = 2$$

وبتعويض $x_1 = y_1$ في هذه المعادلة نجد أن:

$$x_1^2 + x_1^2 = 2 \Rightarrow 2x_1^2 = 2 \Rightarrow x_1^2 = 1 \Rightarrow x_1 = 1$$

إذن، نقطة التماس هي: $A(1, 1)$ ، ومعادلة المماس l هي:

$$y - 1 = -1(x - 1) \Rightarrow y = -x + 2$$

$$x^2 - y^2 = 1 \Rightarrow 2x - 2y \frac{dy}{dx} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{x}{y}$$

$$38 \quad \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\sec^2 t}{\sec t \tan t} = \frac{\sec t}{\tan t}$$



39	$\frac{dy}{dx} = \frac{\sec t}{\tan t} = \frac{x}{y}$	المقداران الجبريان اللذان يمثلان $\frac{dy}{dx}$ متكافئان، لأنه من نص السؤال: $\frac{\sec t}{\tan t} = \frac{x}{y} \quad \text{و منه فإن } y = \tan t \quad \text{و } x = \sec t$
40	$\frac{dy}{dx} = 2 \Rightarrow \frac{x}{y} = 2 \Rightarrow x = 2y$ $x^2 - y^2 = 1 \Rightarrow (2y)^2 - y^2 = 1$ $\Rightarrow y^2 = \frac{1}{3}$ $\Rightarrow y = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$ $y = \frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow x = \frac{2}{\sqrt{3}}, \quad y = -\frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow x = -\frac{2}{\sqrt{3}}$ $\left(-\frac{2}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}\right), \left(\frac{2}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$	
		النقاط التي يكون عندها ميل المماس 2 هي: (x_1, y_1) فيكون ميل المماس:
	$\sqrt{x} + \sqrt{y} = \sqrt{k}$ $\frac{1}{2\sqrt{x}} + \frac{dy}{2\sqrt{y}} = 0 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{\sqrt{y}}{\sqrt{x}}$ $\frac{dy}{dx} \Big _{(x_1, y_1)} = -\frac{\sqrt{y_1}}{\sqrt{x_1}}$	معادلة المماس: $y - y_1 = -\frac{\sqrt{y_1}}{\sqrt{x_1}}(x - x_1)$
41	$y - y_1 = -\frac{\sqrt{y_1}}{\sqrt{x_1}}(x - x_1)$ $x = 0 \Rightarrow y - y_1 = -\frac{\sqrt{y_1}}{\sqrt{x_1}}(-x_1) \Rightarrow y = y_1 + \sqrt{y_1}\sqrt{x_1}$ $y = 0 \Rightarrow y_1 = \frac{\sqrt{y_1}}{\sqrt{x_1}}(x - x_1) \Rightarrow x = x_1 + \sqrt{y_1}\sqrt{x_1}$ $y_1 + \sqrt{y_1}\sqrt{x_1} + x_1 + \sqrt{y_1}\sqrt{x_1} = y_1 + 2\sqrt{y_1}\sqrt{x_1} + x_1$ $= (\sqrt{y_1} + \sqrt{x_1})^2$ $= (\sqrt{k})^2 = k$	المقطع x والمقطع y للمماس: مجموع المقطعين: $y_1 + \sqrt{y_1}\sqrt{x_1} + x_1 + \sqrt{y_1}\sqrt{x_1} = y_1 + 2\sqrt{y_1}\sqrt{x_1} + x_1 = (\sqrt{y_1} + \sqrt{x_1})^2 = (\sqrt{k})^2 = k$



الدرس الخامس: المعدلات المرتبطة

مأساة اليوم صفحة 135

$$S = \frac{\sqrt{hm}}{19} = \frac{\sqrt{170m}}{19} = \frac{\sqrt{170}}{19} \sqrt{m}$$

$$\frac{dm}{dt} = -2 \text{ kg/month}$$

$$\left. \frac{dS}{dt} \right|_{m=70}$$

$$S = \frac{\sqrt{170}}{19} \sqrt{m}$$

$$\frac{dS}{dt} = \frac{\sqrt{170}}{38\sqrt{m}} \frac{dm}{dt}$$

$$\left. \frac{dS}{dt} \right|_{m=70} = \frac{\sqrt{170}}{38\sqrt{70}} \times -2$$

$$\approx -0.082 \text{ cm}^2/\text{month}$$

معدل التغير المعطى:

معدل التغير المطلوب:

العلاقة بين الكثافة ومساحة سطح الجسم:

أتحقق من فهمي صفحة 137

ليكن حجم الكرة V وطول نصف قطرها r

معدل التغير المعطى:

معدل التغير المطلوب:

حجم البالون الكروي:

$$\frac{dV}{dt} = 80 \text{ cm}^3/\text{s}$$

$$\left. \frac{dr}{dt} \right|_{r=6}$$

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

$$\frac{dV}{dt} = 4\pi r^2 \frac{dr}{dt}$$

$$\left. \frac{dV}{dt} \right|_{r=6} = 4\pi(6)^2 \left. \frac{dr}{dt} \right|_{r=6}$$

$$80 = 144\pi \left. \frac{dr}{dt} \right|_{r=6}$$

$$\left. \frac{dr}{dt} \right|_{r=6} = \frac{80}{144\pi}$$

$$= \frac{5}{9\pi} \text{ cm/s}$$

$$\frac{dV}{dt} = 80 \text{ cm}^3/\text{s}$$

$$\left. \frac{dr}{dt} \right|_{r=6}$$

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

$$\frac{dV}{dt} = 4\pi r^2 \frac{dr}{dt}$$

$$\left. \frac{dV}{dt} \right|_{r=6} = 4\pi(6)^2 \left. \frac{dr}{dt} \right|_{r=6}$$

$$80 = 144\pi \left. \frac{dr}{dt} \right|_{r=6}$$

$$\left. \frac{dr}{dt} \right|_{r=6} = \frac{80}{144\pi}$$

$$= \frac{5}{9\pi} \text{ cm/s}$$


$$\frac{dV}{dt} = 80 \text{ cm}^3/\text{s}$$

$$\left. \frac{dr}{dt} \right|_{r=6}$$



أتحقق من فهمي صفة 139

ليكن بعد A عن نقطة الانطلاق يساوي y ، و بعد B عن نقطة الانطلاق يساوي x ، والبعد بين A ، و B يساوي z



$$\frac{dx}{dt} = 40 \text{ km/h}, \quad \frac{dy}{dt} = 45 \text{ km/h}$$

$$\left. \frac{dz}{dt} \right|_{t=2}$$

معدلات التغير المعطاة:

معدل التغير المطلوب:

بعد ساعتين من الحركة يكون:

من نظرية فيثاغورس:

$$x = 40 \times 2 = 80 \text{ km}, \quad y = 45 \times 2 = 90 \text{ km}$$

$$z^2 = x^2 + y^2$$

$$z = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\frac{dz}{dt} = \frac{x \frac{dx}{dt} + y \frac{dy}{dt}}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$\left. \frac{dz}{dt} \right|_{t=2} = \frac{80 \times 40 + 90 \times 45}{\sqrt{6400 + 8100}} = \frac{7250}{725} = \frac{10\sqrt{145}}{\sqrt{145}} \approx 60.21 \text{ km/h}$$

الحل بطريقة ثانية:

بعد t ساعة من الحركة يكون:

من نظرية فيثاغورس:

$$x = 40t \text{ km}, \quad y = 45t \text{ km}$$

$$z^2 = x^2 + y^2$$


$$z = \sqrt{(40t)^2 + (45t)^2} = \sqrt{3625} t$$

$$\frac{dz}{dt} = \sqrt{3625} \approx 60.21$$

$$\left. \frac{dz}{dt} \right|_{t=2} \approx 60.21 \text{ km/h}$$



أتحقق من فهمي صفة 141



ليكن طول الخيط L وقياس الزاوية بين الخيط والأفقي θ ، وبعد الطائرة أفقياً هو x .

$$\frac{dx}{dt} = 2 \text{ m/s}$$

$$\left. \frac{d\theta}{dt} \right|_{L=100}$$

$$\tan \theta = \frac{50 - 1.5}{x} = \frac{48.5}{x}$$

$$\sec^2 \theta \frac{d\theta}{dt} = -\frac{48.5}{x^2} \frac{dx}{dt}$$

$$\frac{L^2}{x^2} \times \frac{d\theta}{dt} = -\frac{48.5}{x^2} \frac{dx}{dt}$$

$$\frac{d\theta}{dt} = -\frac{48.5 \left(\frac{dx}{dt} \right)}{x^2} \times \frac{x^2}{L^2} = \frac{48.5 \left(\frac{dx}{dt} \right)}{L^2}$$


$$\left. \frac{d\theta}{dt} \right|_{L=100} = -\frac{48.5(2)}{(100)^2} \approx -0.0097 \text{ rad/s}$$

المعطى:

المطلوب:



أتحقق من فهمي صفحة 143



لتكن الأبعاد والقياسات كما في الشكل أعلاه

المعطى:

$$\omega = \frac{d\theta}{dt} = 4(2\pi) = -8\pi \text{ rad/min}$$

المطلوب:

$$\left. \frac{dx}{dt} \right|_{x=1}$$

$$\tan \theta = \frac{x}{3} \Rightarrow x = 3 \tan \theta$$

$$\Rightarrow \frac{dx}{dt} = 3 \sec^2 \theta \frac{d\theta}{dt}$$



National Center
for Curriculum Development

$$x = 3 \tan \theta \Rightarrow 1 = 3 \tan \theta \Rightarrow \tan \theta = \frac{1}{3}$$

$$\sec^2 \theta = 1 + \tan^2 \theta = 1 + \frac{1}{9} = \frac{10}{9}$$

$$\left. \frac{dx}{dt} \right|_{x=1} = 3 \sec^2 \theta \frac{d\theta}{dt} = 3 \times \frac{10}{9} \times -8\pi = -\frac{80\pi}{3}$$


سرعة بقعة ضوء المصباح على الجدار هي $\frac{80\pi}{3}$ m/min – عندما تبعد 1 m عن A ، أثناء حركتها مقتربة من

نجد قيمة $\sec^2 \theta$ عندما

النقطة A



أتحقق من فهمي صفة 144



ليكن حجم الماء في الخزان V ونصف قطر قاعدته r وارتفاعه h

$$\frac{dV}{dt} = \pi \text{ m}^3/\text{min}$$

$$\left. \frac{dh}{dt} \right|_{h=8}$$

$$\frac{r}{h} = \frac{5}{10} \rightarrow r = \frac{1}{2}h$$

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3}\pi \left(\frac{1}{2}h\right)^2 h$$

$$V = \frac{\pi}{12}h^3$$

$$\frac{dV}{dt} = \frac{\pi}{4}h^2 \frac{dh}{dt}$$

$$\pi = \frac{\pi}{4}(8)^2 \frac{dh}{dt}$$

$$\left. \frac{dh}{dt} \right|_{h=8} = \frac{1}{16} \text{ m/min}$$

إذن، يزداد ارتفاع الماء في الخزان بمعدل $\frac{1}{16} \text{ m/min}$ عندما يكون ارتفاعه 8 m

أتدرب وأحل المسائل صفة 145

ليكن طول المستطيل x وعرضه y ومساحته A ومحيطه P وطول قطره R

$$\frac{dy}{dt} = -3 \text{ cm/s}, \quad \frac{dx}{dt} = 2 \text{ cm/s}$$

$$1 \quad \left. \frac{dA}{dt} \right|_{x=20,y=50}$$

$$A = xy \Rightarrow \frac{dA}{dt} = x \frac{dy}{dt} + y \frac{dx}{dt}$$

$$\Rightarrow \left. \frac{dA}{dt} \right|_{x=20,y=50} = 20(-3) + 50(2) = 40 \text{ cm}^2/\text{s}$$



2	$P = 2x + 2y \Rightarrow \frac{dP}{dt} = 2\frac{dx}{dt} + 2\frac{dy}{dt}$ $\Rightarrow \left. \frac{dP}{dt} \right _{x=20,y=50} = 2(2) + 2(-3) = -2 \text{ cm/s}$		
3	$R^2 = x^2 + y^2$ $2R\frac{dR}{dt} = 2x\frac{dx}{dt} + 2y\frac{dy}{dt}$	$\sqrt{(20)^2 + (50)^2}\left. \frac{dR}{dt} \right _{x=20,y=50} = 20(2) + 50(-3)$ $\left. \frac{dR}{dt} \right _{x=20,y=50} = -\frac{110}{10\sqrt{29}} = -\frac{11}{\sqrt{29}} \text{ cm/s}$	
4	<p>في اللحظة المذكورة تكون المساحة متزايدة (لأن معدل تغيرها موجب)، بينما يتناقص كل من المحيط وطول القطر (لأن معدل تغير كل منهما سالب).</p>		
5	$\frac{dx}{dt} = 6 \text{ cm/s}$ $\left. \frac{dV}{dt} \right _{t=4}$	<p>ليكن حجم المكعب V وطول ضلعه (x)</p> <p>المعطى:</p> <p>المطلوب:</p> <p>بعد مرور t ثانية يصبح طول ضلع المكعب:</p> <p>ويكون حجمه:</p>	
6	$x = 10 + 6t$ $V = x^3 = (10 + 6t)^3$ $\frac{dV}{dt} = 3(10 + 6t)^2 \times 6$ $\left. \frac{dV}{dt} \right _{t=4} = 3(34)^2(6) = 20808 \text{ cm}^3/\text{s}$	$6x^2 = 6(10 + 6t)^2$ $\frac{dA}{dt} = 12(10 + 6t) \times 6$ $\left. \frac{dA}{dt} \right _{t=6} = 12(46)(6) = 3312 \text{ cm}^2/\text{s}$	<p>لتكن مساحة سطح المكعب A</p> <p>بعد مرور t ثانية تصبح مساحة سطح المكعب:</p> <p>$A =$</p>



لبن ارتفاع الوقود في الخزان h ، سيكون طول نصف قطر قاعدته 1 m ، ويكون حجمه:

$$V = \pi r^2 h = \pi h$$

$$\frac{dV}{dt} = 500\text{L/min} = 0.5 \text{ m}^3/\text{min}$$

المعطى:

المطلوب:

7

$$V = \pi h$$

العلاقة التي تربط الحجم بالارتفاع:

$$\frac{dV}{dt} = \pi \frac{dh}{dt}$$

$$0.5 = \pi \frac{dh}{dt}$$

$$\frac{dh}{dt} = \frac{1}{2\pi} \text{ m/min}$$

8

$$A = 2\pi r h = 2\pi h$$

$$\frac{dA}{dt} = 2\pi \frac{dh}{dt}$$

$$= 2\pi \times \frac{1}{2\pi} = 1 \text{ m}^2/\text{min}$$



لبن حجم كومة الرمل V ، وارتفاعها h ، وطول نصف قطر قاعدتها r

$$\frac{dV}{dt} = 10 \text{ m}^3/\text{min} \quad , h = \frac{3}{8}(2r)$$

$$\frac{dh}{dt} \Big|_{h=4}$$

$$h = \frac{3}{8}(2r) \Rightarrow r = \frac{4}{3}h$$

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3}\pi \left(\frac{4}{3}h\right)^2 h$$

9

$$V = \frac{16}{27}\pi h^3$$

$$\frac{dV}{dt} = \frac{16}{9}\pi h^2 \frac{dh}{dt}$$

$$10 = \frac{16}{9}\pi(4)^2 \frac{dh}{dt}$$

$$\frac{dh}{dt} \Big|_{h=4} = \frac{45}{128\pi} \text{ m/min}$$

إذن يزداد ارتفاع الكومة المخروطية عند تلك اللحظة بمعدل 0.112 مترًا لكل ثانية تقريبًا.

$$r = \frac{4}{3}h$$

$$\frac{dr}{dt} = \frac{4}{3} \frac{dh}{dt}$$

10

$$\frac{dr}{dt} \Big|_{h=4} = \frac{4}{3} \frac{dh}{dt} \Big|_{h=4} = \frac{4}{3} \times \frac{45}{128\pi} = \frac{15}{32\pi} \text{ m/min}$$

إذن يزداد نصف القطر عند تلك اللحظة بمعدل 0.149 مترًا لكل ثانية تقريبًا.



لتكن A مساحة قاعدة الكومة، وطول نصف قطرها r

$$\frac{dA}{dt} \Big|_{h=4}$$

$$A = \pi r^2$$

$$\frac{dA}{dt} = 2\pi r \frac{dr}{dt}$$

المطلوب:

$$\text{للتكن } A \text{ مساحة قاعدة الكومة، وطول نصف قطرها } r \text{ من سؤال 10، } \frac{dr}{dt} \Big|_{h=4} = \frac{15}{32\pi}$$

للتكن $(2r) = h = \frac{3}{8}(2r)$ ، فعندما يكون الارتفاع 4 m يكون :

$$4 = \frac{3}{8}(2r) \Rightarrow r = \frac{16}{3}$$

$$\Rightarrow \frac{dA}{dt} \Big|_{h=4} = 2\pi \times \frac{16}{3} \times \frac{15}{32\pi} = 5 \text{ m}^2/\text{min}$$

إذن، تردد مساحة قاعدة الكومة بمعدل $5 \text{ m}^2/\text{min}$ عندما يكون ارتفاعها 4 أمتار .

ليكن بعد الطائرة الأولى عن نقطة التقاء المسارين في لحظة ما هو x ،

وبعد الطائرة الثانية عن نقطة التقاء المسارين في تلك اللحظة هو y ، والبعد بين الطائرتين هو s .

$$\frac{dx}{dt} = -450 \text{ km/h}$$

$$\frac{dy}{dt} = -600 \text{ km/h}$$

المعطى:

$$\frac{ds}{dt} \Big|_{x=225, y=300}$$

$$s^2 = x^2 + y^2$$

$$2s \frac{ds}{dt} = 2x \frac{dx}{dt} + 2y \frac{dy}{dt}$$

$$\frac{ds}{dt} = \frac{x \frac{dx}{dt} + y \frac{dy}{dt}}{s} = \frac{x \frac{dx}{dt} + y \frac{dy}{dt}}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$\frac{ds}{dt} \Big|_{x=225, y=450} = \frac{225(-450) + 300(-600)}{\sqrt{(225)^2 + (300)^2}} = -750 \text{ km/h}$$

المطلوب:

إذن في تلك اللحظة تقل المسافة بين الطائرتين بمعدل $750 \text{ كيلومترًا في الساعة}$.



نحسب الوقت الذي تحتاجه كل من الطائرتين للوصول لنقطة التقائه المسارين:


$$t_1 = \frac{x}{v_x} = \frac{225}{450} = 0.5 \text{ h}$$

$$t_2 = \frac{y}{v_y} = \frac{300}{600} = 0.5 \text{ h}$$

13

بما أن الطائرتين ستصلان لنقطة التقائه المسارين بعد نصف ساعة من لحظة رصدهما من قبل المراقب الجوي، فإن اصطدامهما متوقع، ويجب على مراقب الحركة الجوية التوجيه بالتغيير اللازم في مسار إحداهما أو في سرعتها على الأقل حتى لا تصلان إلى نقطة التقائه المسارين معًا في الوقت نفسه.

الدرجة الثانية



المعطى:

$$\frac{dx}{dt} = 15 \text{ km/h}$$

$$\frac{dy}{dt} = 20 \text{ km/h}$$

المطلوب:

14

$$\frac{dz}{dt} \Big|_{t=2}$$

بعد t ساعة من انطلاقهما يكون: $x = 15t$, $y = 20t$

$$z = \sqrt{x^2 + y^2 - 2xy \cos \frac{\pi}{3}}$$

$$z = \sqrt{(15t)^2 + (20t)^2 - 2(15t)(20t) \left(\frac{1}{2}\right)} = 5\sqrt{13}t$$


$$\frac{dz}{dt} = 5\sqrt{13}$$

$$\frac{dz}{dt} \Big|_{t=2} = 5\sqrt{13} \text{ km/h}$$

إذن بعد ساعتين من انطلاقهما تبعاً لدرجاتان كل منهما عن الآخر بسرعة $5\sqrt{13}$ كيلومتر كل ساعة



لتكن الأبعاد كما في الشكل:



المعطى:

المطلوب:

15

$$\frac{dL}{dt} = -1 \text{ m/s}$$

$$\left. \frac{dx}{dt} \right|_{x=8}$$

$$L^2 = x^2 + 1$$


$$2L \frac{dL}{dt} = 2x \frac{dx}{dt}$$

$$\frac{dx}{dt} = \frac{L}{x} \times \frac{dL}{dt} = \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x} \times \frac{dL}{dt}$$

$$\left. \frac{dx}{dt} \right|_{x=8} = \frac{\sqrt{8^2 + 1}}{8} \times -1 = -\frac{\sqrt{65}}{8} \text{ m/s}$$

إذن في تلك اللحظة يقترب القارب من الرصيف بسرعة $\frac{\sqrt{65}}{8}$ m/s

لتكن x كما في الشكل:



المعطى:

المطلوب:

16

$$\frac{dx}{dt} = -264 \text{ ft/s}$$

$$\left. \frac{d\theta}{dt} \right|_{\theta=0}$$

$$\tan \theta = \frac{x}{132}$$


$$\sec^2 \theta \frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{132} \frac{dx}{dt}$$

$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{132} \frac{dx}{dt} \times \cos^2 \theta$$

$$\left. \frac{d\theta}{dt} \right|_{\theta=0} = \frac{1}{132} (-264) \cos^2 0 = -2 \text{ rad/s}$$



لتكن x كما في الشكل:



$$\frac{dx}{dt} = 264 \text{ ft/s}$$

بعد تجاوز السيارة للكاميرا تتزايد المسافة x حيث يصبح

$$\left. \frac{d\theta}{dt} \right|_{t=0.5 \text{ s}}$$

$$x = 0.5 \times 264 = 132$$

$$\tan \theta = 1 \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{4}$$

بعد نصف ثانية:

17

$$\tan \theta = \frac{x}{132}$$

$$\sec^2 \theta \frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{132} \frac{dx}{dt}$$

$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{132} \frac{dx}{dt} \times \cos^2 \theta$$

$$\begin{aligned} \left. \frac{d\theta}{dt} \right|_{t=0.5 \text{ s}} &= \frac{1}{132} (264) \times \cos^2 \left(\frac{\pi}{4} \right) \\ &= 2 \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^2 = 1 \text{ rad/s} \end{aligned}$$

يزداد قياس الزاوية θ بسرعة 1 rad/s في تلك اللحظة.



ليكن الجسم عند النقطة $P(x, 2 \sin \frac{\pi x}{2})$ في أي لحظة، O نقطة الأصل، ولتكن

$$\left. \frac{dx}{dt} \right|_{x=\frac{1}{3}} = \sqrt{10} \text{ units/s}$$

$$\left. \frac{dL}{dt} \right|_{x=\frac{1}{3}}$$

$$L^2 = (x - 0)^2 + \left(2 \sin \frac{\pi x}{2} - 0\right)^2$$

$$L^2 = x^2 + 4 \sin^2 \frac{\pi x}{2}$$

$$2L \frac{dL}{dt} = 2x \frac{dx}{dt} + 8 \left(\frac{\pi}{2}\right) \sin \frac{\pi x}{2} \cos \frac{\pi x}{2} \frac{dx}{dt}$$

18

$$\frac{dL}{dt} = \frac{1}{L} \left(x + 2 \left(\frac{\pi}{2}\right) \sin \pi x \right) \frac{dx}{dt}$$

$$L = \sqrt{\left(\frac{1}{3}\right)^2 + 4 \sin^2 \left(\frac{\pi}{6}\right)} = \frac{\sqrt{10}}{3}$$

$$\left. \frac{dL}{dt} \right|_{x=\frac{1}{3}} = \frac{1}{\sqrt{10}} \left(\left(\frac{1}{3}\right) + 2 \left(\frac{\pi}{2}\right) \sin \frac{\pi}{3} \right) \sqrt{10}$$

$$= 1 + \frac{3\sqrt{3}\pi}{2}$$

إذن يزداد بعد الجسم عن نقطة الأصل في تلك اللحظة بسرعة $(1 + \frac{3\sqrt{3}\pi}{2})$ وحدة/ثانية

$$\omega = \frac{d\theta}{dt} = 10 \times 2\pi = 20\pi \text{ rad/s}$$

$$\frac{dx}{dt}$$

$$19 \quad \cos \theta = \frac{x}{30} \Rightarrow x = 30 \cos \theta$$

$$\Rightarrow \frac{dx}{dt} = -30 \sin \theta \frac{d\theta}{dt}$$

$$= -30(20\pi) \sin \theta = -600\pi \sin \theta$$

$$20 \quad \left. \frac{dx}{dt} \right|_{\theta=\frac{\pi}{4}} = -600\pi \sin \frac{\pi}{4} = -\frac{600\pi}{\sqrt{2}} \text{ cm/s}$$

المعطى:

المطلوب:

عندما $x = \frac{1}{3}$ ، فإن:

المعطى:

المطلوب:



ليكن بعد الرجل عن المصباح أفقيا x ، وطول ظله على الجدار L



$$\frac{dx}{dt} = 1.6 \text{ m/s}$$

المعطى:

21

$$\frac{dL}{dt} \Big|_{x=8}$$

المطلوب:

$$\frac{L}{2} = \frac{12}{x} \rightarrow L = \frac{24}{x}$$

من تشابه المثلثات:


$$\frac{dL}{dt} = \frac{-24 \frac{dx}{dt}}{x^2}$$

$$\frac{dL}{dt} \Big|_{x=8} = \frac{-24(1.6)}{64} = -0.6 \text{ m/s}$$





لتكن الأبعاد كما في الشكل أدناه:



$$\frac{dx}{dt} = 0.5 \text{ m/s}$$

$$\left. \frac{dy}{dt} \right|_{x=3}$$

$$AP + BP = \sqrt{x^2 + 16} + \sqrt{y^2 + 16} = 12$$

عندما $x = 3$ فإن: $\sqrt{9 + 16} + \sqrt{y^2 + 16} = 12 \Rightarrow \sqrt{y^2 + 16} = 7 \Rightarrow y = \sqrt{33}$

$$\sqrt{x^2 + 16} + \sqrt{y^2 + 16} = 12$$

$$\frac{x \frac{dx}{dt}}{\sqrt{x^2 + 16}} + \frac{y \frac{dy}{dt}}{\sqrt{y^2 + 16}} = 0$$

$$\frac{dy}{dt} = -\frac{x \sqrt{y^2 + 16} dx}{y \sqrt{x^2 + 16} dt}$$

$$\left. \frac{dy}{dt} \right|_{x=3} = -\frac{3\sqrt{33 + 16}}{\sqrt{33}\sqrt{25}} \times 0.5 = -\frac{21}{10\sqrt{33}} \text{ m/s}$$

إذن، تقترب العربية B من النقطة Q بسرعة مقدارها $\frac{21}{10\sqrt{33}}$ m/s

المعطى:

المطلوب:



طول الحبل:

عندما $x = 3$ فإن: $y = \sqrt{33}$



لبن العداء عند A، وصديقه عند B، والبعد بينهما x كمًا في الشكل، ولتكن L هو طول القوس الأصغر AD.

توجد حلتان لموقع العداء كما في الرسمين الآتيين:



الحالة الأولى:

المعطى: (تكون L متناظرة) ويكون :

المطلوب:

$$\frac{dL}{dt} = -7 \text{ m/s}$$

$$\left. \frac{dx}{dt} \right|_{x=200 \text{ m}}$$

$$\Rightarrow \frac{d\theta}{dt} = -0.07 \text{ rad/s}$$

$$L = r\theta = 100\theta \Rightarrow \frac{dL}{dt} = 100 \frac{d\theta}{dt}$$

$$x^2 = (200)^2 + (100)^2 - 2(200)(100) \cos \theta$$

$$x^2 = 50000 - 40000 \cos \theta$$

$$2x \frac{dx}{dt} = 40000 \sin \theta \frac{d\theta}{dt}$$

$$\frac{dx}{dt} = \frac{20000 \sin \theta d\theta}{x}$$

$$\cos \theta = \frac{50000 - x^2}{40000}$$

$$\cos \theta = \frac{50000 - 40000}{40000} = \frac{1}{4}$$

$$\Rightarrow \sin \theta = \sqrt{1 - \left(\frac{1}{4}\right)^2} = \frac{\sqrt{15}}{4}$$

$$\left. \frac{dx}{dt} \right|_{x=200} = \frac{20000 \frac{\sqrt{15}}{4}}{200} \times -0.07 = -\frac{7\sqrt{15}}{4} \text{ m/s}$$

عندما $x = 200$ فإن:

الحالة الثانية:

عندما يتزايد طول القوس L، ويكون $\frac{d\theta}{dt} = 0.07 \text{ rad/s}$ ، ويكون $\frac{dL}{dt} = 7 \text{ m/s}$ ، وعليه فإن:

$$\left. \frac{dx}{dt} \right|_{x=200} = \frac{20000 \frac{\sqrt{15}}{4}}{200} \times 0.07 = \frac{7\sqrt{15}}{4} \text{ m/s}$$

إذن، عندما تكون المسافة بين العدائين 200 m، فإنهما يقتربان من بعضهما أو يتبعاً عن بعضهما

سرعة مقدارها $\frac{7\sqrt{15}}{4} \text{ m/s}$



اختبار نهاية الوحدة صفحة 148

1	C
2	B
3	D
4	D
5	C
6	A
7	d
8	d
9	$f(x) = e^x(x + x\sqrt{x})$ $f'(x) = (e^x) \left(1 + (x) \left(\frac{1}{2\sqrt{x}} \right) + (\sqrt{x})(1) \right) + (x + x\sqrt{x})(e^x)$ $= e^x \left(1 + \frac{3}{2}\sqrt{x} + x + x\sqrt{x} \right)$
10	$f(x) = \frac{x}{\tan x}$ $f'(x) = \frac{(\tan x)(1) - (x)(\sec^2 x)}{\tan^2 x} = \frac{\tan x - x \sec^2 x}{\tan^2 x}$
11	$f(x) = \frac{1}{x} - 12 \sec x$ $f'(x) = \frac{-1}{x^2} - 12 \sec x \tan x$
12	$f(x) = \frac{e^x}{\ln x}$ $f'(x) = \frac{(\ln x)(e^x) - (e^x)\left(\frac{1}{x}\right)}{\ln^2 x} = \frac{e^x(x \ln x - 1)}{x \ln^2 x}$
13	$f(x) = \frac{\ln x}{x^4}$ $f'(x) = \frac{(x^4)\left(\frac{1}{x}\right) - (\ln x)(4x^3)}{x^8} = \frac{1 - 4 \ln x}{x^5}$
14	$f(x) = 5^{2-x}$ $f'(x) = -(\ln 5)(5^{2-x})$



15	$f(x) = 10 \sin 0.5x$ $f'(x) = 5 \cos 0.5x$
16	$f(x) = \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}\right)^3 \left(x + \frac{1}{x}\right)^2$ $f'(x) = \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}\right)^3 \left(2\left(x + \frac{1}{x}\right)\left(1 - \frac{1}{x^2}\right)\right) + \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 \left(3\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}\right)^2 \left(-\frac{1}{x^2} - \frac{2}{x^3}\right)\right)$ $= \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}\right)^2 \left(x + \frac{1}{x}\right) \left(2\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}\right)\left(1 - \frac{1}{x^2}\right) + 3\left(x + \frac{1}{x}\right)\left(-\frac{1}{x^2} - \frac{2}{x^3}\right)\right)$ $= \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}\right)^2 \left(x + \frac{1}{x}\right) \left(\frac{2}{x} - \frac{2}{x^3} + \frac{2}{x^2} - \frac{2}{x^4} - \frac{3}{x} - \frac{6}{x^2} - \frac{3}{x^3} - \frac{6}{x^4}\right)$ $= -\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}\right)^2 \left(x + \frac{1}{x}\right) \left(\frac{8 + 5x + 4x^2 + x^3}{x^4}\right)$
17	$f(x) = e^{-1.5x} \cos x^2$ $f'(x) = (e^{-1.5x})(-2x \sin x^2) + (\cos x^2)(-1.5e^{-1.5x})$ $= -e^{-1.5x}(2x \sin x^2 + 1.5 \cos x^2)$
18	$(fg)'(2) = f(2)g'(2) + g(2)f'(2)$ $= 3 \times 2 + 1 \times -4 = 2$
19	$\left(\frac{f}{g}\right)'(2) = \frac{g(2)f'(2) - f(2)g'(2)}{g^2(2)} = \frac{1 \times -4 - 3 \times 2}{(1)^2} = -10$
20	$(3f - 4fg)'(2) = 3f'(2) - 4(fg)'(2) = 3(-4) - 4(2) = -20$
21	$f(x) = x^7 \ln x$ $f'(x) = (x^7)\left(\frac{1}{x}\right) + (\ln x)(7x^6) = x^6 + 7x^6 \ln x$ $f''(x) = 6x^5 + (7x^6)\left(\frac{1}{x}\right) + (\ln x)(42x^5) = 13x^5 + 42x^5 \ln x$



	$f(x) = \frac{\cos x}{x}$ $f'(x) = \frac{(x)(-\sin x) - (\cos x)(1)}{x^2} = \frac{-\sin x}{x} - \frac{\cos x}{x^2}$ $f''(x) = -\frac{x \cos x - \sin x}{x^2} - \frac{-x^2 \sin x - 2x \cos x}{x^4}$ $= \frac{-x^3 \cos x + 2x^2 \sin x + 2x \cos x}{x^4}$ $= \frac{-x^2 \cos x + 2x \sin x + 2 \cos x}{x^3}$
22	$f(x) = \frac{x}{1 + \sqrt{x}}$ $f'(x) = \frac{(1 + \sqrt{x})(1) - (x)\left(\frac{1}{2\sqrt{x}}\right)}{(1 + \sqrt{x})^2} = \frac{1 + \frac{1}{2}\sqrt{x}}{(1 + \sqrt{x})^2}$ $f''(x) = \frac{(1 + \sqrt{x})^2\left(\frac{1}{4\sqrt{x}}\right) - \left(1 + \frac{1}{2}\sqrt{x}\right)\left(\frac{1}{\sqrt{x}}(1 + \sqrt{x})\right)}{(1 + \sqrt{x})^4}$ $= \frac{-3 - \sqrt{x}}{4\sqrt{x}(1 + \sqrt{x})^3}$
23	$f(x) = \frac{1 - x^2}{1 + x^2}$ $f'(x) = \frac{(1 + x^2)(-2x) - (1 - x^2)(2x)}{(1 + x^2)^2} = \frac{-4x}{(1 + x^2)^2}$ $f''(x) = \frac{(1 + x^2)^2(-4) - (-4x)(2 \times 2x(1 + x^2))}{(1 + x^2)^4}$ $= \frac{12x^2 - 4}{(1 + x^2)^3}$



	$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{1}{2t}$		
25	$m = \left. \frac{dy}{dx} \right _{t=4} = \frac{1}{8}$	ميل المماس:	
	$x = (4)^2 = 16, y = 4 + 2 = 6 \Rightarrow (16, 6)$	نقطة التماس:	
	$y - 6 = \frac{1}{8}(x - 16) \Rightarrow y = \frac{1}{8}x + 4$	معادلة المماس:	
	$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{3 \cos t}{-4 \sin t} = -\frac{3}{4} \cot t$	ميل المماس:	
26	$m = \left. \frac{dy}{dx} \right _{t=\frac{\pi}{4}} = -\frac{3}{4} \cot \frac{\pi}{4} = -\frac{3}{4}$	نقطة التماس:	
	$x = 4 \cos \frac{\pi}{4} = 2\sqrt{2}, y = 3 \sin \frac{\pi}{4} = \frac{3\sqrt{2}}{2} \Rightarrow \left(2\sqrt{2}, \frac{3\sqrt{2}}{2} \right)$	معادلة المماس:	
	$y - \frac{3\sqrt{2}}{2} = -\frac{3}{4}(x - 2\sqrt{2}) \Rightarrow y = -\frac{3}{4}x + 3\sqrt{2}$	محل المماس:	
	$y = x \ln x$	محل المماس:	
27	$f'(x) = (x) \left(\frac{1}{x}\right) + (\ln x)(1) = 1 + \ln x$ $f'(1) = 1 + \ln 1 = 1$	معادلة المماس:	
	$y - 0 = 1(x - 1) \Rightarrow y = x - 1$	نقطة المطلوبة هي (e, e)	
28	$f'(x) = 2 \Rightarrow 1 + \ln x = 2$ $\Rightarrow \ln x = 1$ $\Rightarrow x = e \Rightarrow y = e \ln e = e$		



29	$x(x+y) = 2y^2 \Rightarrow x^2 + xy = 2y^2$ $\Rightarrow 2x + x \frac{dy}{dx} + y = 4y \frac{dy}{dx}$ $\Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{2x+y}{4y-x}$
30	$x = \frac{2y}{x^2 - y}$ $1 = \frac{2 \frac{dy}{dx} (x^2 - y) - 2y(2x - \frac{dy}{dx})}{(x^2 - y)^2}$ $(x^2 - y)^2 + 4xy = 2x^2 \frac{dy}{dx} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{(x^2 - y)^2 + 4xy}{2x^2}$
31	$y \cos x = x^2 + y^2 \Rightarrow -y \sin x + \frac{dy}{dx} \cos x = 2x + 2y \frac{dy}{dx}$ $\Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{2x + y \sin x}{-2y + \cos x}$
32	$2xe^y + ye^x = 3 \Rightarrow 2xe^y \frac{dy}{dx} + 2e^y + ye^x + e^x \frac{dy}{dx} = 0$ $\Rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{2e^y + ye^x}{2xe^y + e^x}$
33	$y^2 = \frac{x^3}{2-x}$ $2y \frac{dy}{dx} = \frac{(2-x)(3x^2) - (x^3)(-1)}{(2-x)^2}$ $2(-1) \frac{dy}{dx} = \frac{(2-1)(3) - (1)(-1)}{(2-1)^2} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = -2$ <p style="text-align: right;">ميل المماس:</p> $m = -2$ $m = \frac{-1}{-2} = \frac{1}{2}$ $y + 1 = \frac{1}{2}(x - 1) \Rightarrow y = \frac{1}{2}x - \frac{3}{2}$ <p style="text-align: right;">مترافق مع المماس:</p> <p style="text-align: right;">معادلة العمودي على المماس :</p>



	$x^2 + 3xy + y^2 = x + 3y$ $2x + 3x \frac{dy}{dx} + 3y + 2y \frac{dy}{dx} = 1 + 3 \frac{dy}{dx}$		
34	$4 + 6 \frac{dy}{dx} - 3 - 2 \frac{dy}{dx} = 1 + 3 \frac{dy}{dx}$ $\frac{dy}{dx} \Big _{(2,-1)} = 0$		ميل المماس عند $(-1, 2)$:
	$y + 1 = 0(x - 2) \Rightarrow y = -1$		معادلة المماس:
	$x^2 e^y = 1$		ميل المماس:
35	$x^2 e^y \frac{dy}{dx} + 2xe^y = 0$ $\frac{dy}{dx} + 2 = 0 \Rightarrow \frac{dy}{dx} \Big _{(1,0)} = -2$		معادلة المماس:
	$y - 0 = -2(x - 1) \Rightarrow y = -2x + 2$		معادلة المماس:
36	$p'(1) = f(1)g'(1) + g(1)f'(1) = 2 \times 1 + 3 \times -2 = -4$		
37	$p'(4) = f(4)g'(4) + g(4)f'(4) = 1 \times 0 + 8 \times 0.5 = 4$		
38	$q'(7) = \frac{g(7)f'(7) - f(7)g'(7)}{(g(7))^2} = \frac{4 \times 2 - 4 \times -1}{(4)^2} = \frac{3}{4}$		
39	$R(t) = 200(0.9)^t$ $\frac{dR}{dt} = 200(0.9)^t \ln 0.9$ $\frac{dR}{dt} \Big _{t=2} = 200(0.9)^2 \ln 0.9 \approx -17.1 \text{ g/day}$		
40	$s(t) = 10 + \frac{1}{4} \sin(10\pi t)$ $v(t) = \frac{5\pi}{2} \cos(10\pi t)$ $a(t) = -25\pi^2 \sin(10\pi t)$		



$$\frac{dx}{dt} = 17 \text{ ft/s}, \text{ وسرعة الراجلة } \frac{dy}{dt} = 1 \text{ ft/s}$$

$$\text{المطلوب: } \left. \frac{ds}{dt} \right|_{t=3}$$

بعد t ثانية من مرور الراجلة يكون ارتفاع البالون فوق سطح الأرض هو: $y = 65 + t$
ونكون الراجلة قطعت مسافة أفقية هي: $x = 17t$

ونكون المسافة بين الراجلة والبالون هي s

ومن نظرية فيثاغورس نجد أن:

$$41 \quad s^2 = x^2 + y^2 \\ s^2 = (17t)^2 + (65 + t)^2$$

$$s = \sqrt{(17t)^2 + (65 + t)^2}$$

$$\frac{ds}{dt} = \frac{2(17t)(17) + 2(65 + t)(1)}{2\sqrt{(17t)^2 + (65 + t)^2}} = \frac{289t + 65 + t}{\sqrt{(17t)^2 + (65 + t)^2}} \\ = \frac{290t + 65}{\sqrt{(17t)^2 + (65 + t)^2}}$$

$$\left. \frac{ds}{dt} \right|_{t=3} = \frac{290(3) + 65}{\sqrt{(17 \times 3)^2 + (65 + 3)^2}} = \frac{935}{85} = 11 \text{ ft/s}$$

إذن تزداد المسافة بين البالون والراجلة بمعدل 11 قدماً في الثانية وذلك بعد مرور 3 ثوانٍ من لحظة مرور الراجلة تحت البالون.



الوحدة الرابعة: الأعداد المركبة

الدرس الأول: الأعداد المركبة

مسألة اليوم صفحة 152

إذا تصورنا وجود جذر تربيعي للعدد -1 في مجموعة ما من مجموعات الأعداد، فإن:

$$(\sqrt{-1})^2 + 1 = -1 + 1 = 0$$

وبالتالي يكون $\sqrt{-1}$ حلًّا للمعادلة $x^2 + 1 = 0$

أتحقق من فهمي صفحة 153

a) $\sqrt{-75} = \sqrt{-1 \times 25 \times 3} = \sqrt{-1} \times \sqrt{25} \times \sqrt{3} = 5i\sqrt{3}$

b) $\sqrt{-49} = \sqrt{-1 \times 49} = \sqrt{-1} \times \sqrt{49} = 7i$

أتحقق من فهمي صفحة 154

a)
$$\begin{aligned}\sqrt{-27} \times \sqrt{-48} &= \sqrt{-1 \times 27} \times \sqrt{-1 \times 48} \\ &= i\sqrt{9 \times 3} \times i\sqrt{16 \times 3} \\ &= i^2\sqrt{9 \times 3 \times 16 \times 3} \\ &= 36i^2 = -36\end{aligned}$$

b)
$$\begin{aligned}\sqrt{-50} \times -4i &= \sqrt{-1 \times 50} \times (-4i) \\ &= 5i\sqrt{2} \times (-4i) = -20\sqrt{2}i^2 = 20\sqrt{2}\end{aligned}$$

c) $i^{2021} = (i^2)^{1010} \times i = (-1)^{1010} \times i = i$


أتحقق من فهمي صفحة 156

$$\begin{aligned}x + 5 + (4y - 9)i &= 12 - 5i \Rightarrow x + 5 = 12 \text{ و } 4y - 9 = -5 \\ \Rightarrow x &= 7, y = 1\end{aligned}$$




تحقق من فهمي صفة 157


a) $z = 2 + 7i$, $\bar{z} = 2 - 7i$



b) $z = -3 - 2i$, $\bar{z} = -3 + 2i$



c) $z = -3i$, $\bar{z} = 3i$



تحقق من فهمي صفة 158

a) $z = -3 - 6i\sqrt{2}$ $\Rightarrow |z| = \sqrt{(-3)^2 + (-6\sqrt{2})^2} = \sqrt{81} = 9$

b) $z = -2i$ $\Rightarrow |z| = \sqrt{(0)^2 + (-2)^2} = \sqrt{4} = 2$

c) $z = 4 + \sqrt{-20} = 4 + \sqrt{-1} \times \sqrt{20} = 4 + i\sqrt{20}$

$\Rightarrow |z| = \sqrt{(4)^2 + (\sqrt{20})^2} = \sqrt{36} = 6$



أتحقق من فهمي صفحة 162

a) $z = 8 + 2i$

$$\operatorname{Arg}(z) = \tan^{-1}\left(\frac{2}{8}\right) \approx 0.24$$

b) $z = -5 + 12i$

$$\operatorname{Arg}(z) = \pi - \tan^{-1}\left(\frac{12}{5}\right) \approx 1.97$$

c) $z = -2 - 3i$

$$\operatorname{Arg}(z) = -\left(\pi - \tan^{-1}\left(\frac{3}{2}\right)\right) \approx -2.16$$

d) $z = 8 - 8i\sqrt{3}$

$$\operatorname{Arg}(z) = -\tan^{-1}\left(\frac{8\sqrt{3}}{8}\right) = -\frac{\pi}{3} \approx -1.05$$

أتحقق من فهمي صفحة 164

a)

$$|z| = 4\sqrt{2}, \operatorname{Arg}(z) = -\frac{3\pi}{4}$$

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta) = 4\sqrt{2} \left(\cos\left(-\frac{3\pi}{4}\right) + i \sin\left(-\frac{3\pi}{4}\right) \right)$$

b) $z = -4 - 4i$

$$\Rightarrow r = |z| = \sqrt{(-4)^2 + (-4)^2} = 4\sqrt{2}$$

$$\operatorname{Arg}(z) = -\left(\pi - \tan^{-1}\left(\frac{4}{4}\right)\right) = -\frac{3\pi}{4}$$

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta) = 4\sqrt{2} \left(\cos\left(-\frac{3\pi}{4}\right) + i \sin\left(-\frac{3\pi}{4}\right) \right)$$

c) $z = 2i$

$$\Rightarrow r = |z| = \sqrt{(0)^2 + (2)^2} = 2$$

$$\operatorname{Arg}(z) = \frac{\pi}{2}$$

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta) = 2 \left(\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) \right)$$




أتدرب وأحل المسائل صفة 164


1	$\sqrt{-19} = \sqrt{-1 \times 19} = \sqrt{-1} \times \sqrt{19} = i\sqrt{19}$
2	$\sqrt{-\frac{12}{25}} = \sqrt{-1 \times \frac{12}{25}} = \sqrt{-1} \times \sqrt{\frac{12}{25}} = \frac{2\sqrt{3}}{5}i$
3	$\sqrt{-\frac{9}{32}} = \sqrt{-1 \times \frac{9}{32}} = \sqrt{-1} \times \sqrt{\frac{9}{32}} = \frac{3}{4\sqrt{2}}i$
4	$\sqrt{-53} = \sqrt{-1 \times 53} = \sqrt{-1} \times \sqrt{53} = i\sqrt{53}$
5	$i^{26} = (i^2)^{13} = -1$
6	$i^{39} = (i^2)^{19} \times i = (-1)^{19} \times i = -i$
7	$(i)(2i)(-7i) = (2i^2)(-7i) = (-2)(-7i) = 14i$
8	$\sqrt{-6} \times \sqrt{-6} = \sqrt{-1 \times 6} \times \sqrt{-1 \times 6}$ $= i\sqrt{6} \times i\sqrt{6}$ $= 6i^2 = -6$
9	$\sqrt{-4} \times \sqrt{-8} = \sqrt{-1 \times 4} \times \sqrt{-1 \times 8}$ $= 2i \times 2\sqrt{2}i$ $= 4\sqrt{2}i^2 = -4\sqrt{2}$
10	$2i \times \sqrt{-9} = 2i \times \sqrt{-1 \times 9}$ $= 2i \times 3i$ $= 6i^2 = -6$
11	$\frac{2 + \sqrt{-4}}{2} = \frac{2 + 2i}{2} = 1 + i$
12	$\frac{8 + \sqrt{-16}}{2} = \frac{8 + 4i}{2} = 4 + 2i$
13	$\frac{10 - \sqrt{-50}}{5} = \frac{10 - 5i\sqrt{2}}{5} = 2 - i\sqrt{2}$




14	$z = 2 + 15i$ $\Rightarrow Re(z) = 2, Im(z) = 15$
15	$z = 10i$ $\Rightarrow Re(z) = 0, Im(z) = 10$
16	$z = -16 - 2i$ $\Rightarrow Re(z) = -16, Im(z) = -2$




17	$z = -15 + 3i$, $\bar{z} = -15 - 3i$
----	---------------------------------------



18	$z = 8 - 7i$, $\bar{z} = 8 + 7i$
----	-----------------------------------




19	$z = 12 + 17i$, $\bar{z} = 12 - 17i$
----	---------------------------------------







20 $z = -3 - 25i$, $\bar{z} = -3 + 25i$



21 $z = 3i$, $\bar{z} = -3i$



22 $z = 15$, $\bar{z} = 15$



23 $z = -5 + 5i$

$\bar{z} = -5 - 5i$

$|z| = \sqrt{(-5)^2 + (5)^2} = 5\sqrt{2}$



24	$z = 3 + 3\sqrt{3}i$ $\bar{z} = 3 - 3\sqrt{3}i$ $ z = \sqrt{(3)^2 + (3\sqrt{3})^2} = \sqrt{9 + 27} = 6$
25	$z = 6 - 8i$ $\bar{z} = 6 + 8i$ $ z = \sqrt{(6)^2 + (-8)^2} = \sqrt{36 + 64} = 10$
26	$x^2 - 1 + i(2y - 5) = 8 + 9i \Rightarrow x^2 - 1 = 8 \quad \text{و} \quad 2y - 5 = 9$ $\Rightarrow x = \pm 3 \quad \text{و} \quad y = 7$
27	$2x + 3y + i(x - 2y) = 8 - 3i \Rightarrow 2x + 3y = 8 \quad \text{و} \quad x - 2y = -3$ $\Rightarrow x = 1 \quad \text{و} \quad y = 2$
28	$y - 3 + i(3x + 2) = 9 + i(y - 4) \Rightarrow y - 3 = 9 \quad \text{و} \quad 3x + 2 = y - 4$ $\Rightarrow y = 12 \quad \text{و} \quad x = 2$
29	$i(2x - 5y) + 3x + 5y = 7 + 3i \Rightarrow 2x - 5y = 3 \quad \text{و} \quad 3x + 5y = 7$ $\Rightarrow x = 2 \quad \text{و} \quad y = \frac{1}{5}$
30	$z = 1$ $Arg(z) = 0$
31	$z = 3i$ $Arg(z) = \frac{\pi}{2} \approx 1.57$
32	$z = -5 - 5i$ $Arg(z) = -\left(\pi - \tan^{-1}\left(\frac{5}{5}\right)\right) = -\frac{3\pi}{4} \approx -2.36$
33	$z = 1 - i\sqrt{3}$ $Arg(z) = -\tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{1}\right) = -\frac{\pi}{3} \approx -1.05$



34	$z = 6\sqrt{3} + 6i$ $Arg(z) = \tan^{-1}\left(\frac{6}{6\sqrt{3}}\right) = \frac{\pi}{6} \approx 0.52$
35	$z = 3 - 4i$ $Arg(z) = -\tan^{-1}\left(\frac{4}{3}\right) \approx -0.93$
36	$z = -12 + 5i$ $Arg(z) = \pi - \tan^{-1}\left(\frac{5}{12}\right) \approx 2.75$
37	$z = -58 - 93i$ $Arg(z) = -\left(\pi - \tan^{-1}\left(\frac{93}{58}\right)\right) \approx -2.13$
38	$z = -4 + 2i$ $Arg(z) = \pi - \tan^{-1}\left(\frac{2}{4}\right) \approx 2.68$
39	$r = z = 2$ $Arg(z) = \frac{\pi}{2}$ $z = r(\cos \theta + i \sin \theta) = 2 \left(\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) \right)$
40	$r = z = 3, Arg(z) = \frac{\pi}{3}$ $z = r(\cos \theta + i \sin \theta) = 3 \left(\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) \right)$
41	$r = z = 7, Arg(z) = \frac{5\pi}{6}$ $z = r(\cos \theta + i \sin \theta) = 7 \left(\cos\left(\frac{5\pi}{6}\right) + i \sin\left(\frac{5\pi}{6}\right) \right)$
42	$r = z = 1, Arg(z) = \frac{\pi}{4}$ $z = r(\cos \theta + i \sin \theta) = 1 \left(\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \right) = \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{4}\right)$
43	$z = 6$ $\Rightarrow r = z = \sqrt{(6)^2 + (0)^2} = 6$ $Arg(z) = 0$ $z = r(\cos \theta + i \sin \theta) = 6(\cos(0) + i \sin(0))$



$$z = 1 + i$$

$$\Rightarrow r = |z| = \sqrt{(1)^2 + (1)^2} = \sqrt{2}$$

$$44 \quad Arg(z) = \tan^{-1}\left(\frac{1}{1}\right) = \frac{\pi}{4}$$

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta) = \sqrt{2} \left(\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \right)$$

$$z_1 = 4\sqrt{3} - 4i \Rightarrow \bar{z}_1 = 4\sqrt{3} + 4i$$

$$Arg(z_2) = Arg(\bar{z}_1) = \tan^{-1}\left(\frac{4}{4\sqrt{3}}\right) = \frac{\pi}{6}$$

$$45 \quad z_2 = r(\cos \theta + i \sin \theta) = 40 \left(\cos\frac{\pi}{6} + i \sin\frac{\pi}{6} \right)$$

$$= 40 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i \right) = 20\sqrt{3} + 20i$$

$$\text{إذن، } z_2 = 20\sqrt{3} + 20i$$

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta) = 10\sqrt{2} \left(\cos\left(\frac{3\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{3\pi}{4}\right) \right)$$

$$= 10\sqrt{2} \left(-\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}}i \right) = -10 + 10i$$

$$\text{إذن، } z = -10 + 10i$$

بما أن z في الربع الثاني إذن \bar{z} في الربع الثالث



فيكون قياس الزاوية الصغرى بينهما هو $\frac{\pi}{2}$

$$47 \quad z = -8 + 8i$$

$$|z| = \sqrt{(-8)^2 + (8)^2} = 8\sqrt{2}$$

$$48 \quad Arg(z) = \pi - \tan^{-1}\left(\frac{8}{8}\right) = \frac{3\pi}{4}$$



50	$ \bar{z} = z = 8\sqrt{2}$		
51	$\bar{z} = -8 - 8i \rightarrow \operatorname{Arg}(\bar{z}) = -\left(\pi - \tan^{-1}\left(\frac{8}{8}\right)\right) = -\frac{3\pi}{4}$ $\operatorname{Arg}(\bar{z}) = -\operatorname{Arg}(z) = -\frac{3\pi}{4}$		أو نكتب مباشرةً: National Center for Curriculum Development
52	$\operatorname{Arg}(5 + 2i) = \alpha = \tan^{-1}\left(\frac{2}{5}\right)$ $\operatorname{Arg}(-5 - 2i) = -\left(\pi - \tan^{-1}\left(\frac{2}{5}\right)\right) = -(\pi - \alpha) = -\pi + \alpha$		
53	$\operatorname{Arg}(5 - 2i) = -\tan^{-1}\left(\frac{2}{5}\right) = -\alpha$		
54	$\operatorname{Arg}(-5 + 2i) = \pi - \tan^{-1}\left(\frac{2}{5}\right) = \pi - \alpha$		
55		يوضح الرسم المجاور العلاقة بين سعة كل من العددين $z = 2 + 5i$ و $z = 5 + 2i$ $\operatorname{Arg}(2 + 5i) = \tan^{-1}\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{\pi}{2} - \tan^{-1}\left(\frac{2}{5}\right) = \frac{\pi}{2} - \alpha$	
56	$\operatorname{Arg}(-2 + 5i) = \pi - \tan^{-1}\left(\frac{5}{2}\right) = \pi - \left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \frac{\pi}{2} + \alpha$		
57	$z = 5 + im$ ، $ z = 6$ ، $0 < \operatorname{Arg}(z) < \frac{\pi}{2}$ $ z = \sqrt{(5)^2 + (m)^2} = \sqrt{25 + m^2} = 6 \rightarrow 25 + m^2 = 36 \rightarrow m = \pm\sqrt{11}$ لكن $\frac{\pi}{2} < \operatorname{Arg}(z) < 0$ وهذا يعني أن z في الربع الأول، ومنه		
58	$z = 5 + 3ik$ ، $ z = 13$ $ z = \sqrt{(5)^2 + (3k)^2} = \sqrt{25 + 9k^2} = 13 \Rightarrow 25 + 9k^2 = 169 \Rightarrow k = \pm 4$		



$$|z_1| = r = 4\sqrt{5}, \quad \operatorname{Arg}(z_1) = \tan^{-1}(2) = \theta$$

نستنتج هنا أن z_1 يقع في الربع الأول، ففي الأرباع الأخرى تكون السعة بإشارة سالبة أو تحتوي (π)

59 $\tan \theta = 2 \Rightarrow \sin \theta = \frac{2}{\sqrt{5}}, \cos \theta = \frac{1}{\sqrt{5}}$


$$z_1 = r(\cos \theta + i \sin \theta) = 4\sqrt{5}(\cos \theta + i \sin \theta) = 4\sqrt{5}\left(\frac{1}{\sqrt{5}} + i \frac{2}{\sqrt{5}}\right) = 4 + 8i$$

$$z_1 = 4 + 8i, z_2 = 7 - 3i, z_3 = -5 + i$$

$$AC = \sqrt{(4 - (-5))^2 + (8 - 1)^2} = \sqrt{130}$$

$$AB = \sqrt{(4 - 7)^2 + (8 - (-3))^2} = \sqrt{130}$$

$$\begin{aligned} BC &= \sqrt{(7 - (-5))^2 + (-3 - 1)^2} \\ &= \sqrt{160} \end{aligned}$$



ومنه فإن المثلث **ABC** متطابق الضلعين، تأخذ **BC** قاعدة له ونجد إحداثي النقطة **D** نقطة منتصف القاعدة :

$$D\left(\frac{7 - 5}{2}, \frac{-3 + 1}{2}\right) \rightarrow D(1, -1)$$

ارتفاع هذا المثلث هو القطعة المستقيمة الواقعة بين الرأس ومنتصف القاعدة وهو

$$AD = \sqrt{(4 - 1)^2 + (8 - -1)^2} = \sqrt{90}$$

$$A = \frac{1}{2} \times \sqrt{160} \times \sqrt{90} = 60$$

لتكن مساحة المثلث **ABC** هي **A** فإن:

إذن، مساحة المثلث **ABC** تساوي 60 وحدة مربعة.



الدرس الثاني: العمليات على الأعداد المركبة

مسألة اليوم صفحة 167

$$A = -1 + 3i, \quad B = 3 + i$$

$$\begin{aligned} AB &= (-1 + 3i)(3 + i) \\ &= -3 - i + 9i - 3 = -6 + 8i \end{aligned}$$

$$|AB| = \sqrt{36 + 64} = 10$$

$$\text{Arg}(AB) = \pi - \tan^{-1}\left(\frac{8}{6}\right) \approx 2.21$$

أتحقق من فهمي صفحة 168

a $(7 + 8i) + (-9 + 14i) = -2 + 22i$

b $(11 + 9i) - (4 - 6i) = 7 + 15i$

أتحقق من فهمي صفحة 169

a $-3i(4 - 5i) = -12i + 15i^2 = -15 - 12i$

b $(5 + 4i)(7 - 4i) = 35 - 20i + 28i - 16i^2 = 35 + 8i + 16 = 51 + 8i$

c $(3 + 6i)^2 = 9 + 36i + 36i^2 = 9 + 36i - 36 = -27 + 36i$

أتحقق من فهمي صفحة 170

$$\begin{aligned} \frac{-4 + 3i}{1 + i} &= \frac{-4 + 3i}{1 + i} \times \frac{1 - i}{1 - i} \\ &= \frac{-4 + 4i + 3i - 3i^2}{1 - i^2} \\ &= \frac{-4 + 7i + 3}{1 + 1} \\ &= \frac{-1 + 7i}{2} = -\frac{1}{2} + \frac{7}{2}i \end{aligned}$$



	$\frac{2 - 6i}{-3i} = \frac{2 - 6i}{-3i} \times \frac{i}{i}$ $= \frac{2i - 6i^2}{-3i^2}$ $= \frac{2i + 6}{3} = 2 + \frac{2}{3}i$		
b	$\frac{7i}{4 - 4i} = \frac{7i}{4 - 4i} \times \frac{4 + 4i}{4 + 4i}$ $= \frac{28i + 28i^2}{16 - 16i^2}$ $= \frac{28i - 28}{16 + 16}$ $= \frac{28i - 28}{32} = -\frac{7}{8} + \frac{7}{8}i$		
c	تحقق من فهمي صفرحة 172		
a	$6 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right) \times 2 \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right)$ $= 6 \times 2 \left(\cos \left(\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{6} \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{6} \right) \right) = 12 \left(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2} \right)$		
b	$6 \left(\cos \left(-\frac{\pi}{3} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{3} \right) \right) \div 2 \left(\cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6} \right)$ $= \frac{6}{2} \left(\cos \left(-\frac{\pi}{3} - \frac{5\pi}{6} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{3} - \frac{5\pi}{6} \right) \right)$ $= 3 \left(\cos \left(-\frac{7\pi}{6} \right) + i \sin \left(-\frac{7\pi}{6} \right) \right)$ $= 3 \left(\cos \left(-\frac{7\pi}{6} + 2\pi \right) + i \sin \left(-\frac{7\pi}{6} + 2\pi \right) \right)$ $= 3 \left(\cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6} \right)$		



أتحقق من فهمي صفة 173

$$\begin{aligned}\sqrt{-5 - 12i} &= x + iy \Rightarrow -5 - 12i = x^2 + 2ixy + i^2y^2 \\ &\Rightarrow -5 - 12i = x^2 - y^2 + 2ixy \\ &\Rightarrow -5 = x^2 - y^2 \quad \text{و} \quad -12 = 2xy\end{aligned}$$

$$y = -\frac{6}{x}$$

a

$$\begin{aligned}x^2 - y^2 &= -5 \Rightarrow x^2 - \frac{36}{x^2} = -5 \\ &\Rightarrow x^4 + 5x^2 - 36 = 0 \\ &\Rightarrow (x^2 + 9)(x^2 - 4) = 0 \Rightarrow x = \pm 2\end{aligned}$$

عندما $x = 2$ ، فإن $y = -3$ ، وعندما $x = -2$ ، فإن $y = 3$

إذن الجذران التربيعيان للعدد المركب $-5 - 12i$ هما: $2 - 3i$ ، $-2 + 3i$

$$\sqrt{-9i} = x + iy \Rightarrow -9i = x^2 + 2ixy + i^2y^2$$

$$\begin{aligned}&\Rightarrow -9i = x^2 - y^2 + 2ixy \\ &\Rightarrow 0 = x^2 - y^2 \quad \text{و} \quad -9 = 2xy\end{aligned}$$

$$y = -\frac{9}{2x}$$

b

$$\begin{aligned}x^2 - y^2 &= 0 \Rightarrow x^2 - \frac{81}{4x^2} = 0 \\ &\Rightarrow 4x^4 - 81 = 0\end{aligned}$$

$$\Rightarrow (2x^2 + 9)(2x^2 - 9) = 0 \Rightarrow x = \pm \frac{3}{\sqrt{2}}$$

عندما $x = \frac{3}{\sqrt{2}}$ ، فإن $y = -\frac{3}{\sqrt{2}}$ ، وعندما $x = -\frac{3}{\sqrt{2}}$ ، فإن $y = \frac{3}{\sqrt{2}}$

إذن الجذران التربيعيان للعدد المركب $-9i$ هما: $\frac{3}{\sqrt{2}} - \frac{3}{\sqrt{2}}i$ ، $-\frac{3}{\sqrt{2}} + \frac{3}{\sqrt{2}}i$



$$\begin{aligned} \sqrt{-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i} &= x + iy \Rightarrow -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i = x^2 + 2ixy + i^2y^2 \\ &\Rightarrow -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i = x^2 - y^2 + 2ixy \\ &\Rightarrow -\frac{1}{2} = x^2 - y^2 \quad \text{و} \quad \frac{\sqrt{3}}{2} = 2xy \end{aligned}$$

c) $y = \frac{\sqrt{3}}{4x}$

$$\begin{aligned} x^2 - y^2 &= -\frac{1}{2} \Rightarrow x^2 - \frac{3}{16x^2} = -\frac{1}{2} \\ &\Rightarrow 16x^4 + 8x^2 - 3 = 0 \\ &\Rightarrow (4x^2 - 1)(4x^2 + 3) = 0 \Rightarrow x = \pm \frac{1}{2} \end{aligned}$$

عندما $x = \frac{1}{2}$ ، فإن $y = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ ، $x = -\frac{1}{2}$ ، فإن $y = \frac{\sqrt{3}}{2}$

إذن، الجذران التربيعيان للعدد المركب i هما: $\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$ ، $-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$ ، $-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$

أتحقق من فهمي لمثال 6 صفحة 177

$z^3 - z^2 - 7z + 15 = 0$

عوامل الحد الثابت هي: $\pm 1, \pm 3, \pm 5, \pm 15$

بالتعويض، نجد أن العدد -3 يحقق المعادلة لأن: $0 = (-3)^3 - (-3)^2 - 7(-3) + 15$

إذن $(z + 3)$ هو أحد عوامل كثير الحدود، نجري عملية القسمة فنجد أن:

$$z^3 - z^2 - 7z + 15 = (z + 3)(z^2 - 4z + 5) = 0$$

$$z = -3, z = \frac{4 \pm \sqrt{16 - 20}}{2} = 2 \pm i$$

إذن لهذه المعادلة 3 جذور هي: $-3, 2 + i, 2 - i$



أتحقق من فهمي لمثال 7 صفحة 177

$$x = 2 \pm i$$

$$x - 2 = \pm i$$

$$(x - 2)^2 = -1$$

$$x^2 - 4x + 4 = -1$$

$$x^2 - 4x + 5 = 0$$

بمقارنة هذه المعادلة مع المعادلة المعطاة ($x^2 + ax + b = 0$) نجد أن:

أتدرب وأحل المسائل صفحة 177

$$1 \quad (7 + 2i) + (3 - 11i) = 10 - 9i$$

$$2 \quad (5 - 9i) - (-4 + 7i) = 9 - 16i$$

$$3 \quad (4 - 3i)(1 + 3i) = 4 + 12i - 3i + 9 = 13 + 9i$$

$$\begin{aligned} 4 \quad (4 - 6i)(1 - 2i)(2 - 3i) &= (4 - 6i)(2 - 3i - 4i - 6) \\ &= (4 - 6i)(-4 - 7i) \\ &= -16 - 28i + 24i - 42 \\ &= -58 - 4i \end{aligned}$$

$$5 \quad (9 - 2i)^2 = 81 - 36i - 4 = 77 - 36i$$

$$\begin{aligned} 6 \quad \frac{10}{3 - i} &= \frac{10}{3 - i} \times \frac{3 + i}{3 + i} \\ &= \frac{30 + 10i}{9 + 1} \\ &= \frac{30 + 10i}{10} \\ &= 3 + i \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 7 \quad 6(\cos \pi + i \sin \pi) \times 2 \left(\cos \left(-\frac{\pi}{4} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{4} \right) \right) \\ = 12 \left(\cos \left(\pi - \frac{\pi}{4} \right) + i \sin \left(\pi - \frac{\pi}{4} \right) \right) = 12 \left(\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4} \right) \end{aligned}$$



	$\left(\cos\left(\frac{3\pi}{10}\right) + i \sin\left(\frac{3\pi}{10}\right) \right) \div \left(\cos\frac{2\pi}{5} + i \sin\frac{2\pi}{5} \right)$
8	$= \cos\left(\frac{3\pi}{10} - \frac{2\pi}{5}\right) + i \sin\left(\frac{3\pi}{10} - \frac{2\pi}{5}\right)$ $= \cos\left(-\frac{\pi}{10}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{10}\right)$
	$12 \left(\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \right) \div 4 \left(\cos\frac{\pi}{3} + i \sin\frac{\pi}{3} \right)$
9	$= \frac{12}{4} \left(\cos\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{3}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{3}\right) \right)$ $= 3 \left(\cos\left(-\frac{\pi}{12}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{12}\right) \right)$
	$11 \left(\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) \right) \times 2 \left(\cos\left(\frac{3\pi}{2}\right) + i \sin\left(\frac{3\pi}{2}\right) \right)$ $= 22 \left(\cos\left(-\frac{\pi}{6} + \frac{3\pi}{2}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{6} + \frac{3\pi}{2}\right) \right)$ $= 22 \left(\cos\left(\frac{4\pi}{3}\right) + i \sin\left(\frac{4\pi}{3}\right) \right)$ $= 22 \left(\cos\left(\frac{4\pi}{3} - 2\pi\right) + i \sin\left(\frac{4\pi}{3} - 2\pi\right) \right)$ $= 22 \left(\cos\left(-\frac{2\pi}{3}\right) + i \sin\left(-\frac{2\pi}{3}\right) \right)$
	$(a + 6i) + (7 - bi) = -2 + 5i$
11	$a + 7 + (6 - b)i = -2 + 5i \Rightarrow a + 7 = -2 \text{ و } 6 - b = 5$ $\Rightarrow a = -9, b = 1$
	$(11 - ia) - (b - 9i) = 7 - 6i$
12	$11 - b + (9 - a)i = 7 - 6i \Rightarrow 11 - b = 7 \text{ و } 9 - a = -6$ $\Rightarrow b = 4, a = 15$



$$(a + ib)(2 - i) = 5 + 5i$$

$$2a + b + (2b - a)i = 5 + 5i \Rightarrow 2a + b = 5 \quad \text{و} \quad 2b - a = 5 \\ \Rightarrow b = 3, a = 1$$

$$a + ib = \frac{5 + 5i}{2 - i}$$

$$= \frac{5 + 5i}{2 - i} \times \frac{2 + i}{2 + i}$$

$$= \frac{10 + 5i + 10i - 5}{4 + 1}$$

$$= \frac{5 + 15i}{5}$$

$$= 1 + 3i$$

$$\Rightarrow a = 1, b = 3$$

طريقة ثانية للحل:

$$\frac{a - 6i}{1 - 2i} = b + 4i \Rightarrow \frac{a - 6i}{1 - 2i} \times \frac{1 + 2i}{1 + 2i} = b + 4i$$

$$\Rightarrow \frac{a + 2ai - 6i + 12}{1 + 4} = b + 4i$$

$$\Rightarrow \frac{a + 12}{5} + \frac{2a - 6}{5}i = b + 4i$$

$$\Rightarrow \frac{a + 12}{5} = b, \quad \frac{2a - 6}{5} = 4 \Rightarrow a = 13$$

بتعويض قيمة a في المعادلة الأولى ينتج أن: $b = 5$

طريقة ثانية للحل:

$$a - 6i = (b + 4i)(1 - 2i) \Rightarrow a - 6i = b + 8 + (-2b + 4)i$$

$$\Rightarrow a = b + 8, \quad -6 = -2b + 4$$

$$\Rightarrow b = 5, a = 13$$



$$\begin{aligned} z &= 8 \left(\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) - i \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \right) = 8 \left(\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{4}\right) \right) \\ \Rightarrow \bar{z} &= 8 \left(\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \right) \\ \Rightarrow z\bar{z} &= 8 \left(\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) - i \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \right) \times 8 \left(\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \right) \\ &= 64 \left(\cos^2\left(\frac{\pi}{4}\right) + \sin^2\left(\frac{\pi}{4}\right) \right) = 64 \end{aligned}$$

الحل الثاني: نكتب كلا من العددين بالصورة المثلثية أو لا ثم نطبق القاعدة:

$$\begin{aligned} z &= 8 \left(\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) - i \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \right) = 8 \left(\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{4}\right) \right) \\ 15 \quad \Rightarrow \bar{z} &= 8 \left(\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \right) \\ \Rightarrow z\bar{z} &= 64 \left(\cos\left(-\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4}\right) \right) = 64 \end{aligned}$$

الحل الثالث: كتابة العددين بالصورة القياسية أو لا ثم إجراء عملية الضرب:

$$\begin{aligned} z &= 8 \left(\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) - i \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \right) = 8 \left(\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}}i \right) = 4\sqrt{2} - 4\sqrt{2}i \\ \Rightarrow \bar{z} &= 4\sqrt{2} + 4\sqrt{2}i \\ \Rightarrow z\bar{z} &= (4\sqrt{2} - 4\sqrt{2}i)(4\sqrt{2} + 4\sqrt{2}i) = 32 + 32 = 64 \end{aligned}$$

الحل الرابع: نعلم أن حاصل ضرب أي عدد مركب بمرافقه يساوي مربع مقياسه،
وبما أن $|z| = 8$ ، فيكون: $|z\bar{z}| = 64$

$$\begin{aligned} \sqrt{3 - 4i} &= x + iy \Rightarrow 3 - 4i = x^2 + 2ixy + i^2y^2 \\ &\Rightarrow 3 - 4i = x^2 - y^2 + 2ixy \\ &\Rightarrow 3 = x^2 - y^2 \quad \text{و} \quad -4 = 2xy \end{aligned}$$

$$y = -\frac{2}{x}$$

$$\begin{aligned} 16 \quad x^2 - y^2 &= 3 \Rightarrow x^2 - \frac{4}{x^2} = 3 \\ &\Rightarrow x^4 - 3x^2 - 4 = 0 \\ &\Rightarrow (x^2 + 1)(x^2 - 4) = 0 \Rightarrow x = \pm 2 \end{aligned}$$

عندما $x = 2$ ، فإن $y = -1$ ، وعندما $x = -2$ ، فإن $y = 1$

إذن الجذران التربيعيان للعدد المركب $3 - 4i$ هما: $2 - i$ ، $-2 + i$



$$\begin{aligned}\sqrt{-15 + 8i} &= x + iy \Rightarrow -15 + 8i = x^2 + 2ixy + i^2y^2 \\ &\Rightarrow -15 + 8i = x^2 - y^2 + 2ixy \\ &\Rightarrow -15 = x^2 - y^2 \quad \text{و} \quad 8 = 2xy\end{aligned}$$

$$y = \frac{4}{x}$$

$$17 \quad x^2 - y^2 = -15 \Rightarrow x^2 - \frac{16}{x^2} = -15$$

$$\begin{aligned}&\Rightarrow x^4 + 15x^2 - 16 = 0 \\ &\Rightarrow (x^2 + 16)(x^2 - 1) = 0 \Rightarrow x = \pm 1\end{aligned}$$

عندما $x = 1$ ، فإن $y = 4$ ، $y = -4$ ، $x = -1$ ، $x = 1$.
إذن الجذران التربيعيان للعدد المركب $-15 + 8i$ هما:

$$1 + 4i, -1 - 4i$$

$$\begin{aligned}\sqrt{5 - 12i} &= x + iy \Rightarrow 5 - 12i = x^2 + 2ixy + i^2y^2 \\ &\Rightarrow 5 - 12i = x^2 - y^2 + 2ixy \\ &\Rightarrow 5 = x^2 - y^2 \quad \text{و} \quad -12 = 2xy\end{aligned}$$

$$y = -\frac{6}{x}$$

$$18 \quad x^2 - y^2 = 5 \Rightarrow x^2 - \frac{36}{x^2} = 5$$

$$\begin{aligned}&\Rightarrow x^4 - 5x^2 - 36 = 0 \\ &\Rightarrow (x^2 + 4)(x^2 - 9) = 0 \Rightarrow x = \pm 3\end{aligned}$$

عندما $x = 3$ ، فإن $y = -2$ ، $y = 2$ ، $x = -3$ ، $x = 3$.
إذن الجذران التربيعيان للعدد المركب $5 - 12i$ هما:

$$3 - 2i, -3 + 2i$$



$$\begin{aligned}\sqrt{-7 - 24i} &= x + iy \Rightarrow -7 - 24i = x^2 + 2ixy + i^2y^2 \\ &\Rightarrow -7 - 24i = x^2 - y^2 + 2ixy \\ &\Rightarrow -7 = x^2 - y^2 \quad \text{و} \quad -24 = 2xy\end{aligned}$$

$$y = -\frac{12}{x}$$

$$19 \quad x^2 - y^2 = -7 \Rightarrow x^2 - \frac{144}{x^2} = -7$$

$$\begin{aligned}&\Rightarrow x^4 + 7x^2 - 144 = 0 \\ &\Rightarrow (x^2 + 16)(x^2 - 9) = 0 \Rightarrow x = \pm 3\end{aligned}$$

عندما $x = 3$ ، فإن $y = 4$ ، $x = -3$ ، $y = -4$ ، $x = 3$ ، $y = 4$ ، $x = -3$ ، $y = -4$ ، فإن الجذريان التربيعيان للعدد المركب $3 - 4i$ ، $-3 + 4i$ هما:

$3 - 4i$ ، $-3 + 4i$ ، $7 - 24i$

$$z = 2 \left(\cos \frac{\pi}{4} - i \sin \frac{\pi}{4} \right) = 2 \left(\cos \left(\frac{-\pi}{4} \right) + i \sin \left(\frac{-\pi}{4} \right) \right), w = 2 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right)$$

$$zw = 4 \left(\cos \left(\frac{-\pi}{4} + \frac{\pi}{3} \right) + i \sin \left(\frac{-\pi}{4} + \frac{\pi}{3} \right) \right) = 4 \left(\cos \frac{\pi}{12} + i \sin \frac{\pi}{12} \right)$$

$$21 \quad \frac{z}{w} = 1 \left(\cos \left(\frac{-\pi}{4} - \frac{\pi}{3} \right) + i \sin \left(\frac{-\pi}{4} - \frac{\pi}{3} \right) \right) = \cos \left(\frac{-7\pi}{12} \right) + i \sin \left(\frac{-7\pi}{12} \right)$$

$$22 \quad \frac{w}{z} = 1 \left(\cos \left(\frac{\pi}{3} - \frac{-\pi}{4} \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{3} - \frac{-\pi}{4} \right) \right) = \cos \frac{7\pi}{12} + i \sin \frac{7\pi}{12}$$

$$1 = 1(\cos 0 + i \sin 0)$$

$$23 \quad \frac{1}{z} = \frac{1}{2} \left(\cos \left(0 - \frac{-\pi}{4} \right) + i \sin \left(0 - \frac{-\pi}{4} \right) \right) = \frac{1}{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)$$

$$24 \quad w^2 = ww = 4 \left(\cos \left(\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{3} \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{3} \right) \right) = 4 \left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} \right)$$



25

$$5i = 5 \left(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2} \right)$$

$$5iz = 5 \left(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2} \right) \times 2 \left(\cos \left(-\frac{\pi}{4} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{4} \right) \right)$$

$$= 10 \left(\cos \left(\frac{\pi}{2} + \frac{-\pi}{4} \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{2} + \frac{-\pi}{4} \right) \right)$$

$$= 10 \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)$$

26

$$z^2 + 104 = 20z \Rightarrow z^2 - 20z + 104 = 0$$

$$z = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{20 \pm \sqrt{400 - 416}}{2} = \frac{20 \pm \sqrt{-16}}{2}$$

$$z = \frac{20 \pm 4i}{2} = 10 \pm 2i$$

إذن، لهذه المعادلة جذران هما: $10 + 2i$ ، و $10 - 2i$

$$z^2 + 18z + 202 = 0$$

$$z = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$= \frac{-18 \pm \sqrt{324 - 808}}{2}$$

$$= \frac{-18 \pm \sqrt{-484}}{2}$$

$$= \frac{-18 \pm 22i}{2} = -9 \pm 11i$$

إذن، لهذه المعادلة جذران هما: $-9 + 11i$ ، و $-9 - 11i$

27

$$9z^2 + 68 = 0 \Rightarrow z^2 = -\frac{68}{9} \Rightarrow z = \pm \sqrt{-\frac{68}{9}} = \pm i \frac{\sqrt{68}}{3}$$

$$-i \frac{\sqrt{68}}{3}, \text{ و } i \frac{\sqrt{68}}{3}$$

28



$$3z^3 - 2z^2 + 2z + 1 = 0$$

الأصفار النسبية المحتملة هي: $\pm 1, \pm \frac{1}{3}$

بالتعميض، نجد أن العدد $\frac{1}{3} - z$ يحقق المعادلة لأن:

$$3\left(-\frac{1}{3}\right)^3 - 2\left(-\frac{1}{3}\right)^2 + 2\left(-\frac{1}{3}\right) + 1 = 0$$

29 $z = -\frac{1}{3} \Rightarrow 3z = -1 \Rightarrow 3z + 1 = 0$

إذن $(1 + 3z)$ هو أحد عوامل كثير الحدود، نجري عملية القسمة فنجد أن:

$$3z^3 - 2z^2 + 2z + 1 = (3z + 1)(z^2 - z + 1) = 0$$

$$\Rightarrow z = -\frac{1}{3}, z = \frac{1 \pm \sqrt{1-4}}{2} = \frac{1 \pm i\sqrt{3}}{2} = \frac{1}{2} \pm i\frac{\sqrt{3}}{2}$$

إذن لهذه المعادلة 3 حلول (جذور) هي: $-\frac{1}{3}, \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$

$$z^3 + 4z + 10 = 5z^2 \Rightarrow z^3 - 5z^2 + 4z + 10 = 0$$

الأصفار النسبية المحتملة هي: $\pm 1, \pm 2, \pm 5, \pm 10$

بالتعميض، نجد أن العدد $-1 - z$ يحقق المعادلة لأن:

$$(-1)^3 - 5(-1)^2 + 4(-1) + 10 = 0$$

إذن $(z + 1)$ هو أحد عوامل كثير الحدود، نجري عملية القسمة فنجد أن:

$$z^3 - 5z^2 + 4z + 10 = (z + 1)(z^2 - 6z + 10) = 0$$

$$\Rightarrow z = -1, z = \frac{6 \pm \sqrt{36-40}}{2} = \frac{6 \pm 2i}{2} = 3 \pm i$$

إذن لهذه المعادلة 3 حلول (جذور) هي: $-1, 3 + i, 3 - i$



$$2z^3 = 8z^2 + 13z - 87 \Rightarrow 2z^3 - 8z^2 - 13z + 87 = 0$$

الأصفار النسبية المحتملة هي: $\pm 1, \pm \frac{1}{2}, \pm \frac{3}{2}, \pm 3, \pm 29, \pm \frac{29}{2}, \pm \frac{87}{2}$
بالتعويض، نجد أن العدد $-3 = z$ يحقق المعادلة لأن:

$$2(-3)^3 - 8(-3)^2 - 13(-3) + 87 = 0$$

إذن $(z + 3)$ هو أحد عوامل كثير الحدود، نجري عملية القسمة فنجد أن:

$$31 \quad 2z^3 - 8z^2 - 13z + 87 = (z + 3)(2z^2 - 14z + 29) = 0$$

$$\Rightarrow z = -3, z = \frac{14 \pm \sqrt{196 - 232}}{4}$$

$$\Rightarrow z = -3, z = \frac{14 \pm \sqrt{-36}}{4} = \frac{14 \pm 6i}{4} = \frac{7}{2} \pm \frac{3}{2}i$$

إذن لهذه المعادلة 3 حلول (جذور) هي: $-3, \frac{7}{2} + \frac{3}{2}i, \frac{7}{2} - \frac{3}{2}i$

$$x = 2 \pm 5i$$

$$x - 2 = \pm 5i$$

$$(x - 2)^2 = -25$$

$$x^2 - 4x + 4 = -25$$

$$x^2 - 4x + 29 = 0$$

32

طريقة أخرى للحل:

نعلم أنه إذا كان h و k هما جذرا المعادلة التربيعية $x^2 - bx + c = 0$

$$c = hk, b = h + k$$

مجموع الجذرين يساوي: 4، وناتج ضربهما يساوي: 29

$$x^2 - 4x + 29 = 0$$



$$x = 7 \pm 4i$$

$$x - 7 = \pm 4i$$

$$(x - 7)^2 = -16$$

$$x^2 - 14x + 49 = -16$$

$$x^2 - 14x + 65 = 0$$

33

طريقة أخرى للحل:

مجموع الجذرين يساوي: 14، وناتج ضربهما يساوي: $49 + 16 = 65$

إذن، المعادلة هي: $x^2 - 14x + 65 = 0$

$$x = -8 \pm 20i$$

$$x + 8 = \pm 20i$$

$$(x + 8)^2 = -400$$

$$x^2 + 16x + 64 = -400$$

$$x^2 + 16x + 464 = 0$$

34

طريقة أخرى للحل:

مجموع الجذرين يساوي: 16، وناتج ضربهما يساوي: $64 + 400 = 464$

إذن، المعادلة هي: $x^2 + 16x + 464 = 0$

$$x = -3 \pm 2i$$

$$x + 3 = \pm 2i$$

$$(x + 3)^2 = -4$$

$$x^2 + 6x + 9 = -4$$

35

$$x^2 + 6x + 13 = 0$$

طريقة أخرى للحل:

مجموع الجذرين يساوي: 6، وناتج ضربهما يساوي: $9 + 4 = 13$

إذن، المعادلة هي: $x^2 + 6x + 13 = 0$



$$z_1 = 2\sqrt{3} - 2i , \quad z_2 = \sqrt{5} - i\sqrt{15} , \quad z_3 = 2 - 2i$$

$$|z_1| = \sqrt{12 + 4} = 4$$

$$|z_2| = \sqrt{5 + 15} = 2\sqrt{5}$$

$$|z_3| = \sqrt{4 + 4} = 2\sqrt{2}$$

$$\operatorname{Arg}(z_1) = -\tan^{-1}\left(\frac{2}{2\sqrt{3}}\right) = -\tan^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = -\frac{\pi}{6}$$

$$36 \quad \operatorname{Arg}(z_2) = -\tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{15}}{\sqrt{5}}\right) = -\tan^{-1}(\sqrt{3}) = -\frac{\pi}{3}$$

$$\operatorname{Arg}(z_3) = -\tan^{-1}\left(\frac{2}{2}\right) = -\tan^{-1}(1) = -\frac{\pi}{4}$$

$$\left|\frac{z_2}{z_1}\right| = \frac{|z_2|}{|z_1|} = \frac{2\sqrt{5}}{4} = \frac{\sqrt{5}}{2}$$

$$\operatorname{Arg}\left(\frac{z_2}{z_1}\right) = \operatorname{Arg}(z_2) - \operatorname{Arg}(z_1) = -\frac{\pi}{3} - \left(-\frac{\pi}{6}\right) = -\frac{\pi}{6}$$

$$37 \quad \left|\frac{1}{z_3}\right| = \frac{|1|}{|z_3|} = \frac{1}{2\sqrt{2}}$$

$$\operatorname{Arg}\left(\frac{1}{z_3}\right) = \operatorname{Arg}(1) - \operatorname{Arg}(z_3) = 0 - \left(-\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\pi}{4}$$

$$38 \quad \bar{z}_2 = \sqrt{5} + i\sqrt{15} \rightarrow |\bar{z}_2| = |z_2| = 2\sqrt{5} , \operatorname{Arg}(\bar{z}_2) = -\operatorname{Arg}(z_2) = \frac{\pi}{3}$$

$$\left|\frac{z_3}{\bar{z}_2}\right| = \frac{|z_3|}{|\bar{z}_2|} = \frac{2\sqrt{2}}{2\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{5}}$$


$$\operatorname{Arg}\left(\frac{z_3}{\bar{z}_2}\right) = \operatorname{Arg}(z_3) - \operatorname{Arg}(\bar{z}_2) = -\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{3} = -\frac{7\pi}{12}$$



$$z = 8 \left(\cos \frac{2\pi}{3} - i \sin \frac{2\pi}{3} \right) = 8 \left(\cos \left(-\frac{2\pi}{3} \right) + i \sin \left(-\frac{2\pi}{3} \right) \right)$$

إذن مقاييس z يساوي 8 وسعته $-\frac{2\pi}{3}$

39



$$z = 8 \left(\cos \frac{2\pi}{3} - i \sin \frac{2\pi}{3} \right) = 8 \left(-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} i \right) = -4 - 4\sqrt{3}i$$

$$\begin{aligned} \sqrt{-4 - 4\sqrt{3}i} &= x + iy \Rightarrow -4 - 4\sqrt{3}i = x^2 + 2ixy + i^2 y^2 \\ &\Rightarrow -4 - 4\sqrt{3}i = x^2 - y^2 + 2ixy \\ &\Rightarrow -4 = x^2 - y^2 \quad \text{و} \quad -4\sqrt{3} = 2xy \end{aligned}$$

40

$$y = -\frac{2\sqrt{3}}{x}$$

$$x^2 - y^2 = -4 \Rightarrow x^2 - \frac{12}{x^2} = -4$$

$$\Rightarrow x^4 + 4x^2 - 12 = 0$$

$$\Rightarrow (x^2 + 6)(x^2 - 2) = 0 \Rightarrow x = \pm\sqrt{2}$$

عندما $x = \sqrt{2}$ ، فإن $y = -\sqrt{6}$ ، وعندما $x = -\sqrt{2}$ ، فإن $y = \sqrt{6}$

إذن الجذران التربيعيان للعدد المركب z هما: $\sqrt{2} - i\sqrt{6}$ ، $-\sqrt{2} + i\sqrt{6}$



41

بما أن $a - 3i$ هو جذر للعدد المركب $55 - 48i$, إذن:

$$(a - 3i)^2 = 55 - 48i \Rightarrow a^2 - 6ia - 9 = 55 - 48i$$

$$\Rightarrow a^2 - 9 = 55, -6a = -48 \Rightarrow a = 8$$

و بما أن $b + ic$ هو جذر للعدد المركب $55 - 48i$, إذن:

$$(b + ic)^2 = 55 - 48i \Rightarrow b^2 + 2ibc - c^2 = 55 - 48i$$

$$\Rightarrow b^2 - c^2 = 55, 2bc = -48$$

$$\Rightarrow c = -\frac{24}{b} \Rightarrow b^2 - \frac{576}{b^2} = 55$$

$$\Rightarrow b^4 - 55b^2 - 576 = 0$$

$$\Rightarrow (b^2 - 64)(b^2 + 9) = 0 \Rightarrow b = \pm 8$$

عندما $b = 8$, فإن $c = -3$, $b = -8$, $c = 3$, وعندما $b = -8$, $c = 3$

جذراً هذا العدد المركب هما $8 - 3i$ و $-8 + 3i$

ويمقارنة هذين الجذرين مع الجذرين المعطيين $(a - 3i, b + ic)$ نلاحظ أن: $a = 8, b = -8, c = 3$

الحل الأسهل هو:

بما أن $a - 3i$ جذر للعدد المركب $55 - 48i$ إذن $a + 3i$ هو أيضًا جذر له، ومنه:

بالمقارنة مع الجذرين i و $a - 3i$ و $b + ic$ نجد أن: $c = 3$ و $b = -a$ و منه:

$$(a - 3i)^2 = 55 - 48i \Rightarrow a^2 - 6ia - 9 = 55 - 48i$$

$$\Rightarrow a^2 - 9 = 55, -6a = -48 \Rightarrow a = 8 \Rightarrow b = -8$$

42

$$x^3 + x^2 + 15x = 225 \Rightarrow x^3 + x^2 + 15x - 225 = 0$$

بما أن 5 جذر لهذه المعادلة، إذن $(x - 5)$ أحد عوامل كثير الحدود، بالقسمة عليه نحصل على:

$$x^3 + x^2 + 15x - 225 = (x - 5)(x^2 + 6x + 45) = 0$$

$$x = 5, x = \frac{-6 \pm \sqrt{36 - 180}}{2} = \frac{-6 \pm \sqrt{-144}}{2} = \frac{-6 \pm 12i}{2} = -3 \pm 6i$$

طول هذه المعادلة هي: $x = 5, x = -3 + 6i, x = -3 - 6i$

43

$$x^3 + 7x^2 - 13x + 45 = 0$$

بما أن 9- جذر لهذه المعادلة، إذن $(x + 9)$ أحد عوامل كثير الحدود، بالقسمة عليه نحصل على:

$$x^3 + 7x^2 - 13x + 45 = (x + 9)(x^2 - 2x + 5) = 0$$

$$x = -9, x = \frac{2 \pm \sqrt{4 - 20}}{2} = \frac{2 \pm \sqrt{-16}}{2} = \frac{2 \pm 4i}{2} = 1 \pm 2i$$

طول هذه المعادلة هي: $x = -9, x = 1 + 2i, x = 1 - 2i$



$$3x(x^2 + 45) = 2(19x^2 + 37) \Rightarrow 3x^3 - 38x^2 - 135x - 74 = 0$$

بما أن $(i - 6)$ جذر لهذه المعادلة، إذن مرفاقه $(i + 6)$ هو أيضًا جذر لهذه المعادلة،

نكون المعادلة التربيعية التي جذراها $(i - 6)$ ، $(i + 6)$

$$x = 6 \pm i$$

$$x - 6 = \pm i$$

$$(x - 6)^2 = -1$$

44 $x^2 - 12x + 36 = -1$

$$x^2 - 12x + 37 = 0$$

ثم نقسم كثير الحدود $x^2 - 12x + 37$ على $x^2 - 12x + 36$ فنجد أن:

$$3x^3 - 38x^2 - 135x - 74 = (x^2 - 12x + 37)(3x - 2) = 0$$

$$\Rightarrow x = \frac{2}{3}, x = 6 \pm i$$

حلول هذه المعادلة هي: $x = \frac{2}{3}, x = 6 + i, x = 6 - i$

$$x^3 + 10x^2 + 29x + 30 = 0$$

بما أن $(-2 + i)$ جذر لهذه المعادلة، إذن مرفاقه $(-2 - i)$ هو أيضًا جذر لهذه المعادلة،

نكون المعادلة التربيعية التي جذراها $(-2 + i)$ ، $(-2 - i)$

$$x = -2 \pm i$$

$$x + 2 = \pm i$$

$$(x + 2)^2 = -1$$

45 $x^2 + 4x + 4 = -1$

$$x^2 + 4x + 5 = 0$$

ثم نقسم كثير الحدود $x^2 + 4x + 5$ على $x^3 + 10x^2 + 29x + 30$ فنجد أن:

$$x^3 + 10x^2 + 29x + 30 = (x^2 + 4x + 5)(x + 6) = 0$$

$$\Rightarrow x = -6, x = -2 \pm i$$

حلول هذه المعادلة هي: $x = -6, x = -2 + i, x = -2 - i$

46

الجذر الآخر هو مرفاق الجذر الأول، أي $11i - 4$



47	$k = (4 - 11i)(4 + 11i) = 16 - 121i^2 = 16 + 121 = 137$
48	$(p + iq)^2 = p^2 + 2ipq + i^2q^2 = p^2 + 2ipq - q^2$
49	$(p + iq)^2 = 45 + im = p^2 - q^2 + 2ipq$ $\Rightarrow p^2 - q^2 = 45, \quad m = 2pq$ $\Rightarrow p^2 - q^2 = 45 \Rightarrow (p + q)(p - q) = 45$ <p>بما أن p و q عددان صحيحان موجبان و $q > p$ فإن $(p + q)$ و $(p - q)$ عددان صحيحان موجبان</p> <p>أيضاً $(p + q) > (p - q)$ ومنه يكفي تحليل العدد 45 إلى عاملين صحيحين موجبين أحدهما أكبر من الآخر، لدينا ثلاثة حالات لتحليل 45 إلى عاملين صحيحين موجبين هي:</p> <p>الحالة الأولى: 1×45 فإن: $p - q = 1$ و $p + q = 45 = 45 \times 1$</p> <p>ومنه: $p = 23$ و $q = 22$ أي أن: $m = 2pq = 1012$</p> <p>الحالة الثانية: 3×15 فإن: $p - q = 3$ و $p + q = 15$</p> <p>ومنه: $p = 9$ و $q = 6$ أي أن: $m = 2pq = 108$</p> <p>الحالة الثالثة: 5×9 فإن: $p - q = 5$ و $p + q = 9$</p> <p>ومنه: $p = 7$ و $q = 2$ أي أن: $m = 2pq = 28$</p> <p>قيمة m المطلوبة هي: 28, 108, 1012</p>
50	$(9 - 6i)^2 = 45 - 108i$ $(9 + 6i)^2 = 45 + 108i$ <p>ومنه فإن جذري العدد المركب $9 - 6i$, $-9 + 6i$ هما: $(9 - 6i)^2 = 45 - 108i$</p>
51	<p>ليكن $\bar{z} = x - iy$, $z = x + iy$</p> $z\bar{z} = (x + iy)(x - iy) = x^2 - y^2i^2 = x^2 + y^2 = (\sqrt{x^2 + y^2})^2 = z ^2$



$$|z| = 5\sqrt{5}, \operatorname{Arg}(z) = \tan^{-1}\left(\frac{1}{2}\right), \frac{z}{3+4i} = p + iq$$

لتكن $z = x + iy$

$$\begin{aligned} x &= 2y, \text{ إذن يقع العدد المركب } z \text{ في الربع الأول، ويكون } \\ &\Rightarrow z = 2y + iy \end{aligned}$$

$$|z| = 5\sqrt{5}$$

52

$$(2y)^2 + y^2 = 125 \Rightarrow y^2 = 25 \Rightarrow y = 5, x = 10$$

إذن، $z = 10 + 5i$

$$\frac{z}{3+4i} = \frac{10+5i}{3+4i} = \frac{10+5i}{3+4i} \times \frac{3-4i}{3-4i}$$

$$p + iq = \frac{30 - 40i + 15i + 20}{9 + 16} = \frac{50 - 25i}{25} = 2 - i$$

إذن، $p = 2, q = -1$ و يكون، $p + q = 1$:



$$z^3 - 20z^2 + 164z - 400 = 0$$

بما أن $(8 + 6i)$ جذر لهذه المعادلة، فإن مراافقه $(8 - 6i)$ هو أيضًا جذر لهذه المعادلة، تكون المعادلة التربيعية التي جذراها $(8 + 6i), (8 - 6i)$:

$$(8 + 6i) + (8 - 6i) = 16$$

$$(8 + 6i) \times (8 - 6i) = 64 + 36 = 100$$

$$\Rightarrow z^2 - 16z + 100 = 0$$

ثم نقسم كثير الحدود $z^3 - 20z^2 + 164z - 400$ على $z^2 - 16z + 100$ فنجد أن:

$$z^3 - 20z^2 + 164z - 400 = (z^2 - 16z + 100)(z - 4) = 0$$

$$\Rightarrow z = 4, z = 8 \pm 6i$$

حلول هذه المعادلة هي: $z = 4, z = 8 + 6i, z = 8 - 6i$

المعادلة الجديدة هي: $x^6 - 20x^4 + 164x^2 - 400 = 0$

إذا عوضنا $z = x^2$ ، تتحول هذه المعادلة إلى $x^3 - 20x^2 + 164x - 400 = 0$

إذن، حلول المعادلة $x^6 - 20x^4 + 164x^2 - 400 = 0$ هي الجذور التربيعية لحلول المعادلة

$$z^3 - 20z^2 + 164z - 400 = 0$$

إذن، حلول هذه المعادلة هي: $x = \pm \sqrt{8 - 6i}, x = \pm \sqrt{8 + 6i}, x = \pm 2$

نجد الجذرين التربيعيين للعدد $8 + 6i$

53

$$\sqrt{8 + 6i} = h + ik \Rightarrow 8 + 6i = h^2 - k^2 + 2ihk$$

$$\Rightarrow 8 = h^2 - k^2 \text{ و } 6 = 2hk$$

$$h = \frac{3}{k}$$

$$h^2 - k^2 = 8 \Rightarrow h^2 - \frac{9}{k^2} = 8$$

$$\Rightarrow h^4 - 8h^2 - 9 = 0$$

$$\Rightarrow (h^2 + 1)(h^2 - 9) = 0 \Rightarrow h = \pm 3 \Rightarrow k = \pm 1$$

إذن الجذران التربيعيان للعدد المركب $8 + 6i$ هما: $3 + i, -3 - i$

بالمثل نجد أن الجذرين التربيعيين للعدد المركب $8 - 6i$ هما: $3 - i, -3 + i$

ويكون لمعادلة $x^6 - 20x^4 + 164x^2 - 400 = 0$ ستة حلول هي:

$$x = 2, x = -2, x = 3 + i, x = 3 - i, x = -3 + i, x = -3 - i$$



الدرس الثالث: المحل الهندسي في المستوى المركب

مسألة اليوم صفحة 180

المنطقة المظللة تمثل الأعداد المركبة التي تبعد عن العدد $(-2 + 3i)$ مسافة تقل عن 4 وحدات، فتكون المتباعدة

المطلوبة هي:

$$|z - (-2 + 3i)| < 4 \Rightarrow |z + 2 - 3i| < 4$$

أتحقق من فهمي صفحة 181

$$|z + 5 - 4i| = 7 \Rightarrow |z - (-5 + 4i)| = 7$$

وهذه معادلة دائرة في المستوى المركب مركزها $(-5, 4)$ وطول نصف قطرها 7 وحدات.

$$|z + 5 - 4i| = 7 \Rightarrow |x + iy + 5 - 4i| = 7$$

$$\Rightarrow |(x + 5) + (y - 4)i| = 7$$

$$\Rightarrow \sqrt{(x + 5)^2 + (y - 4)^2} = 7$$

$$\Rightarrow (x + 5)^2 + (y - 4)^2 = 49$$

وهذه معادلة دائرة مركزها $(-5, 4)$ وطول نصف قطرها 7 وحدات.

أتحقق من فهمي صفحة 183

$$|z + 1| = |z - 5i| \Rightarrow |z - (-1)| = |z - (5i)|$$

هذه هي معادلة المنصف العمودي للقطعة المستقيمة الواقعة بين النقطتين $(-1, 0), (0, 5)$

$$|z + 1| = |z - 5i| \Rightarrow |x + iy + 1| = |x + iy - 5i|$$

$$\Rightarrow |(x + 1) + iy| = |x + i(y - 5)|$$

$$\Rightarrow \sqrt{(x + 1)^2 + y^2} = \sqrt{x^2 + (y - 5)^2}$$

$$\Rightarrow (x + 1)^2 + y^2 = x^2 + (y - 5)^2$$

$$\Rightarrow x^2 + 2x + 1 + y^2 = x^2 + y^2 - 10y + 25$$


$$\Rightarrow 2x + 10y - 24 = 0$$

إذن معادلة المنصف العمودي للقطعة المستقيمة بالصيغة الديكارتية هي: $x + 5y - 12 = 0$



أتحقق من فهمي صفة 185

$$Arg(z) = \frac{\pi}{3} \Rightarrow Arg(z - (0)) = \frac{\pi}{3}$$




هذه معادلة شعاع يبدأ بالنقطة $(0,0)$ ولا يشملها، ويصنع زاوية $\frac{\pi}{3}$ مع المحور الحقيقي

a

$$Arg(z - 5) = -\frac{2\pi}{3} \Rightarrow Arg(z - (5)) = -\frac{2\pi}{3}$$

هذه معادلة شعاع يبدأ بالنقطة $(5,0)$ ولا يشملها، ويصنع زاوية $-\frac{2\pi}{3}$ مع المحور الحقيقي

b





أتحقق من فهمي صفرة 188


$$|z + 3 + i| \leq 6$$

المنحنى الحدودي لهذه المتباعدة معادلته $|z + 3 + i| = 6$ وهو دائرة مركزها $(-1, -3)$ ، وطول نصف قطرها 6 وحدات.

وبما أنه توجد مساواة في رمز المتباعدة، فإننا نرسم المنحنى الحدودي متصلًا.

أما منطقة المحل الهندسي فهي داخل الدائرة وعلى محيطها وليس خارجها، لأن الأعداد المركبة التي تحقق المتباعدة تبعد مسافة تقل عن 6 وحدات عن مركز الدائرة أو تساويها.

a



$$|z + 3 + i| < |z - 4|$$

المنحنى الحدودي لهذه المتباعدة معادلته $|z + 3 + i| = |z - 4|$ وهو المنصف العمودي للقطعة المستقيمة الواقلة بين $(-1, -3)$ و $(4, 0)$.


وبما أنه لا توجد مساواة في رمز المتباعدة، فإننا نرسم المنحنى الحدودي متقطعاً.

نحدد جهة المنحنى الحدودي التي تحقق المتباعدة باختيار نقطة الأصل مثلاً وتعويضها في المتباعدة،

$$|0 + 3 + i| < |0 - 4| \Rightarrow \sqrt{10} < 4 \quad \checkmark$$

بما أن نقطة الأصل تحقق المتباعدة، فإن منطقة الطول الممكنة هي المنطقة التي تحوي نقطة الأصل.

b






$$\frac{\pi}{4} < \operatorname{Arg}(z + 5) \leq \frac{\pi}{2}$$

يتمثل منحني المعادلة $\operatorname{Arg}(z + 5) = \frac{\pi}{2}$ شعاعاً (نرسمه متصلة بسبب وجود مساواة في المتباعدة) يبدأ من النقطة $(-5, 0)$ ولا يشملها، ويصنع زاوية قياسها $\frac{\pi}{2}$ مع المحور الحقيقي.

ويمثل منحني المعادلة $\operatorname{Arg}(z + 5) = \frac{\pi}{4}$ شعاعاً (نرسمه متقطعاً بسبب عدم وجود مساواة في المتباعدة) يبدأ من النقطة $(0, -5)$ ولا يشملها، ويصنع زاوية قياسها $\frac{\pi}{4}$ مع المحور الحقيقي.

المحل الهندسي للنقاط التي تحقق المتباعدة المطلوبة هو الجزء المظلل من المستوى المركب كالتالي:

c





أتحقق من فهمي صفة 189

$$|z + 3 - 2i| \geq 4 , \quad -\frac{\pi}{2} < \operatorname{Arg}(z - 2 + i) < \frac{\pi}{4}$$

تتمثل المعادلة $|z + 3 - 2i| \geq 4$ دائرة مركزها النقطة $(-3, 2)$ وطول نصف قطرها 4 وحدات، وبما أنه


توجد مساواة في رمز المتباينة فإننا نرسم المنحنى الحودي متصلًا تمثل المعادلة $= \operatorname{Arg}(z - 2 + i) = \frac{\pi}{4}$ شعاعاً يبدأ بالنقطة $(1, -2)$ ويصنع زاوية قياسها $\frac{\pi}{4}$ مع مستقيم يوازي المحور الحقيقي، وبما أنه لا توجد مساواة في رمز المتباينة، فإننا نرسم الشعاع متقطعاً.

تمثل المعادلة $> -\frac{\pi}{2} = \operatorname{Arg}(z - 2 + i) > 0$ شعاعاً يبدأ بالنقطة $(1, -2)$ ويصنع زاوية قياسها $\frac{\pi}{2}$

مع مستقيم يوازي المحور الحقيقي، وبما أنه لا توجد مساواة في رمز المتباينة، فإننا نرسم الشعاع متقطعاً.

تمثل المتباينة $4 \geq |z + 3 - 2i|$ النقاط الواقعة على الدائرة أو خارجها، وتتمثل المتباينة

$-\frac{\pi}{2} < \operatorname{Arg}(z - 2 + i) < \frac{\pi}{4}$ النقاط الواقعة بين الشعاعين. المنطقة التي تحقق المتباينتين هي الجزء المظلل في الرسم أدناه.






أتدرب وأحل المسائل صفة 189

$$|z| = 10 \Rightarrow |z - (0 + 0i)| = 10$$

المحل الهندسي الذي تمثله هذه المعادلة هو دائرة مركزها $(0,0)$ وطول نصف قطرها 10 وحدات

1




$$|z| = 10 \Rightarrow |x + iy| = 10 \Rightarrow x^2 + y^2 = 100$$

$$|z - 9| = 4 \Rightarrow |z - (9 + 0i)| = 4$$

المحل الهندسي الذي تمثله هذه المعادلة هو دائرة مركزها $(9,0)$ وطول نصف قطرها 4 وحدات

2




$$|z - 9| = 4 \Rightarrow |(x - 9) + iy| = 4 \Rightarrow (x - 9)^2 + y^2 = 16$$

$$|z + 2i| = 8 \Rightarrow |z - (0 + 2i)| = 8$$

المحل الهندسي الذي تمثله هذه المعادلة هو دائرة مركزها $(0, -2)$ وطول نصف قطرها 8 وحدات

3




$$|z + 2i| = 8 \Rightarrow |x + i(y + 2)| = 8 \Rightarrow x^2 + (y + 2)^2 = 64$$



$$|z - 5 + 6i| = 2 \Rightarrow |z - (5 - 6i)| = 2$$


المحل الهندسي الذي تمثله هذه المعادلة هو دائرة مركزها $(5, -6)$ وطول نصف قطرها 2 وحدات



$$|z - 5 + 6i| = 2 \Rightarrow |(x - 5) + i(y + 6)| = 2 \Rightarrow (x - 5)^2 + (y + 6)^2 = 4$$

$$|z + \sqrt{2} + i\sqrt{2}| = 2 \Rightarrow |z - (-\sqrt{2} - \sqrt{2}i)| = 2$$

المحل الهندسي الذي تمثله هذه المعادلة هو دائرة مركزها $(-\sqrt{2}, -\sqrt{2})$ وطول نصف قطرها 2 وحدات




$$|z + \sqrt{2} + i\sqrt{2}| = 2 \Rightarrow |(x + \sqrt{2}) + i(y + \sqrt{2})| = 2$$

$$\Rightarrow (x + \sqrt{2})^2 + (y + \sqrt{2})^2 = 4$$

$$|z + 6 - i| = 7 \Rightarrow |z - (-6 + i)| = 7$$

المحل الهندسي الذي تمثله هذه المعادلة هو دائرة مركزها $(-6, 1)$ وطول نصف قطرها 7 وحدات



$$|z + 6 - i| = 7 \Rightarrow |(x + 6) + i(y - 1)| = 7 \Rightarrow (x + 6)^2 + (y - 1)^2 = 49$$



$$|z - 5| = |z - 3i| \Rightarrow |z - (5)| = |z - (3i)|$$

هذه هي معادلة المنصف العمودي للقطعة المستقيمة الواقلة بين النقطتين $(5,0)$, $(0,3)$

$$|z - 5| = |z - 3i| \Rightarrow |(x - 5) + iy| = |x + i(y - 3)|$$

$$\Rightarrow \sqrt{(x - 5)^2 + y^2} = \sqrt{x^2 + (y - 3)^2}$$


$$\Rightarrow (x - 5)^2 + y^2 = x^2 + (y - 3)^2$$

$$\Rightarrow x^2 - 10x + 25 + y^2 = x^2 + y^2 - 6y + 9$$

7

$$\Rightarrow 10x - 6y - 16 = 0$$

إذن معادلة المنصف العمودي للقطعة المستقيمة بالصيغة الديكارتية هي: $5x - 3y - 8 = 0$



$$|z + 3i| = |z - 7i| \Rightarrow |z - (-3i)| = |z - (7i)|$$

هذه هي معادلة المنصف العمودي للقطعة المستقيمة الواقلة بين النقطتين $(0, -3)$, $(0, 7)$

$$|z + 3i| = |z - 7i| \Rightarrow |x + i(y + 3)| = |x + i(y - 7)|$$

$$\Rightarrow \sqrt{x^2 + (y + 3)^2} = \sqrt{x^2 + (y - 7)^2}$$

$$\Rightarrow x^2 + (y + 3)^2 = x^2 + (y - 7)^2$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 + 6y + 9$$


$$= x^2 + y^2 - 14y + 49$$

$$\Rightarrow 20y - 40 = 0$$

8

إذن معادلة المنصف العمودي للقطعة المستقيمة بالصيغة الديكارتية هي:

$$y = 2$$





$$|z + 5 + 2i| = |z - 7| \Rightarrow |z - (-5 - 2i)| = |z - (7)|$$

هذه هي معادلة المنصف العمودي للقطعة المستقيمة الواقعية بين النقطتين $(-5, -2), (7, 0)$

$$|z + 5 + 2i| = |z - 7| \Rightarrow |(x + 5) + i(y + 2)| = |(x - 7) + iy|$$


$$\Rightarrow \sqrt{(x + 5)^2 + (y + 2)^2} = \sqrt{(x - 7)^2 + y^2}$$

$$\Rightarrow (x + 5)^2 + (y + 2)^2 = (x - 7)^2 + y^2$$

$$\Rightarrow x^2 + 10x + 25 + y^2 + 4y + 4 = x^2 - 14x + 49 + y^2$$

$$\Rightarrow 24x + 4y - 20 = 0$$

إذن معادلة المنصف العمودي للقطعة المستقيمة بالصيغة الديكارتية هي: $6x + y - 5 = 0$



$$|z - 3| = |z - 2 - i| \Rightarrow |z - (3)| = |z - (2 + i)|$$

هذه هي معادلة المنصف العمودي للقطعة المستقيمة الواقعية بين النقطتين $(3, 0), (2, 1)$

$$|z - 3| = |z - 2 - i| \Rightarrow |(x - 3) + iy| = |(x - 2) + i(y - 1)|$$


$$\Rightarrow \sqrt{(x - 3)^2 + y^2} = \sqrt{(x - 2)^2 + (y - 1)^2}$$

$$\Rightarrow (x - 3)^2 + y^2 = (x - 2)^2 + (y - 1)^2$$

$$\Rightarrow x^2 - 6x + 9 + y^2 = x^2 - 4x + 4 + y^2 - 2y + 1$$

$$\Rightarrow 2x - 2y - 4 = 0$$

إذن معادلة المنصف العمودي للقطعة المستقيمة بالصيغة الديكارتية هي: $x - y - 2 = 0$





$$\frac{|z + 6 - i|}{|z - 10 - 5i|} = 1 \Rightarrow |z + 6 - i| = |z - 10 - 5i| \\ \Rightarrow |z - (-6 + i)| = |z - (10 + 5i)|$$

هذه هي معادلة المنصف العمودي للقطعة المستقيمة الواقلة بين النقطتين $(-6, 1)$, $(10, 5)$

$$|z + 6 - i| = |z - 10 - 5i| \Rightarrow |(x + 6) - i(y - 1)| = |(x - 10) + i(y - 5)|$$


$$\Rightarrow \sqrt{(x + 6)^2 + (y - 1)^2} = \sqrt{(x - 10)^2 + (y - 5)^2}$$

$$\Rightarrow (x + 6)^2 + (y - 1)^2 = (x - 10)^2 + (y - 5)^2$$

$$11 \Rightarrow x^2 + 12x + 36 + y^2 - 2y + 1 = x^2 - 20x + 100 + y^2 - 10y + 25$$

$$\Rightarrow 32x + 8y - 88 = 0$$

إذن معادلة المنصف العمودي للقطعة المستقيمة بالصيغة الديكارتية هي: $4x + y - 11 = 0$





$$|z + 7 + 2i| = |z - 4 - 3i| \Rightarrow |z - (-7 - 2i)| = |z - (4 + 3i)|$$

هذه هي معادلة المنصف العمودي للقطعة المستقيمة الواقلة بين النقطتين $(-7, -2)$, $(4, 3)$

$$|z + 7 + 2i| = |z - 4 - 3i| \Rightarrow |(x + 7) + i(y + 2)| = |(x - 4) + i(y - 3)|$$

$$\Rightarrow \sqrt{(x + 7)^2 + (y + 2)^2} = \sqrt{(x - 4)^2 + (y - 3)^2}$$


$$\Rightarrow (x + 7)^2 + (y + 2)^2 = (x - 4)^2 + (y - 3)^2$$

$$\Rightarrow x^2 + 14x + 49 + y^2 + 4y + 4 = x^2 - 8x + 16 + y^2 - 6y + 9$$

12

$$\Rightarrow 22x + 10y + 28 = 0$$

إذن معادلة المنصف العمودي للقطعة المستقيمة بالصيغة الديكارتية هي: $0 = 11x + 5y + 14$




$$\text{Arg}(z + 2 - 5i) = \frac{\pi}{4} \Rightarrow \text{Arg}(z - (-2 + 5i)) = \frac{\pi}{4}$$

المحل الهندسي لهذه المعادلة هو شعاع ينطلق من النقطة $(-2, 5)$ ولا يشملها، ويصنع زاوية قياسها $\frac{\pi}{4}$ مع

مستقيم يوازي المحور الحقيقي.

13






$$\operatorname{Arg}(z - 1 + i\sqrt{3}) = \frac{2\pi}{3} \rightarrow \operatorname{Arg}(z - (1 - i\sqrt{3})) = \frac{2\pi}{3}$$

المحل الهندسي لهذه المعادلة هو شعاع ينطلق من النقطة $(1, -\sqrt{3})$ ولا يشملها، ويصنف زاوية قياسها

$\frac{2\pi}{3}$ مع مستقيم يوازي المحور الحقيقي.

14




$$\operatorname{Arg}(z - 4i) = -\frac{3\pi}{4} \Rightarrow \operatorname{Arg}(z - (4i)) = -\frac{3\pi}{4}$$

المحل الهندسي لهذه المعادلة هو شعاع ينطلق من النقطة $(0, 4)$ ولا يشملها، ويصنف زاوية قياسها

$-\frac{3\pi}{4}$ مع مستقيم يوازي المحور الحقيقي.

15





$$|z - 2| < |z + 2|$$

المنحنى الحدودي لهذه الممتباينة معادله $|z - 2| = |z + 2|$


وهو المنصف العمودي للقطعة المستقيمة الواسلة بين $(-2, 0)$ و $(2, 0)$.

وبما أنه لا توجد مساواة في رمز الممتباينة، فإننا نرسم المنحنى الحدودي متقطعاً.

نحدد جهة المنحنى الحدودي التي تحقق الممتباينة باختيار $i + 1 = z$ مثلاً وتعويضه في الممتباينة،
 $|1 + i - 2| < |1 + i + 2| \Rightarrow |-1 + i| < |3 + i| \Rightarrow \sqrt{2} < \sqrt{10}$ ✓

بما أن $i + 1 = z$ حقق الممتباينة، فإن منطقة الحلول الممكنة هي المنطقة التي تحوي i
 أي نختار الجهة التي يكون فيها بعد النقاط عن النقطة $(-2, 0)$ أقل من بعدها عن النقطة $(2, 0)$

16




$$|z - 4 - 2i| \leq 2 \Rightarrow |z - (4 + 2i)| \leq 2$$

المنحنى الحدودي لهذه الممتباينة معادله $|z - 4 - 2i| = 2$ ، وهو دائرة مركزها $(4, 2)$ وطول نصف قطرها وحدتان.

وبما أنه توجد مساواة في رمز الممتباينة، فإننا نرسم المنحنى الحدودي متصلأً.

أما منطقة المحل الهندسي فهي داخل الدائرة وعلى محيطها وليس خارجها، لأن الأعداد المركبة التي تحقق الممتباينة تبعد عن مركز الدائرة مسافة تقل عن طول نصف القطر أو تساويها.

17





$$|z - 4| > |z - 6|$$

المنحنى الحدودي لهذه المتباينة معادله $|z - 4| = |z - 6|$

وهو المنصف العمودي للقطعة المستقيمة الواسلة بين (6,0) و (4,0).

وبما أنه لا توجد مساواة في رمز المتباينة، فإننا نرسم المنحنى الحدودي متقطعاً.


نحدد جهة المنحنى الحدودي التي تحقق المتباينة باختيار $z = 0$ مثلاً وتعويضه في المتباينة،

$$|0 - 4| > |0 - 6| \rightarrow 2 > \sqrt{6} \quad \times$$

بما أن العدد $z = 0$ لا يتحقق المتباينة، فإن منطقة الحلول الممكنة هي المنطقة التي لا تحوي $z = 0$.

(أي نختار الجهة التي يكون فيها بعد النقاط عن النقطة (6,0) أكبر من بعدها عن النقطة (4,0))

18



$$0 < \operatorname{Arg}(z - 2 - 2i) < \frac{\pi}{4}$$

يمثل منحنى المعادلة $\operatorname{Arg}(z - 2 - 2i) = \frac{\pi}{4}$ شعاعاً (نرسمه متقطعاً بسبب عدم وجود مساواة في المتباينة)


يبدأ من النقطة (2,2) ولا يشملها، ويصنع زاوية قياسها $\frac{\pi}{4}$ مع مستقيم يوازي المحور الحقيقي. ويمثل منحنى

المعادلة $0 < \operatorname{Arg}(z - 2 - 2i) < \frac{\pi}{4}$ شعاعاً (نرسمه متقطعاً بسبب عدم وجود مساواة في المتباينة) يبدأ من

النقطة (2,2) ولا يشملها، ويوازي المحور الحقيقي.

المحل الهندسي للنقاط التي تحقق المتباينة المطلوبة هو الجزء من المستوى المركب المحصور بين هذين

19





$$-\frac{\pi}{4} \leq \operatorname{Arg}(z - 3 + 4i) \leq \frac{\pi}{4}$$


يمثل منحني المعادلة $\operatorname{Arg}(z - 3 + 4i) = \frac{\pi}{4}$ شعاعاً (نرسمه متصلًا بسبب وجود مساواة في المتباعدة)

يبدأ من النقطة $(-3, 0)$ ولا يشملها، ويصنع زاوية قياسها $\frac{\pi}{4}$ مع مستقيم موازٍ للمحور الحقيقي.

ويمثل منحني المعادلة $\operatorname{Arg}(z - 3 + 4i) = -\frac{\pi}{4}$ شعاعاً (نرسمه متصلًا بسبب وجود مساواة في

المتباعدة) يبدأ من النقطة $(3, 0)$ ولا يشملها، ويصنع زاوية قياسها $-\frac{\pi}{4}$ مع مستقيم موازٍ للمحور الحقيقي.

المحل الهندسي للنقاط التي تحقق المتباعدة المطلوبة هو الجزء من المستوى المركب المبين في الشكل:



$$2 \leq |z - 3 - 4i| \leq 4 \Rightarrow 2 \leq |z - (3 + 4i)| \leq 4$$


يمثل منحني المعادلة $|z - (3 + 4i)| = 2$ دائرة مركزها $(3, 4)$ وطول نصف قطرها وحدتان، وبما

أنه توجد مساواة في رمز المتباعدة، فإننا نرسم المنحني الحدودي متصلًا.

ويمثل منحني المعادلة $|z - (3 + 4i)| = 4$ دائرة مركزها $(3, 4)$ وطول نصف قطرها 4

وبما أنه توجد مساواة في رمز المتباعدة، فإننا نرسم المنحني الحدودي متصلًا.

أما منطقة المحل الهندسي فهي المنطقة التي تحوي جميع الأعداد الواقعية على الدائريتين أو بينهما.



21




محل الهندسي الذي تمثله المعادلة $|z - 3 + 2i| = \sqrt{10}$ هو دائرة مركزها $(2, -3)$ وطول نصف قطرها $\sqrt{10}$ وحدات، ومعادلتها الديكارتية هي: $(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 10$

المحل الهندسي الذي تمثله المعادلة $|z - 7 + i| = |z - 6i|$ هو المنصف العمودي للقطعة المستقيمة التي طرفاها $(0, 6)$ و $(-1, 7)$ ، نستطيع إيجاد معادلته الديكارتية عن طريق ميل العمودي ونقطة منتصف القطعة المستقيمة:

ميل القطعة المستقيمة التي طرفاها $(0, 6)$ و $(-1, 7)$ هو -1 ، فميل المنصف العمودي لها هو 1

$$m = 1, M\left(\frac{7}{2}, \frac{5}{2}\right) \Rightarrow y - \frac{5}{2} = x - \frac{7}{2} \Rightarrow y = x - 1$$



لإيجاد الأعداد المركبة التي تحقق المعادلتين معاً، نجد نقاط تقاطع المنحنيين:

$$\begin{aligned} (x-3)^2 + (y+2)^2 &= 10 \\ (x-3)^2 + (y+2)^2 = 10 &\Rightarrow (x-3)^2 + (x-1+2)^2 = 10 \\ &\Rightarrow 2x^2 - 4x = 0 \Rightarrow 2x(x-2) = 0 \\ &\Rightarrow x = 0, x = 2 \Rightarrow y = -1, y = 1 \end{aligned}$$

العددان المركبان اللذان يحققان المعادلتين معاً هما: $z_1 = -i$, $z_2 = 2 + i$

بحل المعادلتين (1) و (2) نجد:

ويكون العدد المركب الذي يحقق كلاً من المعادلتين هو: $i = \frac{31}{26} - \frac{7}{13}$



يتمثل منحنى المعادلة $\text{Arg}(z + 2 - 5i) = \frac{\pi}{4}$ شعاعاً يبدأ من النقطة $(-2, 5)$ ولا يشملها، ويصنع زاوية


قياسها $\frac{\pi}{4}$ مع مستقيم يوازي المحور الحقيقي

ويمثل منحنى المعادلة $\text{Arg}(z + 2 - 5i) = -\frac{\pi}{2}$ شعاعاً يبدأ من النقطة $(-2, 5)$ ولا يشملها، ويصنع

زاوية قياسها $\frac{\pi}{2}$ مع مستقيم يوازي المحور الحقيقي

ويمثل منحنى المعادلة $|z + 2 - 5i| = \sqrt{29}$ دائرة مركزها $(-2, 5)$ وطول نصف قطرها $\sqrt{29}$

24





$$1) |z - 3| > |z + 2i|$$

المنحنى الحدودي لهذه المتباينة معادله $|z - 3| = |z + 2i|$

وهو المنصف العمودي للقطعة المستقيمة التي طرفاها $(-2, 0)$ و $(3, 0)$.

وبما أنه لا توجد مساواة في رمز المتباينة، فإننا نرسم المنحنى الحدودي متقطعاً.

نحدد جهة المنحنى الحدودي التي تحقق المتباينة باختيار $z = 0$ مثلاً وتعويضه في المتباينة،

$$|0 - 3| > |0 + 2i| \rightarrow 3 > 2 \quad \checkmark$$

بما أن العدد 0 يتحقق المتباينة، فإن منطقة الحلول الممكنة هي المنطقة التي تحوي $0 = z$ (نقطة الأصل)

$$2) |z + 3 - i| < |z - 1 + 5i|$$

المنحنى الحدودي لهذه المتباينة معادله $|z + 3 - i| = |z - 1 + 5i|$

وهو المنصف العمودي للقطعة المستقيمة التي طرفاها $(-5, 1)$ و $(-3, 1)$.


وبما أنه لا توجد مساواة في رمز المتباينة، فإننا نرسم المنحنى الحدودي متقطعاً.

نحدد جهة المنحنى الحدودي التي تحقق المتباينة باختيار $z = 0$ مثلاً وتعويضه في المتباينة،

$$25) |0 + 3 - i| < |0 - 1 + 5i| \rightarrow \sqrt{10} < \sqrt{26} \quad \checkmark$$

بما أن العدد 0 يتحقق المتباينة، فإن منطقة الحلول الممكنة هي المنطقة التي تحوي $0 = z$ (نقطة الأصل)

المحل الهندسي للنقاط التي تحقق المتباينتين معاً هو المنطقة المظللة في الشكل أدناه:





$$1) -\frac{\pi}{2} < \operatorname{Arg}(z + 2 - 5i) < \frac{\pi}{4}$$

يتمثل منحني المعادلة $\operatorname{Arg}(z + 2 - 5i) = \frac{\pi}{4}$ شعاعاً (نرسمه متقطعاً بسبب عدم وجود مساواة في المتباينة)

يبدأ من النقطة (2,5) ولا يشملها، ويصنع زاوية قياسها $\frac{\pi}{4}$ مع مستقيم موازٍ للمحور الحقيقي.

ويتمثل منحني المعادلة $\operatorname{Arg}(z + 2 - 5i) = -\frac{\pi}{2}$ شعاعاً (نرسمه متقطعاً بسبب عدم وجود مساواة في


المتباينة) يبدأ من النقطة (2,5) ولا يشملها، ويصنع زاوية قياسها $-\frac{\pi}{2}$ مع مستقيم موازٍ للمحور الحقيقي.

$$2) |z + 2 - 5i| > \sqrt{29}$$

ويتمثل منحني المعادلة $|z + 2 - 5i| = \sqrt{29}$ دائرة مركزها (2,5) وطول نصف قطرها $\sqrt{29}$

نرسمها متقطعة بسبب عدم وجود مساواة في المتباينة

المحل الهندسي للنقاط التي تحقق المتباينتين معاً هو المنطة المظللة في الشكل أدناه:



26



$$1) -\frac{\pi}{4} \leq \operatorname{Arg}(z - 2i) \leq \frac{\pi}{3}$$

يتمثل منحنى المعادلة $\operatorname{Arg}(z - 2i) = -\frac{\pi}{4}$ شعاعاً (نرسمه متصلة بسبب وجود مساواة في المتباينة) يبدأ من النقطة (0,2) ولا يشملها، ويصنع زاوية قياسها $\frac{\pi}{4}$ مع مستقيم موازٍ للمحور الحقيقي.


ويتمثل منحنى المعادلة $\operatorname{Arg}(z - 2i) = \frac{\pi}{3}$ شعاعاً (نرسمه متصلة بسبب وجود مساواة في المتباينة) يبدأ من النقطة (0,2) ولا يشملها، ويصنع زاوية قياسها $\frac{\pi}{3}$ مع مستقيم موازٍ للمحور الحقيقي.

$$2) |z - 3 + i| \leq 5$$

ويتمثل منحنى المعادلة $|z - 3 + i| = 5$ دائرة مركزها (3,-1) وطول نصف قطرها 5 نرسمها متصلة بسبب وجود مساواة في المتباينة

ويتمثل منحنى المعادلة $|z - 3 + i| = 2$ دائرة مركزها (1,-1) وطول نصف قطرها 2 نرسمها منقطعة بسبب عدم وجود مساواة في المتباينة

المحل الهندسي للنقاط التي تحقق المتباينتين معاً هو المنطة المظللة في الشكل أدناه:



27

$$|z - (1 + i)| = 3$$

National Center for Curriculum Development

National Center for Curriculum Development

ويتمثل منحنى المعادلة $|z - (1 + i)| = 3$ دائرة مركزها (-1,0) ونصف قطرها 3 نرسمها متصلة بسبب وجود مساواة في المتباينة

28

$$|z - (1 + i)| = 3$$

National Center for Curriculum Development

National Center for Curriculum Development

National Center for Curriculum Development

يبدأ بالتحقق من أن المستقيم المرسوم هو فعلاً العمود المنصف القطعة المستقيمة التي طرفاها (3,2) و (-1,0):

ميل القطعة المستقيمة يساوي $\frac{1}{2}$ وميل المستقيم يساوي 2 – فيما متعامدان،

29

معادلة المستقيم هي $x - 2y = 3$ ، ونقطة منتصف القطعة المستقيمة هي (1,1) وهي واقعة على المستقيم لأن إحداثياتها يحققان معادلته،

إذن المستقيم المرسوم هو المنصف العمودي للقطعة، ومعادلته:

$$|z - (3 + 2i)| = |z - (-1)| \Rightarrow |z - 3 - 2i| = |z + 1|$$

30

$$\operatorname{Arg}(z + 1 - 2i) = -\frac{3\pi}{4}$$



31	$r = \sqrt{(4 - 4)^2 + (1 - 8)^2} = \sqrt{49} = 7$ $ z - (4 + i) \geq 7$	
32	<p>قياس الزاوية بين الشعاع والمستقيم الموازي للمحور الحقيقي هو $-\frac{\pi}{4}$ – لأن ميل الشعاع 1</p> $-\frac{\pi}{4} \leq \operatorname{Arg}(z + 2 - i) < 0$	
	<p>الجزء المظلل يقع داخل دائرة مركزها $(-1, -2)$ وطول نصف قطرها 3 وحدات وهي مرسومة متصلة فالمتباينة المرتبطة بها هي: $z - (-1 - 2i) \leq 3 \Rightarrow z - 1 + 2i \leq 3$</p> <p>والمستقيم المرسوم متصل نجد أن ميله يساوي $\frac{6}{4}$ ، وميل القطعة المستقيمة الواقلة بين النقطتين $(-6, 0), (0, -4)$ هو $\frac{-4}{6}$ فهما متعامدان ونلاحظ أن المستقيم يمر بالنقطة $(-5, -5)$ فمعادلته هي:</p> $y + 5 = \frac{6}{4}(x + 5)$ ، وإذا عوضنا إحداثي منتصف القطعة الواقلة بين $(-6, 0), (0, -4)$ ، وهي $(-3, -2)$ نجد أنها تتحققما، ما يعني أن المستقيم هو المنصف العمودي للقطعة الواقلة بين $(-6, 0), (0, -4)$ ، والمنطقة المظللة تمثل الأعداد المركبة الأقرب إلى النقطة $(-4, 0)$ ، فالمتباينة المرتبطة بهذا المستقيم هي: $ z + 6 \geq z + 4i $. <p>إذن، نظام المتباينات الذي يمثل المحل الهندسي المبين في الشكل المعطى هو:</p> $ z + 1 + 2i \leq 3$ $ z + 6 \geq z + 4i $	
	$ z - 3 + 4i = 2 \Rightarrow z - (3 - 4i) = 2$ <p>z يقع على الدائرة التي مركزها $(-4, -3)$ وطول نصف قطرها 2</p> <p>نفرض $z = x + iy$ فإن:</p> $ z $ يساوي $\sqrt{x^2 + y^2}$ وهو يمثل البعد بين النقطة (x, y) ونقطة الأصل في المستوى الديكارتي	
34	$OC = \sqrt{9 + 16} = 5$ $ z = OC - r = 5 - 2 = 3$ وهي: $ z = OC + r = 5 + 2 = 7$ وهي: أدنى قيمة لـ $ z $ هي مقياس العدد الذي تمثله النقطة A وهي: 3 أكبر قيمة لـ $ z $ هي مقياس العدد الذي تمثله النقطة B وهي: 7	



35

$$\begin{aligned}|z - 6| &= 2|z + 6 - 9i| \Rightarrow |x - 6 + iy| = 2|(x + 6) + i(y - 9)| \\&\Rightarrow (x - 6)^2 + y^2 = 4((x + 6)^2 + (y - 9)^2) \\&\Rightarrow x^2 - 12x + 36 + y^2 = 4(x^2 + 12x + 36 + y^2 - 18y + 81) \\&\Rightarrow x^2 + y^2 + 20x - 24y + 144 = 0 \\&\Rightarrow (x + 10)^2 + (y - 12)^2 = 100\end{aligned}$$

وهي معادلة دائرة مركزها $(-10, 12)$ وطول نصف قطرها 10 وحدات.

36

$$\text{Arg}(z - 2 + 3i) = \frac{\pi}{8}$$

المحل الهندسي لهذه المعادلة هو شعاع ينطلق من النقطة $(-2, 3)$ ولا يشملها، ويصنع زاوية قياسها $\frac{\pi}{8}$

مع مستقيم يوازي المحور الحقيقي، وهو الممثل بالشكل b.

أما الشكل a فنقطة بداية الشعاع ليست صحيحة

والشكل c فنقطة بداية الشعاع مشمولة، وهو ليس صحيحاً

والشكل d فسعة العدد المركب هي $\frac{\pi}{8}$ وهو مخالف لسعة المعطاة بالمعادلة.



اختبار نهاية الوحدة الثالثة

1	c		
2	b		
3	c		
4	b		
5	a		
6	d		
7	$\sqrt{45 - 28i} = x + iy \Rightarrow 45 - 28i = x^2 - y^2 + 2ixy$ $\Rightarrow x^2 - y^2 = 45, 2xy = -28 \Rightarrow y = -\frac{14}{x}$ $\Rightarrow x^2 - \frac{196}{x^2} = 45$ $\Rightarrow x^4 - 45x^2 - 196 = 0$ $\Rightarrow (x^2 - 49)(x^2 + 4) = 0 \Rightarrow x = \pm 7$ $\Rightarrow x = 7, y = -2 \text{ or } x = -7, y = 2$ $-7 + 2i$ والجزء التربيعاني للعدد $45 - 28i$ هما: $7 - 2i$ و		
8	$ w = \sqrt{\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right)^2 + \left(-\frac{1}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{7}{12}} \approx 0.76$ $Arg(w) = -\left(\pi - \tan^{-1}\left(\frac{\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{3}}\right)\right) = -\left(\pi - \tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\right) = -2.43$		
9	$z + w = a - 8 + 10i \Rightarrow z + w = \sqrt{(a - 8)^2 + 100} = 26$ $\Rightarrow (a - 8)^2 + 100 = 676 \Rightarrow (a - 8)^2 = 576 \Rightarrow a - 8 = \pm 24$ $\Rightarrow a = -16 \text{ or } a = 32$ ولأن $0 < a$, فإن:		
10	$w = \frac{14 - 31i}{3 - 2i} \times \frac{3 + 2i}{3 + 2i} = \frac{104 - 65i}{9 + 4} = 8 - 5i$		



$$(8 - 5i)^2 + c(8 - 5i) + d = 0 \Rightarrow 64 - 80i - 25 + 8c - 5ci + d = 0 \\ \Rightarrow 39 + d + 8c - i(80 + 5c) = 0 \\ \Rightarrow 39 + d + 8c = 0, 80 + 5c = 0 \\ \Rightarrow c = -16, d = 89$$

11

$$w = 8 - 5i \Rightarrow \bar{w} = 8 + 5i \\ \Rightarrow c = -(w + \bar{w}) = -16 \\ \Rightarrow d = w \times \bar{w} = 64 + 25 = 89$$


حل آخر:

$$|z - 6| \leq 3$$

المنحنى الحدوبي لهذه الممتداة معادله $|z - 6| = 3$ ، وهو دائرة مركزها $(6,0)$ وطول نصف قطرها 3 وحدات.

12

وبما أنه توجد مساواة في رمز الممتداة، فإننا نرسم المنحنى الحدوبي متصلًا. أما منطقة المحل الهندسي فهي داخل الدائرة وعلى محيطها وليس خارجها، لأن الأعداد المركبة التي تحقق الممتداة تبعد عن مركز الدائرة مسافة تقل عن طول نصف القطر أو تساويها.




$$\frac{\pi}{4} \leq \operatorname{Arg}(z - 2) \leq \frac{2\pi}{3}$$

يتمثل منحنى المعادلة $\operatorname{Arg}(z - 2) = \frac{\pi}{4}$ شعاعاً (نرسمه متصلًا بسبب وجود المساواة في الممتداة) يبدأ من النقطة $(2,0)$ ولا يشملها، ويصنع زاوية قياسها $\frac{\pi}{4}$ مع المحور الحقيقي. ويمثل منحنى المعادلة $\operatorname{Arg}(z - 2) = \frac{2\pi}{3}$ شعاعاً (نرسمه متصلًا بسبب وجود المساواة في الممتداة) يبدأ من النقطة $(2,0)$ ولا يشملها، ويصنع زاوية قياسها $\frac{2\pi}{3}$ مع المحور الحقيقي.

13

المحل الهندسي للنقاط التي تحقق الممتداة هو المنطقة المظللة في الشكل أدناه:





$$|z + 1 + i| > |z - 3 - 3i|$$

المنحنى الحدودي لهذه المتباينة معادله $|z + 1 + i| = |z - 3 - 3i|$

وهو المنصف العمودي للقطعة المستقيمة التي طرفاها $(3, 3)$ و $(-1, -1)$.


وبما أنه لا توجد مساواة في رمز المتباينة، فإننا نرسم المنحنى الحدودي منقطعاً.

نحدد جهة المنحنى الحدودي التي تحقق المتباينة باختيار $z = 0$ مثلاً وتعويضه في المتباينة،

$$|0 + 1 + i| > |0 - 3 - 3i| \Rightarrow \sqrt{2} > \sqrt{18} \quad \times$$

بما أن العدد 0 لا يتحقق المتباينة، فإن منطقة الحلول الممكنة هي المنطقة التي لا تحوى 0

14



$$NO = \sqrt{16 + 49} = \sqrt{65}$$

15

$$MO = \sqrt{1 + 64} = \sqrt{65}$$

اذن المثلث OMN متطابق الضلعين

باستخدام قانون جيب التمام في المثلث OMN :

16

$$(NM)^2 = (NO)^2 + (MO)^2 - 2(NO)(MO) \cos \angle MON$$

$$\Rightarrow \cos \angle MON = -\frac{234 - 130}{130} = -\frac{4}{5}$$

17

$$A = \frac{1}{2}(NO)(MO) \sin \angle MON = \frac{1}{2} \times 65 \times \frac{3}{5} = \frac{39}{2}$$



$$|z - 8| > |z + 2i|$$

المنحنى الحدوبي لهذه المتباينة معادله $|z - 8| = |z + 2i|$

وهو المنصف العمودي للقطعة المستقيمة التي طرفاها $(-2, 0)$ و $(8, 0)$.

وبما أنه لا توجد مساواة في رمز المتباينة، فإننا نرسم المنحنى الحدوبي متقطعاً.

$$-\frac{\pi}{4} < \operatorname{Arg}(z + 3 - 6i) < \frac{\pi}{4}$$


يمثل منحنى المعادلة $\operatorname{Arg}(z + 3 - 6i) = \frac{\pi}{4}$ شعاعاً (نرسمه متقطعاً بسبب عدم وجود مساواة في المتباينة)

يبدأ من النقطة $(-3, 6)$ ولا يشملها، ويصنع زاوية قياسها $\frac{\pi}{4}$ مع مستقيم مواز للمحور الحقيقي

ويمثل منحنى المعادلة $\operatorname{Arg}(z + 3 - 6i) = -\frac{\pi}{4}$ شعاعاً (نرسمه متقطعاً بسبب عدم وجود مساواة في

المتباينة) يبدأ من النقطة $(3, 6)$ ولا يشملها، ويصنع زاوية قياسها $\frac{\pi}{4}$ مع مستقيم مواز للمحور الحقيقي.

المحل الهندسي للنقاط التي تحقق المتباينتين هو المنطقة المظللة في الشكل أدناه:



18

المحل الهندسي للنقاط التي تتحقق المتباينتين هو المنطقة المظللة في الشكل أدناه:

$$z = 5 + 2i \Rightarrow \bar{z} = 5 - 2i$$

19

$$\frac{z}{\bar{z}} = \frac{5+2i}{5-2i} \times \frac{5+2i}{5+2i} = \frac{25+20i-4}{25+4} = \frac{21+20i}{29} = \frac{1}{29}(21+20i)$$

$$\operatorname{Arg}(z) = \tan^{-1} \frac{2}{5}$$

$$\operatorname{Arg}(\bar{z}) = -\tan^{-1} \frac{2}{5}$$

20

$$\operatorname{Arg}\left(\frac{z}{\bar{z}}\right) = \operatorname{Arg}(z) - \operatorname{Arg}(\bar{z})$$

$$\begin{aligned} \operatorname{Arg}\left(\frac{z}{\bar{z}}\right) &= \operatorname{Arg}(z) - \operatorname{Arg}(\bar{z}) \Rightarrow \tan^{-1}\left(\frac{20}{21}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{2}{5}\right) - \left(-\tan^{-1}\left(\frac{2}{5}\right)\right) \\ &\Rightarrow \tan^{-1}\left(\frac{20}{21}\right) = 2\tan^{-1}\left(\frac{2}{5}\right) \end{aligned}$$



$$z^4 - 6z^3 + 14z^2 - 64z + 680 = 0$$

بما أن العدد $4i + 2$ هو حل لهذه المعادلة، إذن مراافقه $4i - 2$ يكون حلاً أيضاً لها والمعادلة التربيعية التي لها هذان الجذران هي أحد عوامل كثير الحدود المرتبط بهذه المعادلة المطلوبة.

مجموع الجذرين يساوي -4 ، وحاصل ضربهما 20 ، إذن، المعادلة هي: $z^2 + 4z + 20 = 0$ فنجد أن:


21

$$z^4 - 6z^3 + 14z^2 - 64z + 680 = (z^2 + 4z + 20)(z^2 - 10z + 34) = 0$$

لإيجاد جذور المعادلة $z^2 - 10z + 34 = 0$ نستخدم القانون العام لحل هذه المعادلة التربيعية:

$$z = \frac{10 \pm \sqrt{-36}}{2} = \frac{10 \pm 6i}{2} = 5 \pm 3i$$

ف تكون الجذور الثلاثة المطلوبة هي: $5 + 3i, 5 - 3i, -2 - 4i$



22

الرباعي $ABCD$ هو شبه منحرف، مساحته بالوحدات المربعة تساوي:

$$A = \frac{1}{2}(7)(6 + 8) = 49$$

23

$$0 \leq \operatorname{Arg}(z - 3i) \leq \frac{\pi}{3}$$

24

$$z^2 + 2z + 10 = 0$$

$$\Delta = 4 - 40 = -36$$

مميز المعادلة التربيعية سالب، إذن لهذه المعادلة جذران مترافقان، وحسب النظرية فإن العددان المركبان المترافقان لهما المقياس نفسه

