

امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠١٩

(وثيقة محمية/محدود)

س د

مدة الامتحان : ٠٠ : ٢

المبحث : الكيمياء (خطة ٢٠١٩)

الفرع : العلمي والزراعي والاقتصاد المنزلي (مسار الجامعات)

اليوم والتاريخ : الأربعاء ٢٠١٩/٦/١٩

ملحوظة : أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعددها (٥)، علماً بأن عدد الصفحات (٤).

السؤال الأول: (٤٥ علامة)

أ - يُبين الجدول المجاور محاليل لقواعد ضعيفة متساوية التركيز (١) مول/لتر، عند درجة حرارة (٢٥)°س، ومعلومات عنها ($K_w = 1.0 \times 10^{-14}$ ، $\text{pH} = 7.0$)، ادرسه ثم أجب عن الأسئلة الآتية: (٣٣ علامة)

(١) ما صيغة القاعدة الأضعف؟

(٢) ما صيغة الحمض المرافق للقاعدة التي لها أعلى pH؟

(٣) أي من المحلولين (CH_3NH_2 أم N_2H_4) يكون فيه $[\text{OH}^-]$ أعلى؟

(٤) أي من القواعد يكون لحمضها المرافق أقل pH؟

(٥) ما قيمة pH لمحلول CH_3NH_2 ؟(٦) فسّر السلوك القاعدي لـ NH_3 وفق مفهوم لويس.(٧) أي من المحلولين الملحيين ($\text{N}_2\text{H}_5\text{Cl}$ أم NH_4Cl) أقل قدرة على التميّه.(٨) فسّر بمعادلة السلوك القاعدي لمحلول N_2H_4 حسب مفهوم برونستد ولوري.(٩) اكتب الأزواج المترافقة عند تفاعل NH_4^+ مع CH_3NH_2 .(١٠) ماذا يحدث لتركيز $[\text{H}_3\text{O}^+]$ عند إضافة بلورات الملح $\text{N}_2\text{H}_5\text{Cl}$ إلى محلول N_2H_4 (تقل ، تزداد)؟(١١) احسب K_b لمحلول NH_3 .ب- احسب قيمة pH لمحلول HBr تركيزه (1.0×10^{-1}) مول/لتر. (٣ علامات)

ج- انقل إلى دفتر إجابتك رقم الفقرة والإجابة الصحيحة لها: (٩ علامات)

(١) إذا كانت قيمة pH لمحلول مكون من الحمض HA والملح KA لهما التركيز نفسه تساوي (٤)،

فإن قيمة K_a للحمض تساوي:(أ) (10^{-2}) (ب) (10^{-4}) (ج) (10^{-8}) (د) (10^{-10})

(٢) الملح الذي يُعد ذوبانه في الماء تميّهًا من الأملاح الآتية هو:

(أ) KClO (ب) KCl (ج) NaCl (د) NaI

(٣) المادة التي تسلك سلوكًا مترددًا هي:

(أ) H_3O^+ (ب) H_2O (ج) SO_4^{2-} (د) CO_3^{2-}

يتبع الصفحة الثانية/...

السؤال الثاني: (٣٧ علامة)

أ - محلول حمض افتراضي HZ حجمه (٢) لتر، تركيزه (٠,١) مول/لتر، وقيمة pH له (٣)، أُضيفت إليه بلورات من الملح NaZ فزادت قيمة pH بمقدار (٢). (K_a الحمض = 1×10^{-٥})،

أجب عن الأسئلة الآتية: (٧ علامات)

(١) ما صيغة الأيون المشترك؟ (٢) احسب عدد مولات الملح NaZ التي أُضيفت للمحلول.

ب- التفاعل الآتي يحدث في وسط حمضي، ادرسه ثم أجب عن الأسئلة التي تليه: (١٢ علامة)



(١) اكتب نصف تفاعل التأكسد موزونًا. (٢) اكتب نصف تفاعل الاختزال موزونًا.

(٣) حدّد العامل المؤكسد في التفاعل. (٤) ما عدد تأكسد ذرة S في الأيون HSO_3^- ؟

ج- اكتب المفهوم العلمي الدال على كل عبارة مما يلي: (٩ علامات)

(١) قطب مرجعي يُستخدم لمعرفة جهد الاختزال المعياري لقطبي الخلية الغلفانية.

(٢) الشحنة الفعلية لأيون الذرة في المركبات الأيونية.

(٣) المادة التي تتأكسد في التفاعل وتتسبب في اختزال غيرها.

د- انقل إلى دفتر إجابتك رقم الفقرة والإجابة الصحيحة لها: (٩ علامات)

(١) المادة التي يمكن أن تسلك كعامل مؤكسد هي:

(أ) Cl^- (ب) F_2 (ج) Na (د) F^-

(٢) عند تأكسد HClO ينتج ClO_3^- فإن مقدار التغير في عدد تأكسد ذرة الكلور Cl يساوي:

(أ) ١ (ب) ٢ (ج) ٤ (د) ٥

(٣) أعلى عدد تأكسد لذرة النيتروجين N يكون في:

(أ) N_2H_4 (ب) NH_3 (ج) NO_2^- (د) NO_3^-

السؤال الثالث: (٤٣ علامة)

أ - يُبيّن الجدول المجاور جهود اختزال معيارية لبعض المواد. ادرسه، ثم أجب عن الأسئلة التي تليه: (١٦ علامة)

المادة	E° فولت
Cr^{3+}	-٠,٧٣
Ag^+	٠,٨٠
Zn^{2+}	-٠,٧٦
Cu^{2+}	-٠,٣٤
Fe^{2+}	-٠,٤٤
Al^{3+}	-١,٦٦
Ni^{2+}	-٠,٢٣

(١) حدّد أقوى عامل مؤكسد.

(٢) أي الفلزين (Ni أم Cu) يُحرّر غاز H_2 من محلول حمض HCl المخفّف؟

(٣) هل تستطيع أيونات Cr^{3+} أكسدة عنصر النيكل Ni؟

(٤) أي القطبين تقل كتلته في الخلية الغلفانية (Zn/Fe)؟

(٥) هل يمكن تحريك أحد أملاح الألمنيوم Al بملعقة من الكروم Cr؟

(٦) احسب جهد الخلية المعياري (E°) للخلية الغلفانية المكوّنة من (Cu, Ni).

(٧) حدّد فلزين يكوّنان خلية غلفانية لها أعلى جهد.

(٨) حدّد اتجاه حركة الإلكترونات في الخلية المكوّنة من (Cu/Ag).

الصفحة الثالثة

ب- في خلية غلفانية قطباها (Sn/Ag) يتحرف مؤشر الغلفانوميتر باتجاه قطب Ag، إذا علمت أن Sn أيون ثنائي الشحنة في مركباته، و Ag أيون أحادي الشحنة في مركباته، أجب عما يأتي: (٨ علامات)

- (١) حدّد المصعد في الخلية.
- (٢) اكتب معادلة موازنة تُمثّل التفاعل الكلي الذي يحدث في الخلية.
- (٣) ما شحنة المهبط؟

(١٥ علامة)

ج- يُبيّن الجدول التالي بيانات تفاعل افتراضي عند درجة حرارة معيّنة:
 $A_2 + B_2 \longrightarrow 2AB$ ، إذا علمت أن رتبة التفاعل الكلي = (٣)،

رقم التجربة	[A] مول/لتر	[B] مول/لتر	سرعة التفاعل مول/لتر.ث
١	٠,١	٠,١	$١٠ \times ٠,٤$
٢	٠,٣	٠,١	$١٠ \times ١,٢$
٣	٠,٣	٠,٤	س

ادرسه جيدًا، ثم أجب عن الأسئلة الآتية:

- (١) ما رتبة التفاعل للمادة A؟
- (٢) ما رتبة التفاعل للمادة B؟
- (٣) اكتب قانون السرعة للتفاعل.
- (٤) ما قيمة ثابت السرعة k؟
- (٥) احسب سرعة التفاعل في التجربة رقم (٣).

د - فسر: يتم حرق نشارة الخشب بسرعة أكبر من حرق قطعة من الخشب لها الكتلة نفسها. (٤ علامات)

متعة التعليم الحادف

السؤال الرابع: (٤٢ علامة)

أ - في التفاعل الافتراضي $A_2 + B_2 \xrightarrow{C} 2AB + 20KJ$ ، إذا علمت أن طاقة وضع المواد المتفاعلة = (٦٠) كيلوجول، وعند استخدام العامل المساعد C كتلته (٣) غ، انخفضت طاقة وضع المعقد المنشط بمقدار (٤٠) كيلوجول لتصبح (٨٠) كيلو جول، أجب عن الأسئلة الآتية:






- (١) ما قيمة طاقة وضع المعقد المنشط بدون العامل المساعد؟
- (٢) ما قيمة طاقة وضع المواد الناتجة؟
- (٣) ما قيمة التغير في المحتوى الحراري ΔH للتفاعل؟
- (٤) ما قيمة طاقة التنشيط للتفاعل العكسي بوجود العامل المساعد؟
- (٥) ما قيمة طاقة التنشيط للتفاعل الأمامي بدون وجود العامل المساعد؟
- (٦) هل التفاعل السابق ماص أم طارد للطاقة؟
- (٧) ما مقدار كتلة العامل المساعد C عند نهاية التفاعل؟

يتبع الصفحة الرابعة/ ...

الصفحة الرابعة

ب- أكمل المعادلات الآتية وذلك بكتابة الناتج العضوي فقط:

(١٥ علامة)



ج- اكتب الصيغة البنائية للحمض والصيغة البنائية للكحول المكونين للإستر الآتي:


(٦ علامات)



السؤال الخامس: (٣٣ علامة)


أ- ادرس المخطط التالي، ثم اكتب الصيغ البنائية للمركبات العضوية المشار إليها بالرموز A ، B ، C ، D

(١٢ علامة)



ب- مبدئاً بالإيثان CH_3CH_3 ومستخدماً أي مواد غير عضوية مناسبة، حضر المركب ثنائي إيثيل إيثر

(١٢ علامة)



ج- انقل إلى دفتر إجابتك رقم الفقرة والإجابة الصحيحة لها:

(٩ علامات)

١) صيغة المركب العضوي الذي يتفاعل مع محلول تولينز ويكون مرآة فضية هي:



٢) يُعد التفاعل $\text{CH}_2 = \text{CH}_2 + \text{H}_2 \xrightarrow{\text{Ni}} \text{CH}_3\text{CH}_3$ مثلاً على:

أ) الهلجنة (أ) ب) الهدرجة (ب) ج) الاستبدال (ج) د) الحذف (د)

٣) عند تفاعل فلز Na مع الكحولات يتصاعد غاز:



﴿ انتهت الأسئلة ﴾



وزارة التربية والتعليم

إدارة الامتحانات والاختبارات
قسم الامتحانات العامة

مدة الامتحان: $\frac{1}{2}$ ساعة
التاريخ: ١٩/٦/٢٠١٩

المبحث: الكيمياء (فصل ٢٠١٩)
الفرع: العلم + (الزواجر المزدوجة) (مفاتيح)

الإجابة النموذجية:

منهاجي



وزارة التعليم العالي

السؤال الأول (٢٠١٩)

رقم الصفحة
في الكتاب

٤٠-٩

٢

١. $C_6H_5NH_2$

٣

٢. $C_2H_5NH_3^+$

٢

٣. CH_3NH_2

٢

٤. $C_6H_5NH_2$

لا يزال

٢

٥. $AlCl_3$ ← المركب المتكون في التفاعل هو $AlCl_3$

٢

٦. N_2O تمتلك زواجا من الروابط غير الرابطة يمكن أن تتبرها المادة في كيمي أو تمتلك أملاك فارغة

أما كتابة لفارئة مع توضيح باربارة لنقل زوج إلكترونات

٣

٧. NH_4Cl

٢

٨. $N_2H_4 + H_2O \rightleftharpoons N_2H_5^+ + OH^-$

٤

٩. NH_4^+ / NH_3 ٦ $CH_3NH_2 / CH_3NH_3^+$ ٤ (الزواجر مفاتيح) ٤

٣

١٠. - - - لزداد

① ①
$$K_b = \frac{[NH_4^+][OH^-]}{[NH_3]}$$

٣

١٠. $1.6 \times 10^{-4} = \frac{1.6 \times 10^{-4}}{1}$

①

صفحة رقم ()

رقم الصفحة
في الكتاب

1-2

تأريخ الازال الازد

⊕

$$[H_3O^+] = 1. \times 10^{-2}$$

⊕

$$pH = -\log [H_3O^+] = -\log [1. \times 10^{-2}]$$

⊕

⊕

⊕

⊕

⊕

KClO (P)

⊕

H₂O

()

()

متفاجي


متعة التعليم القادف



صفحة رقم ()

رقم الصفحة في الكتاب	السؤال الثاني
	$P, \text{ او } Z^-$
52-59	$0 = pH$
	$[H_3O^+] \text{ او } [OH^-]$
	$K_a = \frac{[Z^-][H_3O^+]}{[HZ]}$ (إذا عرفنا قيمة K_a)
	$[H_3O^+] \text{ او } [OH^-]$ (منه)
	$[Z^-] \text{ او } [OH^-]$ (منه)
	$[Z^-] = [NaZ]$ (او $[OH^-]$)
	عدد الإلكترونات = $2 \times \text{عدد } [Z^-] = 2 \times \text{عدد } [NaZ]$
77-63	$H_2SO_3 + H_2O \rightleftharpoons HSO_3^- + H_3O^+ \quad (1)$ $HSO_3^- + H_2O \rightleftharpoons SO_3^{2-} + H_3O^+ \quad (2)$ <p>العامل القوي H_2O و SO_3^{2-} و H_3O^+</p>
	$(3) \leftarrow$
	$(*) \leftarrow$
	F_2 (ب)
	(د) (هـ)
	(س) (نوت)

رقم الصفحة في الكتاب	الاسئلة	رقم
98-100	Ag ⁺	1
	Ni	2
	V	3
	Zn	4
	نعم	5
	0.05V	6
	Al/Ag	7
	Ag ⁺ / Ag	8
	Sn	9
	Sn + 2Ag ⁺ → Sn ²⁺ + 2Ag	10
	معدن	11
101-102		12
		13
	إذا، صفاً كالمعتاد وعوضاً عن التوازن	14
		15
		16
		17
103	سبب زيادة سرعة التفاعل عند زيادة عدد القادح، عدد القادح = الفاعل	18
		19
		20



صحة رقم ()

رقم الصفحة في الكتاب			
			في ذالك الرابع
120	μ	-	120 كيلوجول
121	μ		120 كيلوجول
	μ	✓	120 كيلوجول
	μ		120 كيلوجول
	μ		120 كيلوجول
	μ		120 كيلوجول
	μ		120 كيلوجول
	μ		120 كيلوجول
17.		1) $\text{CH}_2\text{CBr}_2\text{CH}_3$	μ
171		2) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\overset{\text{O}}{\parallel}\text{COH}$	μ
		3) $\text{CH}_2=\text{CHCH}_3$	μ
171		4) $\text{CH}_3\overset{\text{OH}}{\underset{\text{H}}{\text{C}}}-\text{CH}_3$	μ
		5) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{Cl}$ ($\text{C}_2\text{H}_5\text{Cl}$)	μ
17.	μ	$\text{CH}_3\overset{\text{O}}{\parallel}\text{COH}$	9. الكحول
17.	μ	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$	1- الكحول

السؤال الثاني

109-191


٣




٣






٣



٣



(١) (٢) (٣) (٤)



٣



٣



٣

