

٤



٣



ض

1

ق

a

إدارة الامتحانات والاختبارات

قسم الامتحانات العامة

امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٣

(وثيقة مضمومة/محلولة)

س
د
٣ : ٠٠

مدة الامتحان:

رقم المبحث: 341

المبحث: الرياضيات

اليوم والتاريخ: الخميس ٢٠٢٣/٠٧/١٣
رقم الجلوس:الفرع: الفندقية والسياحي / مسار التعليم الثانوي المهني الشامل
اسم الطالب:

ملحوظة مهمة: أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعددها (٤)؛ بحيث تكون إجابتك عن السؤال الأول على نموذج الإجابة (ورقة القارئ الضوئي)، وتكون إجابتك عن باقي الأسئلة على دفتر الإجابة، علماً أن عدد صفحات الامتحان (٨).
السؤال الأول: (100 علامة)

اختر رمز الإجابة الصحيحة في كل فقرة مما يأتي، ثم ظلّل بشكل غامق الدائرة التي تشير إلى رمز الإجابة في نموذج الإجابة (ورقة القارئ الضوئي) فهو النموذج المعتمد (فقط) لاحتساب علامتك في هذا السؤال، مع مراعاة أن:
(a=أ)، (b=ب)، (c=ج)، (d=د) عند تظليلك الإجابة في ورقة القارئ الضوئي، علماً أن عدد فقراته (25).
1- قيمة الاقتران: $f(x) = 5^x$ عند $x = -2$ هي:

- a) 10
- b) $\frac{1}{10}$
- c) 25
- d) $\frac{1}{25}$

2- الاقتران الأسّي المتزايد هو:

- a) $f(x) = 2^{-x}$
- b) $f(x) = 2\left(\frac{1}{3}\right)^x$
- c) $f(x) = \left(\frac{3}{2}\right)^x$
- d) $f(x) = \left(\frac{3}{4}\right)^x$

3- الصورة اللوغاريتمية للمعادلة الأسية: $2^x = 32$ هي:

- a) $\log_2 x = 32$
- b) $\log_x 2 = 32$
- c) $\log_2 32 = x$
- d) $\log_x 32 = 2$

يتبع الصفحة الثانية

الصفحة الثانية

4- قيمة المقدار: $\log_3 1 - 3^{(\log_3 12)} + 3^2 \log_3$ هي:

- a) 13
- b) 14
- c) 5
- d) 6

5- مجال الاقتران: $f(x) = \log_{10}(4 - 2x)$ هو:

- a) $(-\infty, 2)$
- b) $(2, \infty)$
- c) $(0, \infty)$
- d) $(-\infty, \infty)$

6- إذا كان الاقتران: $f(t) = 100(2)^t$ يمثل عدد الأسماك في بركة إحدى المزارع، حيث t الزمن بالأسابيع، فإن عدد الأسماك بعد (3) أسابيع هو:

- a) 600
- b) 900
- c) 800
- d) 1400

7- إذا كان $g(x) = \frac{4x-1}{x}$ ، فإن $g'(x)$ هي:

- a) $-\frac{1}{x^2}$
- b) $\frac{1}{x^2}$
- c) $\frac{1}{x}$
- d) $-\frac{1}{x}$

8- إذا كان: $f(x) = (5 - 4x)^3$ ، فإن قيمة $f'(1)$ هي:

- a) 12
- b) 15
- c) -12
- d) -15



الصفحة الثالثة

9- إذا كان: $f(x) = \frac{2x}{x-3}$ ، فإن قيمة $f'(2)$ هي:

- a) -6
- b) 2
- c) -2
- d) 6

10- إذا كان: $f(x) = \ln e^x$ ، فإن $f'(x)$ هي:

- a) e^x
- b) 1
- c) e^{-x}
- d) -1

11- إذا كان: $f(x) = xe^{2x}$ ، فإن $f'(x)$ هي:

- a) e^{2x}
- b) $2e^{2x}$
- c) $2xe^{2x} + 1$
- d) $e^{2x}(2x + 1)$

** إذا كان: $f(x)$ و $g(x)$ ائترانين قابلين للاشتقاق عند $x = 1$ ،

وكان: $f(1) = 4, f'(1) = 2, g(1) = 1, g'(1) = -3$ ، فأجب عن الفقرتين 12, 13 الآتيتين:

12- قيمة: $(fg)'(1)$ هي:

- a) -10
- b) 10
- c) -14
- d) 14

13- قيمة: $(f + 2g)'(1)$ هي:

- a) 4
- b) -4
- c) 12
- d) -12



الصفحة الرابعة

14- ميل العمودي على المماس لمنحنى الاقتران: $f(x) = x^2 + 3x + 2$ عند النقطة (2, 12) هو:

- a) 7
- b) $\frac{1}{7}$
- c) -7
- d) $-\frac{1}{7}$

15- الإحداثي x للنقطة الواقعة على منحنى الاقتران: $f(x) = 3x^2 - 12x + 1$ التي يكون عندها المماس أفقيًا هو:

- a) 2
- b) -2
- c) 0
- d) -11

16- قيمة: $\int_0^1 6\sqrt{x} dx$ هي:

- a) $\frac{2}{3}$
- b) $\frac{3}{2}$
- c) 4
- d) 9

17- قيمة: $\int_0^1 (3x^2 - 2x) dx$ هي:

- a) $\frac{1}{2}$
- b) 2
- c) $\frac{1}{4}$
- d) 0



الصفحة الخامسة

18- إذا كان: $\int_1^k 3 dx = 24$ ، فإن قيمة الثابت k هي:

- a) 8
- b) 9
- c) 6
- d) 7

19- إذا كان: $\int_3^4 g(x) dx = -2$ ، فإن قيمة $\int_4^3 6 g(x) dx$ هي:

- a) -6
- b) 2
- c) -12
- d) 12

20- قيمة: $\int_0^1 (1-x)^4 dx$ هي:

- a) $\frac{1}{5}$
- b) $-\frac{1}{5}$
- c) 0
- d) -1

21- قيمة: $\int_e^1 \frac{3}{x} dx$ هي:

- a) 3
- b) -3
- c) 1
- d) $3e$



22- إذا كان: $f'(x) = 3x^2 - 4x$ ، وكان منحنى الاقتران $f(x)$ يمر بالنقطة $(1, 4)$ ، فإن قاعدة الاقتران $f(x)$ هي:

a) $x^3 - 2x^2 + 5$

b) $x^3 - 2x^2 + 3$

c) $x^3 - 2x^2 - 5$

d) $x^3 + 2x^2 + 3$

23- إذا كان: $\int_{-1}^2 f'(x) dx = -6$ ، وكان $f(-1) = 3$ ، فإن قيمة $f(2)$ هي:

a) 3

b) -6

c) -3

d) 6

24- إذا كان: $f(x) = \begin{cases} 5x^4, & x < 1 \\ 5, & x \geq 1 \end{cases}$ ، فإن قيمة $\int_{-1}^1 f(x) dx$ هي:

a) 0

b) 2

c) 10

d) 28


25- التكامل الذي يعبر عن مساحة المنطقة المظلمة في الشكل الآتي هو:

a) $\int_{-1}^3 f(x) dx$

b) $-\int_{-1}^3 f(x) dx$

c) $\int_0^3 f(x) dx$

d) $-\int_0^3 f(x) dx$



السؤال الثاني: (30 علامة)

(8 علامات) (a) إذا كان الاقتران: $f(x) = 3(2)^{x-1} + 5$ ، فأجب عن كل مما يأتي:

- (1) جد مجال ومدى الاقتران f .
- (2) جد خط التقارب الأفقي للاقتران .
- (3) بين إذا كان الاقتران f متزايداً أم متناقصاً.

(10 علامات) (b) إذا كان الاقتران: $f(x) = \log_3 x$ ، فأجب عن كل مما يأتي:

(1) أكمل جدول القيم الآتي:

x	$\frac{1}{3}$	3	9
$y = f(x)$	-2	0

(2) مثل الاقتران f بيانياً مستعيناً بالجدول أعلاه.

(12 علامة) (c) إذا كان: $\log_a 3 \approx 0.68$ ، وكان $\log_a 2 \approx 0.43$ ، فجد كلاً مما يأتي:

1) $\log_a 6$

2) $\log_a 8$

3) $\log_a \frac{1}{3}$

4) $\log_a \frac{15}{10}$

السؤال الثالث: (36 علامة)

(17 علامة) (a) جد $\frac{dy}{dx}$ لكل مما يأتي عند قيمة x المعطاة إزاء كل منها:

1) $y = x \ln x + \sqrt{5 - x^2}$ ، $x = 1$

2) $y = 2u^3 - 4u$ ، $u = x^2 - 3$ ، $x = 2$

(9 علامات) (b) جد معادلة المماس لمنحنى الاقتران: $f(x) = e^{2x} - 4$ عند $x = 0$

(c) يمثل الاقتران: $N(t) = 4(3t^2 + 20)(t + 10)$ عدد سكان إحدى القرى (بالآلاف)، حيث t الزمن بالسنوات.

(10 علامات)

(1) جد معدل تغير عدد السكان بالنسبة إلى الزمن t .

(2) جد معدل تغير عدد السكان عندما $t = 2$ ، مفسراً معنى الناتج.

(a) جد كلاً من التكاملات الآتية:

(14 علامة)

1) $\int \frac{6x^3 - x^2 + 2}{x} dx$

2) $\int_0^1 8x(x^2 - 1)^7 dx$

(9 علامات)

(b) جد مساحة المنطقة المحصورة بين منحنى الاقتران: $f(x) = 6x - 3x^2$ والمحور x .(c) إذا كان: $\int_0^3 f(x) dx = -2$, $\int_0^7 f(x) dx = 6$, $\int_0^7 g(x) dx = 5$

(11 علامة)

فجد قيمة كل مما يأتي:

1) $\int_0^7 (f(x) - g(x)) dx$

2) $\int_0^3 (2f(x) + 4) dx$

3) $\int_3^7 f(x) dx$

﴿ انتهت الأسئلة ﴾