

## إجابات تدريبات الدرس

### معكوس المشتقة

#### تدريب ١

بين أن الاقتران م (س) = س<sup>٤</sup> - جاس -  $\frac{1}{3}$  ، هو معكوس لمشتقة الاقتران

$$ق(س) = س^٤ - ٣جاس$$

الحل

منهاجي



ق(س) اقتران متصل

$$م(س) = س^٤ - ٣جاس = ق(س)$$

∴ م (س) معكوس لمشتقة الاقتران ق(س)

#### تدريب ٢

إذا كان الاقترانان م(س) ، ه(س) معكوسين لمشتقة الاقتران المتصل ق(س) ، وكان ل(س) = ٣م(س) - ٥ه(س) ، فجد ل(س) بدلالة ق(س).

الحل

$$ل(س) = ٣م(س) - ٥ه(س)$$

منهاجي



$$ل(س) = ٣م(س) - ٥ه(س)$$

$$= ٣ق(س) - ٥ق(س)$$

$$= -٢ق(س)$$

### تدريب ٣

إذا كان  $q$  اقتراناً متصلًا على مجاله، وكان  $\left[ q(s) \right]$  جا  $\frac{\pi^3}{2}$  و  $s = 1 + s^3$ ، فجد  $q'(s)$

الحل



$$\text{جا } \frac{\pi^3}{2} = 1 -$$

$$\left[ q(s) \right] \text{ جا } \frac{\pi^3}{2} = s + 1 = s^3$$

$$\left[ -q(s) \right] = s + 1 = s^3$$

اشتقاق الطرفين



$$-q'(s) = 3s^2$$

$$q'(s) = -3s^2$$

### تدريب ٤

إذا كان  $\left[ q(s) \right]$  و  $s = 2 \text{ جا } s - \text{أجتاس} + 1$ ،  $q\left(\frac{\pi}{4}\right) = 0$ ، فجد قيمة الثابت  $A$ .

فجد قيمة الثابت  $A$ .

الحل



اشتقاق الطرفين

$$q'(s) = 2 \text{ جاس جتاس} + \text{أ جاس}$$

$$q\left(\frac{\pi}{4}\right) = 0 = 2 \text{ جا } \frac{\pi}{4} \text{ جتا } \frac{\pi}{4} + \text{أ جا } \frac{\pi}{4}$$

$$\text{صفر} = \frac{1}{\sqrt{2}} \times \text{أ} + \frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{1}{\sqrt{2}} \times 2$$

$$\text{صفر} = \frac{1}{\sqrt{2}} \times \text{أ} + \frac{1}{\cancel{\sqrt{2}}} \times \cancel{2}$$

$$\text{صفر} = \frac{\text{أ}}{\sqrt{2}} + 1$$



$$\frac{\text{أ}}{\sqrt{2}} = -1 \therefore \text{أ} = -\sqrt{2}$$