


## تفاعلات الألكينات


تتفاعل الألكينات كما الألكينات بالإضافة لوجود رابطتين ضعيفتين من نوع  $\pi$  ، ومن أبرز تفاعلاتها:



أولاً: إضافة الهيدروجين ( $H_2$ ) (الهدرجة أو الاختزال)


إضافة مولين من الهيدروجين بوجود عامل مساعد ( $Ni$  ,  $Pt$ ) إلى الألكين يؤدي إلى تحويله إلى الألكان المقابل، وتوزع ذرات الهيدروجين الأربع على ذرتي الكربون بالتساوي.

مثال:



سؤال 1 :

1- أكمل التفاعل التالي:



2- اكتب معادلة تمثل تفاعل البروبان مع الهيدروجين لإنتاج البروبان.

ثانياً: إضافة الهالوجينات  $X_2$  (الهلجنة)

إضافة مولين من الهالوجين يؤدي إلى كسر رابطتي  $\pi$  وتتوزع ذرات الهالوجين الأربع على ذرتي كربون الرابطة الثلاثية، ويتكون هاليد الكيل يحتوي على أربع ذرات هالوجين على ذرتي كربون متجاورتين.

مثال:



سؤال 2 :

أكمل التفاعل التالي:



الكشف عن الألكينات بواسطة محلول البروم:

يستخدم محلول البروم  $\text{Br}_2$  المذاب في رابع كلوريد الكربون ( $\text{CCl}_4$ ) للكشف عن الألكينات فمحلول البروم المذاب في رابع كلوريد الكربون ذو لون بني محمر، ويفقد لونه عندما يتفاعل مع الألكينات، بينما لا يتفاعل هذا المحلول مع الألكانات.

ملاحظة:

محلول البروم يستخدم أيضاً للكشف عن الألكينات.

سؤال 3 :

لديك ثلاثة أنابيب اختبار، يحتوي الأول على بنتان، والثاني 1- بنتين، والثالث 2- بنتاين، وضح بمعادلات أثر إضافة محلول البروم المذاب في رابع كلوريد الكربون إلى كل أنبوب مبيناً التغيرات اللونية إن حدثت.

ثالثاً: إضافة هاليد الهيدروجين HX

