

إجابات كتاب التمارين

الشرط الأولي

في كل مما يأتي المشتقة الأولى للاقتران $(f(x)$ ، ونقطة يمر بها منحنى $(y=f(x)$ أستعمل المعلومات المعطاة لإيجاد معادلة الاقتران $(f(x)$:

$$(f'(x)=3x-2;(-1,2) \quad (1)$$

$$f(x)=\int(3x-2)dx=\frac{3}{2}x^2-2x+C\Rightarrow f(x)=\frac{3}{2}x^2-2x+Cf(-1)=2\Rightarrow\frac{3}{2}+2+C=2\Rightarrow C=-32\Rightarrow f(x)=\frac{3}{2}x^2-2x-32$$

$$(f'(x)=x+1x;(4,5) \quad (2)$$

$$f(x)=\int x+1x dx=\int(x^2+1x)dx=\frac{1}{3}x^3+\frac{1}{2}x^2+C=23x^3+2x+C\Rightarrow f(x)=23x^3+2x+Cf(4)=5\Rightarrow 163+4+C=5\Rightarrow C=-133\Rightarrow f(x)=23x^3+2x-133$$

$$(f'(x)=-x(x+1);(-1,5) \quad (3)$$

$$f(x)=\int -x(x+1)dx=\int(-x^2-x)dx=-\frac{1}{3}x^3-\frac{1}{2}x^2+C\Rightarrow f(x)=-\frac{1}{3}x^3-\frac{1}{2}x^2+Cf(-1)=5\Rightarrow\frac{1}{3}-\frac{1}{2}+C=5\Rightarrow C=3\frac{1}{6}\Rightarrow f(x)=-\frac{1}{3}x^3-\frac{1}{2}x^2+3\frac{1}{6}$$

$$(f'(x)=x^3-2x^2+2;(1,3) \quad (4)$$

$$f(x)=\int(x^3-2x^2+2)dx=\int(x^3-2x^2+2)dx=\frac{1}{4}x^4-\frac{2}{3}x^3+2x+C\Rightarrow f(x)=\frac{1}{4}x^4-\frac{2}{3}x^3+2x+Cf(1)=3\Rightarrow\frac{1}{4}-\frac{2}{3}+2+C=3\Rightarrow C=-5\frac{5}{12}\Rightarrow f(x)=\frac{1}{4}x^4-\frac{2}{3}x^3+2x-5\frac{5}{12}$$

$$(f'(x)=x+x;(1,2) \quad (5)$$

$$f(x)=\int(x+x)dx=\int(x^2+x)dx=\frac{1}{3}x^3+\frac{1}{2}x^2+C\Rightarrow f(x)=\frac{1}{3}x^3+\frac{1}{2}x^2+C=12x^2+23x^3+C\Rightarrow f(x)=12x^2+23x^3+Cf(1)=2\Rightarrow 12+23+C=2\Rightarrow C=56\Rightarrow f(x)=12x^2+23x^3+56$$

$$(f'(x)=-10x^2;(1,15) \quad (6)$$

$$f(x)=\int -10x^2 dx=\int -10x-2 dx=10x-1+C=10x+C\Rightarrow f(x)=10x+Cf(1)=15\Rightarrow 10+C=15\Rightarrow C=5\Rightarrow f(x)=10x+5$$

(7) إذا كان ميل المماس لمنحنى الاقتران $f(x)$ هو $f'(x)=x$ ، فأجد قاعدة الاقتران $f(x)$ ، علماً بأن منحناه يمر بالنقطة $(9,25)$.

$$f(x) = \int x dx = \int x^1 dx = \frac{1}{2}x^2 + C = \frac{1}{2}x^2 + C \Rightarrow f(9) = 25 \Rightarrow \frac{1}{2}(81) + C = 25 \Rightarrow 40.5 + C = 25 \Rightarrow C = -15.5$$

$$\Rightarrow f(x) = \frac{1}{2}x^2 - 15.5$$

(8) إذا كان ميل المماس لمنحنى العلاقة y هو: $\frac{dy}{dx} = 2x^2$ ، فأجد قاعدة العلاقة y ، علماً بأن منحناها يمر بالنقطة $(2,4)$.

$$f(x) = \int 2x^2 dx = \int 2x^2 - 2 dx = -2x - 1 + C = -2x + C \Rightarrow f(2) = 4 \Rightarrow -4 + C = 4 \Rightarrow C = 8$$

$$\Rightarrow f(x) = -2x + 8$$

(9) إذا كان ميل المماس لمنحنى العلاقة y هو: $\frac{dy}{dx} = 3x^2 - 12x + 8$ ، ومر منحناها بنقطة الأصل، فأجد الإحداثي x لجميع نقاط تقاطع منحنى العلاقة مع المحور x ، مبرراً إجابتي.

$$f(x) = \int (3x^2 - 12x + 8) dx = x^3 - 6x^2 + 8x + C \Rightarrow f(0) = 0 \Rightarrow 0 - 0 + 0 + C = 0 \Rightarrow C = 0$$

$$\Rightarrow f(x) = x^3 - 6x^2 + 8x$$

لإيجاد الإحداثيات لنقاط تقاطع المنحنى مع محور x نفرض $y=0$

$$x^3 - 6x^2 + 8x = 0 \Rightarrow x(x^2 - 6x + 8) = 0 \Rightarrow x(x-2)(x-4) = 0 \Rightarrow x=0, x=2, x=4=0$$

(10) الإيراد الحدي: يمثل الاقتران: $R'(x) = x^2 - 3$ الإيراد الحدي (بالدينار) لكل قطعة تباع من منتجات إحدى الشركات، حيث x عدد القطع المباعة، و $R(x)$ إيراد بيع x قطعة بالدينار. أجد اقتران الإيراد $R(x)$ ، علماً بأن $R(0) = 0$.

إرشاد: يمثل الإيراد الحدي مشتقة اقتران الإيراد.

$$R(x) = \int (x^2 - 3) dx = \frac{1}{3}x^3 - 3x + C \Rightarrow R(0) = 0 \Rightarrow 0 - 0 + C = 0 \Rightarrow C = 0$$

$$\Rightarrow R(x) = \frac{1}{3}x^3 - 3x$$

(11) يتحرك جسيم في مسار مستقيم، وتعطى سرعته المتجهة بالاقتران: $v(t) = 3t^2 - 12t + 11$ ، حيث t الزمن بالثواني، و v سرعته المتجهة بالمتري لكل ثانية. إذا بدأ الجسيم حركته من نقطة الأصل، فأجد موقعه بعد ثانيتين من بدء الحركة.

$$s(t) = \int (3t^2 - 12t + 11) dt = t^3 - 6t^2 + 11t + C \Rightarrow s(t) = t^3 - 6t^2 + 11t + C$$

$$s(0) = 0 \Rightarrow 0 + 0 + 0 + C = 0 \Rightarrow C = 0 \Rightarrow s(t) = t^3 - 6t^2 + 11t$$

$$s(2) = (2)^3 - 6(2)^2 + 11(2) = 8 - 24 + 22 = 6m$$

(12) يتحرك جسيم في مسار مستقيم، ويعطى تسارعه بالاقتران: $a(t) = 6t - 30$ ، حيث t الزمن بالثواني، و a التسارع بالمتري لكل ثانية تربيع. إذا بدأ الجسيم حركته من نقطة الأصل بسرعة متجهة مقدارها $72m/s$ ، فأجد موقعه بعد 3 ثوان من الحركة.

$$v(t) = \int (6t - 30) dt = 3t^2 - 30t + C \Rightarrow v(t) = 3t^2 - 30t + C$$

$$v(0) = 72 \Rightarrow 0 + 0 + 0 + C = 72 \Rightarrow C = 72 \Rightarrow v(t) = 3t^2 - 30t + 72$$

$$s(t) = \int (3t^2 - 30t + 72) dt = t^3 - 15t^2 + 72t + C$$

$$s(0) = 0 \Rightarrow 0 + 0 + 0 + C = 0 \Rightarrow C = 0 \Rightarrow s(t) = t^3 - 15t^2 + 72t$$

$$s(3) = (3)^3 - 15(3)^2 + 72(3) = 27 - 135 + 216 = 108m$$