

أدرب وأحل المسائل

تكامل اقترانات خاصة

أجد كلاً من التكاملات الآتية:

$$\int (12ex+3x)dx \quad (1)$$

$$\int (12ex+3x)dx=12ex+32x^2+C$$

$$\int (x^2+2x+1x^2)dx \quad (2)$$

$$\int |x|x^2+2x+1x^2dx=\int (x^2x^2+2xx^2+1x^2)dx=\int (1+2x+x-2)dx=x+2\ln|x-1|+C$$

$$\int (ex+1)^2dx \quad (3)$$

$$\int (ex+1)^2dx=\int (e^2x+2ex+1)dx=12e^2x+2ex+x+C$$

$$\int (1x(x+2))dx \quad (4)$$

$$\int |x|+C4x^3+5x)dx=\int (4x-3+5x)dx=-2x-2+5\ln|x|+C$$

$$\int (4x^3+5x)dx \quad (5)$$

$$\int |x|+C4x^3+5x)dx=\int (4x-3+5x)dx=-2x-2+5\ln|x|+C$$

$$\int (x+3e6x-7x)dx \quad (6)$$

$$\int |x|+Cx+3e6x-7x)dx=\int (x^2+3e6x-7x)dx=23x^3+12e6x-7\ln|x|+C$$

$$\int (3x+1-5e-2x)dx \quad (7)$$

$$\int |x+1|+52e-2x+C3x+1-5e-2x)dx=3\ln|x+1|+C$$

$$\int (12x-3)dx \quad (8)$$

$$\int (12x-3)dx=\int (2x-3)-12dx=(2x-3)^2+12+C$$

$$\int ((2x-3)+e6x-4)dx \quad (9)$$

$$\int (2x-3)e^{6x-4} + C(2x-3) + e^{6x-4} dx = -12 \cos(\sin) \int$$

$$\int ((6x+1)dx (104 \cos f$$

$$\int (6x+1) + C(6x+1) dx = 23 \sin 4 \cos f$$

$$\int (x^4 dx (11x+3 \cos \sin f$$

$$\int x) dx = -14 \cos x + 34 \cos x^4 dx = \int (14 \sin x^4 + 3 \cos x^4 dx = \int (\sin x + 3 \cos \sin f$$

$$x + Cx + 34 \sin$$

$$\int (e^{6x} + (1-2x)^6) dx (12) \int$$

$$\int e^{6x-4} + (1-2x)^6 dx = 16e^{6x-4} - 114(1-2x)^7 + C \int$$

$$\int (x^2+1) dx (13) \int$$

$$\int |x^2+1| + Cx^2+1 dx = \int 12(2x)x^2+1 dx = 12 \int 2xx^2+1 dx = 12 \ln \int$$

$$\int (x^2x^3-3) dx (14) \int$$

$$\int |x^3-3| + Cx^2x^3-3 dx = \int 13(3x^2)x^3-3 dx = 13 \int 3x^2x^3-3 dx = 13 \ln \int$$

$$\int (x^2-x^2x^3-3x^2+12) dx (15) \int$$

$$\int x^2-x^2x^3-3x^2+12 dx = \int 16(6x^2-6x)x^2x^3-3x^2+12 dx = 16 \int 6x^2-6x^2x^3 \int$$

$$|2x^3-3x^2+12| + C3-3x^2+12 dx = 16 \ln$$

$$\int (e^x+7e^x) dx (16) \int$$

$$\int e^x+7e^x dx = \int (e^x e^x+7e^x) dx = \int (1+7e^{-x}) dx = x-7e^{-x} + C \int$$

$$\int (15-14x) dx (17) \int$$

$$\int |5-14x| + C15-14x dx = \int -4(-14)5-14x dx = -4 \ln \int$$

$$\int ((5-3x)) dx (18) 4x^3+2+3 \sin) \int$$

$$\int (5-3x) + C(5-3x)) dx = x^4+2x+\cos 4x^3+2+3 \sin) \int$$

$$\int (e^{2x}e^{2x}+3)dx \quad (19)$$

$$\int |e^{2x}+3|+Ce^{2x}e^{2x}+3dx = \int 12(2e^{2x})e^{2x}+3dx = 12\ln|$$

$$\int (1-4x)^2 dx \quad (20)$$

$$\int (1-4x)^2 dx = \int 3(1-4x)-2 dx = \frac{3}{4}(1-4x)-1+C = \frac{3}{4}(1-4x)+C$$

$$\int (xexx dx) \quad (21)$$

$$\int |x|+ex+Cxexx dx = \int (1x+xexx) dx = \int (1x+ex) dx = \ln|+1$$

أجد قيمة كل من التكاملات الآتية:

$$\int (2x+3ex-4x) dx \quad (22)$$

$$\int |2| - ((1)^2|x|) |12 = ((2)^2+3e^2-4\ln|2x+3ex-4x) dx = (x^2+3ex-4\ln|12$$

$$2-3e|1|) = 3+3e^2-4\ln+3e^1-4\ln$$

$$\int (05xx^2+10) dx \quad (23)$$

$$\int |x^2+10|05xx^2+10 dx = \int 0512(2x)x^2+10 dx = 12 \int 052xx^2+10 dx = 12\ln|$$

$$1114-12\ln|(1)^2+10| = 12\ln|(2)^2+10| - 12\ln|12 = 12\ln$$

$$\int (2x-6)^4 dx \quad (24)$$

$$\int 2x-6)^4 dx = \frac{1}{5}(2x-6)^5 |34 = \frac{1}{5}(2(4)-6)^5 - \frac{1}{5}(2(3)-6)^5 = \frac{3}{5}(210)^34$$

(25) يتحرك جسيم في مسار مستقيم، وتُعطى سرعته المتجهة بالاقتران: $v(t)=e^{-2t}$ ، حيث t الزمن بالثواني، و v سرعته المتجهة بالمتري لكل ثانية. إذا كان الموقع الابتدائي للجسيم m 2، فأجد موقع الجسيم بعد 4 ثانية من بدء الحركة.

$$v(t)=e^{-2t} \Rightarrow s(t)=\int e^{-2t} dt = -\frac{1}{2}e^{-2t}+C$$

بما أن الموقع الابتدائي للجسيم m 2 إذن $s(0)=2$:

$$s(0)=-\frac{1}{2}e^0+C = -\frac{1}{2}+C = 2 \Rightarrow C = \frac{5}{2} \Rightarrow s(t)=-\frac{1}{2}e^{-2t}+\frac{5}{2}$$

في كل مما يأتي المشتقة الأولى للاقتران $f(x)$ ، ونقطة يمر بها منحنى $y=f(x)$ أستمعل المعلومات المعطاة لإيجاد قاعدة الاقتران $f(x)$:

$$(f'(x)=5e^x;(0,12) \text{ (26)})$$

$$f(x)=\int 5e^x dx=5e^x+C$$

لإثبات ثابت التكامل، نعوض النقطة (0,12):

$$f(x)=5e^x+C \Rightarrow f(0)=5e^0+C \Rightarrow 12=5+C \Rightarrow C=-92 \Rightarrow f(x)=5e^x-92$$

$$(f'(x)=2x-1x^2;(1,-1) \text{ (27)})$$

$$|x|+1x+C|x|+x-1+C=2\ln f(x)=\int(2x-1x^2)dx=\int(2x-x-2)dx=2\ln$$

لإثبات ثابت التكامل، نعوض النقطة (1,-1):

$$|x|+1x-21+1+C \Rightarrow -1=1+C \Rightarrow C=-2 \Rightarrow f(x)=2\ln|x|+1x+C \Rightarrow f(1)=2\ln f(x)=2\ln$$

$$(f'(x)=e^{-x}+x^2;(0,4) \text{ (28)})$$

$$f(x)=\int(e^{-x}+x^2)dx=-e^{-x}+13x^3+C$$

لإثبات ثابت التكامل، نعوض النقطة (0,4):

$$f(x)=-e^{-x}+13x^3+C \Rightarrow f(0)=-e^0+13(0)^3+C=4 \Rightarrow -1+C=4 \Rightarrow C=5 \Rightarrow f(x)=-e^{-x}+13x^3+5$$

(29) إذا كان ميل المماس لمنحنى العلاقة y هو: $\frac{dy}{dx}=2x+3x+e$ ، فأجد قاعدة العلاقة y ، علماً بأن منحنىها يمرّ بالنقطة (e,e^2) .

$$|x+e|+Cy=\int(2x+3x+e)dx=x^2+3\ln$$

لإثبات ثابت التكامل، نعوض النقطة (e,e^2) :

$$2e|x+e|-3\ln 2ef(x)=x^2+3\ln 2e+C \Rightarrow C=-3\ln|e+e|+C \Rightarrow e^2=e^2+3\ln|x+e|+C \Rightarrow f(e)=e^2+3\ln f(x)=x^2+3\ln$$



بيئة: في دراسة تناولت أسماكاً في بحيرة، تبين أن عدد الأسماك $P(t)$ يتغير بـمعـدل: $P'(t) = -0.51e^{-0.03t}$ حيث t الزمن بالسنوات بعد بدء الدراسة:

(30) أجد قاعدة الاقتران $P(t)$ عند أي زمن t ، علماً بأن عدد الأسماك عند بدء الدراسة هو 1000 سمكة.

$$P(t) = \int -0.51e^{-0.03t} dt = -0.51 \cdot 0.03e^{-0.03t} + C = -17e^{-0.03t} + C$$

بما أن عدد الأسماك عند بدء الدراسة هو 1000 سمكة، إذن $P(0) = 1000$ ومنه:

$$P(0) = -17e^{-0.03(0)} + C = 1000 \Rightarrow -17 + C = 1017 \Rightarrow C = 1017$$

(31) أجد عدد الأسماك بعد 10 سنوات من بدء الدراسة.

$$P(10) = -17e^{-0.03(10)} + 1017 \approx 1004$$

عدد الأسماك بعد 10 سنوات من بدء الدراسة هو 1004 سمكة تقريباً.

طب: يلتئم جرح جلدي بمعدل يمكن نمذجته بالاقتران: $A'(t) = -0.9e^{-0.1t}$ ، حيث t عدد الأيام بعد الإصابة بالجرح، $A(t)$ مساحة سطح الجرح بالسنتيمتر المربع:

(32) أجد قاعدة الاقتران $A(t)$ ، عند أي زمن t ، علماً بأن مساحة سطح الجرح عند الإصابة هي 9 cm².

$$A(t) = \int -0.9e^{-0.1t} dt = 0.9 \cdot 10e^{-0.1t} + C = 9e^{-0.1t} + C$$

بما أن مساحة سطح الجرح عند الإصابة هي 9 cm²، إذن $A(0) = 9$ ومنه:

$$A(0) = 9e^{-0.1(0)} + C = 9 + C = 9 \Rightarrow C = 0 \Rightarrow A(t) = 9e^{-0.1t}$$

(33) أجد مساحة سطح الجرح بعد 5 أيام من الإصابة.

$$A(5) = 9e^{-0.1(5)} \approx 5.5 \text{ cm}^2$$

مساحة سطح الجرح بعد 5 أيام من الإصابة هي 5.5 cm² تقريباً.